



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Real di. lo
lumbi Cre
moneris.

Anatomia

611-0

C 67 D
R

72.3,

E—L

G—B

V—C.

De re Anatomica libri x v.



1562.



PAVLO IIII. PONT.
MAX. REALDVVS COLVM-
bus Cremonensis,
S. P. D.



AVDEO mirandum
in modum, Pont. Max.
me opus illud de re Ana-
tomica, quod abhinc mul-
tos annos inchoaueram,
tandem faelicissimis tuæ
sanctitatis tēporibus absoluisse. Quis enim
pius Christianis omnibus non gratuletur?
quis sibi ipsi ex animo nō gaudeat, se ad hæc
vsque tempora seruatum esse, cū in sedem
Petri successerit sanctissimus, atque optimus
senex, qui tāta iam inde à puero vitæ sancti-
tate præditus sit, tanta optimarum artium

ã ij

omnium cognitione, ut huic Sanctæ Sedi
merito seruatus fuisse videatur: qui tot in-
tegerrimorum morū exemplo, doctrina, con-
cionibus, sobrietate, ieiuniis præsentēs, ab-
sentēsque Christianæ religionis amore inflā-
mare possit: qui abusus omnes, omnes hære-
ses profligare, atque radicitus euellere solus
queat. nullus enim unquam post hominum
memoriam hæreticos, prauosque homines a-
crius insectatus est. nemo religionem hære-
sibus labefactatam melius erexit: literarum
studia libentiùs fouit. Quid, quòd tu huma-
nos affectus omnes ita domuisti, ut nemini
prorsus pepercisse palam ostēderis. Cū igitur
adeo acriter vitia insecteris, adeo poten-
ter virtutes euehas, bonisque artibus, & di-
sciplinis humano generi perutilibus libēs fa-
ueas, illasque paterna charitate foveas, non
dici potest quāto perē gaudeam me meis, quos
de Anatome conscripsi libris, te Pontifice,
extremam manum imposuisse, quos humili
pro-

propensioque , ut decet , animo tibi hodie
nuncupo, tuisque sanctissimis pedibus pro-
uolutus , sanctitatem tuam supplex exoro,
ut illis, meisque omnibus benedicat, ample-
xetur, ac eos protegat . Si enim tuæ sancti-
tati licebit unquam per maxima illa quæ
sustines totius Reipub. Christianæ negotia,
meos hosce qualescunque libellos perlegere,
eos nō inutiles Medicinæ ceterisque artibus
iudicabis. Deus faxit , ut te quàm diutis-
simè incolumem videamus: te enim Pontifi-
ce Christiana religio vel à remotissimis bar-
barorum nationibus , atque illius acerrimis
hostibus bene audiet.

ā iij

INDEX CAPITVM

TOTIVS DE RE ANA-

TOMICA OPERIS.

LIB. I.

P Rocemium pagina	1
De ofibus in vniuersum	2
De appendicibus, atque processibus ofium	6
De compositione ofium	14
Tabula compositionis ofium	16
De diuisione ofium	17
De capitis ofibus, siue caluaria	27
De osse iugali	47
De oficulis organi auditorij	
ibidem	
De maxilla superiore	51
De inferiore maxilla	58
De dentibus	61
De capitis foraminibus	67
De osse hyoide	76
De larynge	79
De dorso in vniuersum	84
De vertebribus ceruicis, & capitis moribus	88
De vertebribus thoracis	96
De lumborum vertebribus	100
De sacro & coccigis osse	103
De thorace	109
De osse pectoris	119
De scapulis	121
De clauiculis	126
De humero	128
De cubito	132

De brachiali	137
De postbrachiali	141
De digitis manus	144
De ilium osse	148
De femore	154
De tibia	159
De patella	163
De pedis ofibus, ac primum de talo	165
De pedio	175
De digitis pedis	176
De sesaminis	178

LIB. II.

De cartilaginibus	180
De palpebrarum cartilaginibus	181
De aurium cartilaginibus	ibid.
De nasi cartilaginibus	183
De maxilla inferioris cartilaginibus	184
De asperæ arteriæ cartilaginibus	ibidem
De spinæ dorsii cartilaginibus	186
De cartilaginibus in superiore pectoris parte	ibid.
De cartilaginibus in medio pectore	187
De costarum cartilaginibus	ibid.
De scutiformi cartilagine	188
De cartilaginibus in scapula, coxendicis,	

INDEX.

coxendicis, ac tibiæ sinibus	189	ibidem	
De cartilaginibus iuxta brachiale	190	De quatuor musculis labiorum	222
De cartilaginibus inter pubis ossa	ibid.	De musculis supercilium trahentibus	223
De articulorum cartilaginibus	ibidem	De palpebrarum musculis	224
De unguibz	191	De oculorum musculis	225
LIB. III.		De musculis aurium	228
De ligamentis	192	De musculis maxillæ inferioris	ibidem
De capitis ligamentis	193	De musculis ossis hyoidis	231
De ligamentis capitis cum duabus primis vertebrais.	194	De linguæ musculis	232
De hyoidis ac linguæ ligamentis	196	De musculis laryngis	233
De ligamentis brachialis	197	De musculis scapulas mouentibus	240
De ligamentis femoris tibiæque	198	De musculis humerum mouentibus	242
De ligamentis inter sacrum os, & coxendicis	199	De musculis capitis	243
De ligamentis transversis in pede	200	De musculis cervicis	247
De ligamentis reliquorum articulorum	ibid.	De musculis dorfi	249
De ligamentis cubito, tibiæ, ac pubi apposis	201	De musculis thoracem mouentibus	251
De ligamentis hepatis	ibid.	De septo transversa	255
LIB. IIII.		De musculis abdominis	258
De sceletro	202	De musculis testiculorum	264
LIB. V.		De musculis penis	ibid.
De Musculis	215	De musculis uteri	265
Quid sit musculus ac de musculorum differentiis	ibid.	De vesicæ musculis	266
De faciei musculis	219	De musculis ani	ibid.
De musculis frontis	ibid.	De musculis femur mouentibus	267
De duobus musculis nasi	221	De musculis tibiæ mouentibus	271
De musculus latis in collo positus		De musculis in tibia extremo pedis deseruentibus	276
		De musculis in extremo pede	281

INDEX.

<i>De musculis qui cubito deseruiunt</i>	284	<i>lum, intestina, & asperam arteriam</i>	406
<i>De musculis summam manum mouentibus</i>	286	<i>De pulmone</i>	409
<i>De musculis externis, qui manui famulantur</i>	291	<i>De pleura, & mediastino</i>	414
<i>De musculis in extrema manu</i>	294	<i>De œsophago, & ventriculo</i>	416
LIB. VI.		<i>De intestinis</i>	419
<i>De iecore & venis</i>	298	<i>De mesenterio & omento</i>	423
LIB. VII.		<i>De liene</i>	425
<i>De corde & arteriis</i>	322	<i>De vesicula bilis</i>	426
LIB. VIII.		<i>De renibus</i>	427
<i>De cerebro</i>	345	<i>De vesica</i>	430
<i>De cerebro, cuiusque membranis:</i>		<i>De peritonæo</i>	432
<i>De spinali medulla: Item de nervis</i>	ibid.	<i>De abdomine</i>	434
<i>De organis odoratus, & nervis</i>	356	<i>De vasis seminariis</i>	435
<i>De nervis in vniuersum</i>	357	<i>De testibus</i>	438
<i>De nervis medullæ spinalis post caluariam</i>	366	<i>De pene</i>	440
<i>De nervis manus</i>	374	<i>De utero</i>	443
<i>De nervis thoracis</i>	380	<i>De umbilico</i>	449
<i>De nervis lumborum</i>	383	LIB. XII.	
<i>De nervis ossis sacri, & pedis</i>	386	<i>De formatione fœtus, ac de sui infantis in utero</i>	451
LIB. IX.		LIB. XIII.	
<i>De glandulis</i>	392	<i>De tegentibus fabricam humani corporis</i>	466
LIB. X.		<i>De cuticula, cute, pinguedine, membrana carnea</i>	ibid.
<i>De oculis</i>	396	<i>De pilis</i>	469
LIB. XI.		<i>De periostio</i>	470
<i>De visceribus</i>	406	LIB. XIII.	
<i>De vasa, tonsillisque, necnon de tunica vestiente nasum, palatum, os, œsophagum, ventricu-</i>		<i>De vna sectione</i>	471
		LIB. XV.	
		<i>De iis quæ raro in Anatome conspiciuntur</i>	482
		FINIS.	



REALDI COLUMBI

CREMONENSIS,

DE OSSIBVS

Liber Primus.



V MANI Corporis fabricam descripturi, primùm ab ossibus incipiamus : ab ea nimirum parte, ad cuius imaginem ceteras omnes effingi meritò conuenit. quâdoquidem ossium structura eandem in cor-

Cur ossium Anatomie præcedat.

Gal. 1. de Anatome administr. cap. 2.

pore rationem obtinet, quam in ædificiis columnæ, trabes, ac fundamenta. vt enim rustici humiles sibi casas ædificaturi, inuicem primùm ligna compacta intertexere solent, quæ deinde ramis, cæmentisq; opplent, atque obliunt, lutoque demum, ac palea incrustant, & obtegunt, quò se à cæli, ferarum, atque hominum iniuriis aliquo pacto tueantur. Sic prope modum se ossium strues habere videbitur, si carnem ab ossibus eximas, & denudata ossa eo



A

modo componas, & colligas, quem nos infra edoctruri sumus, ubi de componendi sceleti ratione ex professo agemus. Enascentis etiam navis exordium si intueberis, carinam inquam, & costas, exemplum habebis huic eidem rei accommodatissimum. Ossa igitur fundamenta corporis optimo iure dixerimus, quæ fulciant, stabiliantque partes alias: neutiquam enim per se consisterent, firmariue possent, nullamque, aut certe imperfectam functionem obtinerent, nisi solidis hisce partibus adnascerentur, atque adhærescerent. Quamobrem de ossibus agere primum expedit, ut cum alios anatomicos, tum Galenum ipsum ita iubentem sequamur. His addemus tractationem illam, quæ est de Cartilaginibus: tertio verò loco de ligamentis differemus, particulis admodum necessariis ad ossa unienda, compagemque ipsam ossium continendam, ut ne à sua sede dimoveantur, aut huc vel illuc dilabi temerè possint. Et hæc sanè similia sunt vinculis, aut clavis, quibus trabes connectuntur tuguriis aut carinis exadificandis. Postremò tractatum hunc concludet ea pars, in qua sceleti faciendi artem quandam haud inutilem monstrabimus.

CAPUT I.

Cur ab ossis nomine non exordiar.

AB ossibus itaque cum sit exordium, ordo ipse rerum tractandarum à veteribus nobis per manus traditus exigere videretur, ut primò

primò explicaremus quid ossis nomine intelli-
gi velimus, nisi omnibus ea res esset quàm no-
tissima. Præterea dum ossium substantiam e-
narrabimus, id ipsum omnino docere videbi-
mur. Nominis igitur ossiū disquisitione præ-
termissa, quòd non ita in promptu sit cuius
ossium natura, seu substantia, nomina, diffe-
rentiæ, figuræ, & vsus, operæpretium fuerit de
his accuratè, quoad eius fieri potest, agere. Os-
sium igitur substantia terrea quidem est maxi-
mè: scire etenim licet corpora omnia aut esse
simplicia, qualia sunt prima quatuor elemen-
ta, aut ex iis composita: Compositorum au-
tem diuersam naturam esse pro varia quam su-
munt ab elementis portione: ea siquidem cor-
pora ignea dicimus, in quibus ignei plus ele-
menti viget, aërea verò, aut aquea, in quibus
aër, vel aqua dominatur, sic alia grauiora, alia
leuiora, cæterisque qualitatibus differentiis præ-
dita magis nuncupamus eandem ob causam.
Cum igitur plus terræ, quàm reliquorum ele-
mentorum in ossium natura deprehendatur,
nō ab re terrestria illa, cum medici omnes, tum
philosophi appellauerunt, ac præterea durissi-
ma, frigidissima, aridissimaque partium om-
nium corporis, qualis est ipsa terra: qua limi-
tatione Galeno occurritur, qui pilos ossibus sic-
ciores dicit, ac etiam frigidiores in fine primi
temperamentorum, quoniam pili excrementa
sunt, non partes corporis, si propriè loquamur.

*Ossium substan-
tia terrea.
Corporum divi-
sio.*

Ossa cur terrea.

*Gale. in calce
primi de tempe-
ramentis.
Contra Gal.*

sunt etiam ossa immobilia suapte natura gra-
uia, alba, & sensus omnis expertia, quanquam
non ea ratione dicendum mihi videtur ossa mi-
nimè sentire, quòd plurimo abūdēt elemen-
to terreo, sed quoniam per ipsorum substan-
tiam nulla neruorum portio disseminetur, quo-
rum beneficio cætera omnia, quibus sensus in-
est sentire pro cōperto habemus. Id quod pru-
dentissimè Dei optimi maximi volūtate, quam
naturam dicimus, factum fuisse intelligemus,
si animaduertamus ossa ea esse, quæ totam cor-
poream molem sustentent, quæ frequentibus,
ac variis motibus cieantur, quibus motis par-
tes reliquas secum vnà trahi, ac deferri necesse
est, quæ si sensu prædita essent tantum non as-
siduos labores non sine dolore persentiscerent,
& ea tristis, (vt vocant) sensatio aut maximā
actionum partem tolleretur, aut saltem frustra-
retur. Neque illi audiendi sunt, qui obstinatè
asserunt insignem in ossibus sensum inesse, qui
si adesset, cū vruntur, secantur, franguntur,
ac grauitèr percutiuntur, sæuissimis cruciatibus
ægros angerent, quod tamen perarè accidit,
tuncque dolor ab ossibus minimè proficiscitur,
sed à membrana illa, quæ ossibus obducitur, at-
que ideo à Græcis vocatur περιόστεος. Quòd autem
ossa perioestij munere, non spontè sentiant, hinc
patet. Hac etenim abrasa non modò sine do-
lore, verum etiam sine villo prorsus sensu ossa
secabis, cōbures, & quo lubuerit modo tracta-
bis.

*Cur ossa non sen-
tiant.*

*Natura est Dei
voluntas.*

Ossium munus.

*Si ossa sentiret,
quæ inconvēni-
entia sequeretur.*

*Contra creden-
tes ossa sentire.*

*Quòd ossa peri-
ostij gratia sen-
tiant.*

bis. Quare cū Galeno, & aliis rectè sentiētibus concludamus ossa omni prorsus carere sensu, dentes tamen excipio, quos sentire omniū consensu, magistrāque experientia comprobatum est. Cuius rei rationem, ne omnia vbique conculcentur, in suum locum reiicimus. Atque hęc prima sit ossium differentia ita obiter dicta, quæ nō solū nominibus discrepant, cū singula suū sibi nomen vendicent siue proprium, siue tralatum: sed differunt etiam magnitudine, cū alia parua sint, magna alia: quin & forma, siquidem alia oblonga sunt, alia breuia, alia triangulum, alia quadrangulum: referentia, vel alius figuræ, hæc leuia, illa aspera, alia processibus munita, alia appendices habentia, alia commissuris distincta, alia non item. Vsu quoque distinguuntur, cū ad vnā tantū functionem, aut opus commune omnia non sint destinata, quod etiam tam multiplex formarum diuersitas attestatur: videre enim est nonnulla planè concava, & ex his quædam cauitatem amplam habēt, quædam angustam, neque id pro magnitudine contingit ossium, quando aliqua sunt grandia, nec tamen manifestam cauitatem habent, vt sunt ossa, quæ cum sacro committuntur, & ipsum os sacrum, scapulæque, & alia, de quibus suo loco dicemus. Parua item sunt aliqua, & insigniter concava, sicuti sunt ossa digitorum, quicquid de hac re Galeus senserit primò de partium usu. Ossa

Prima ossium differentia. Ossa non sentiunt. Dentes sentiunt.

2. Ossium differentia a magnitudine.

3. Ossium differentia ab usu.

Ossa quæ cū sacro committuntur, os sacrum & scapulæ insigni cauitate cauent.

Contra Gal. 1. de usu partium. Ossa digitorum sunt insigniter concava.

Ossa nasi, sesamina, & auditus instrumenti non sunt solida.

Corra Vesalii.

Brachiale, dentes & multa digitorum ossa sunt perforata corra Vesalii.

Cur foramina in ossibus.

omninò solida non ego numerauerim ossa nasi, neque sesamina, neque ossicula organum auditus constituenta, mihi enim prorsus non sunt solida, quanquam Vesalius aliter sentiat: nam si quis fracta hæc, vel recentia, neque dum exciccata diligenter inspiciat, in ijs apparebit spongiosa quædam substantia pumici denso per similes, sinus quosdam perexiguos præ se ferens: ad hæc ossa ipsa extrinsecus foraminibus referta sunt, sed alia magis, alia minùs, licet omnino solida videantur esse. Huiusmodi foramina non agnoscit Vesalius in brachiali, dētibus, ac permultis digitorū ossibus qui tamē in hac parte parū occularus fuit, vt infra ostēdemus. hæc autē foramina ne inutilia duxeris, nā ideo à sapiētissimo rerū opifice Deo facta sunt: vt per ea aditus pateretur tum venis ad sanguinē crassiusculū pro nutrimentō deferendū, tum etiā arteriis ad vitalem calorem commoderadū. at illa, quæ nullis foraminibus donata sunt, cū neque venas, neque arterias admissura essent, ab adiacentibus partibus & fouentur, & nutriuntur. atque hæc in vniuersum, & quasi per transfennam de ossium differentiis dicta nunc sint. Reliquum esset, vt iam ad singulorum enarrationem veniremus, vbi planius omnia dignoscentur.

C A P V T I I.

Cur statim singula ossa non explicet.

SE D quoniam in singulorum ossium enarratione nonnulla occurrunt nomina, quibus
in

in toto hoc tractatu de ossibus vtendum erit, quæ nisi prius cognita forent, dubioprocul difficultatem aliquam, obscuritatẽque parerent, idcirco de his antea differendum mihi esse videtur, quæ, qualiãque hæc sint, quõue significatu accipi debeant : in hoc etenim præcipuos anatomicos imitari statui, qui & ipsi existimarunt horum nominum tractationem plurimum conferre ad ea percipienda quæ de ossium natura, deque ipsorum compositione sunt dicenda.

Primum itaque videamus quid sit appendix, *ἐπιφυσίς. i. appendix, quid sit.* quam Græci *ἐπιφύσιον* vocant. ea nihil aliud est, quàm ossi os adnatum, coagmentatũque, quemadmodum linea quædam ossium capita circumscribens apertè indicat: scito autem hanc in iunioribus animalibus facillimè deprehendi, in grandioribus verò, ac ætate prouectis vix discerni posse, nam si hædi, aut agni, vel alterius animalis nuper nati oscula decoxeris, in eorum extremitatibus partes quasdam diuelli, ac concidere conspicias, siue id spontè, siue de industria fiat, & hæ particulæ superius inferiũque appositæ adnexæque appendices dicuntur, quarum vtilitatem neque Galenus solertissimus alioqui naturæ inuestigator rectè descripsit, vt Vesalius optimè reprehendit: sed neque ipse, quod magis miraberis, nouisse videtur, vt si nouit, scribere neglexit, quippe qui arderet cupiditate incredibili in Galenũ in-

Appendix in gradioribus vix cernitur.

Vesalius quandoque errat nimio studio reprehendendi Galen.

*Galenī ratio de
appendicibus 9.
de Vſu Part.*

*Veſaliſ ratio cō-
tra Gal. de ap-
pendicibus.*

*Quid intelligat
Veſ. per oſſa nō
medulloſa.*

*Appendices nō
eſſe duriores of-
ſibus cōtra Gal.*

uehendi & eius errores adnotandi. vt ad Gale-
num redeamus, is i x. de partium vſu aſſerit,
naturam appendicibus oſſa donaſſe, vt oper-
culi vicem gererent, ne ſcilicet medulla ſinibus
contenta efflueret: quam rationem ſatis infir-
mam eſſe, ne infulſam dicam, ex eo patet (in-
quit Veſalius) quoniam oſſa huiusmodi ſini-
bus carentia, tamen appendicibus nō ſunt pro-
pterea deſtituta, quin & ſcapulæ, & vertebræ,
& oſſa nonnulla parua, quanuis minimè ſint
medulloſa, ſuas tamē appendices habent. Hac-
tenus ille: etſi pluribus cum verbis, tum etiam
exemplis Galenum oppugnet. quo loco ani-
maduertere oportet oſſa minimè medulloſa
Veſalium intellexiſſe, non quæ prorsus me-
dulla careant, ſed quæ cauitates, aut ſinus in-
ſignes non habent, at ſolūm cauernulas quaſ-
dam perexiguas, fungoſam ſubſtantiam refe-
rentes, in quibus medulla deliteſcit, & pro-
pterea medulloſa eſſe non videntur, ſi cum iis
conferantur, in quibus ampli ſunt ſinus, & ma-
niſeſti, multa oppleti medulla. Illud etiā nullo
pacto omittēdum eſt, quod Galenus eodem in
loco addidit. Appēdices ſcilicet, multò eſſe du-
riores oſſibus, quod quomodo concedi poſſit,
non equidem video: nam appēdices ab oſſibus
auulſas ſæpiùs vnusquīſque noſtrum dentibus
compreſſit, atque attriuit, vt dulcem inde ſuc-
cum, & non iniucundum exprimeremus, qua-
re tantum abeſt, vt appendices oſſibus duriores
ſint,

sint, vt contrà in his spongiosum corpus, & molle experiamur: nisi fortasse de parte illa sensisse Galenum opinemur, qua committuntur appendices cum ipsis ossibus. sed neque hac limitatione tueri Galenum possumus: etenim quòd appendices frequenti, assiduòque motu articulorum non atterantur, non est vni appendici acceptum ferendum, quòd durissima sit, sed illud contingit propterea quòd inuestiatur cartilagine densa, ac molli, quæ sua duritie, atque (vt ita dicam) vinctuositate articulationem ipsam conseruat, ne dum lubricam magis, & ad motum promptiorè facit. id quod perspicuum magis tibi fiet, si consideraueris, nò omnia ossa, quæ per articulum committuntur appendicibus esse munita, tamen crustam hanc cartilagineam præ se ferre, quippe quæ necessarium præsidium afferat, ne longo attritu ossa disrumpan-
 tur. Sed, his omissis, iam appendicum vsum dicamus nemini adhuc, quod sciam, cognitum, licet res sit cùm scitu digna, tum vero per necessaria. Ego cum scirem nihil frustra à natura factum, neque adeò nullius prærij in corpore particulam dari, quæ alicui vsui non esset addicta, peruestigare non destiti, quæ nam foret appendicum vtilitas: & cùm Galeni sententia mihi non probaretur, demum comperi appendices ossibus adnexas esse, vt ex ea coniunctione ligamenta prodire possent, quæ in articulis compositionem ipsam roborant, stabiliuntque, qua-

Gal. defensio.

*Defensionis
Gal. oppugnatio.*

*Cur appendices
non atterantur
ex assiduo mo-
tu articulorum.*

*Appendicum
usus verus à ne-
mine adhuc
expressus.*

lis est femoris supernè cum osse coxendicis, infernè autem cum tibia, qualis etiam humeri cū scapula, & cum ulna, atque radio, qualis denique aliorum articularum, quibus cum etiam illos numerari velim, qui, vt paulò suprà diximus, appendicibus non sunt donati, quibus quomodo præstò sint ligamenta, per quæ vincti teneantur, infrà proprio de ligamentis capite tractabimus. Neque verò id vnum tantum ligamenta præstant, cum ex his etiam appendicibus exoriantur, vbi nulla fit coarticulatio, vt in ossibus ilij, vt in scapulis, ac nonnullis vertebrarum processibus: Inde enim fluunt ligamenta, quæ ad musculorum constitutionem necessariò concurrunt, sicuti proprio capite ostendemus. Quo fit, vt musculi inde plurimum ortum ducant: vnde exeunt huiusmodi cartilaginee ligamentales, sic enim appellare nunc libet, quæ quidem per musculos disseminantur vim, ac robur illis subministrantes, ac demum in tendines ipsos desinunt. quæ duo ligamentorum munera, cum tantopere sint necessaria, necessariam quoque fuisse appendicum generationem quis non videt? cum ea sublata vix reperiās unde commodè prodire possint ligamenta. Quòd autem ea sint, quæ articulationem ipsam colligent, atque ita contineant, vt ne huc, vel illuc dilabatur, præterquam quòd per dissectionem constare liquido possit, animaduertere etiam licet in luxationibus, cum ob nimiam molli-

tiem,

Quomodo articuli carentes appendicibus determinantur à ligamenti dicitur in tractatu de ligamentis.

Ligamenta oriuntur etiā ex appendicibus vbi nō est articulus.

Ex ligamentibus cartilaginibus musculi saepe oriuntur.

Ligamentales musculorū cartilaginee denique desinunt in Tendines.

Ligamenta oriuntur ex appendicibus.

Luxationum cause.

riem, & humiditatem lenta fiant ligamenta, & protrahantur, aut aliquid glutinis calli cuiusdam instar interfideat, quo longius quàm necesse sit, ligamentum reddatur, aut tenella puerorum ossa validius imperiti medici manu fuerint attrectata, quandoquidem eousque extenduntur, vt secum vnà appendices diuellant. quam luxationem nunquam, aut summa quidem certè cum difficultate curari posse crediderim, propter sinuum, ac tuberculorum multitudinem, quibus vtraque pars, tam appendicis, quàm ossis cui adnascitur abundat, & eorundem mutuū ingressum postulat. sequitur ἀπόφυσις à Græcis dicta, quam Latini interpretes diuersis vocibus reddunt, nos autem vbique processum dicemus. Is autem est, cum os in aliqua parte prominet, quasi ramum, vel radicem iuxta trunci arboris ritum emissurum. Cum itaque pars aliqua gibbi aut tuberculi instar ex osse procedit rectissimè processus nuncupatur, qui ab appendice differt, quoniam is vera pars est eius ossis, vnde prominet, appendix vero ossis, cui adnascitur nullo modo. Item appendices plerunque processus habent, vt in vlna cernimus, & tibiæ parte inferiore, atque etiam in aliis quibusdam ossibus, de quibus infra. Rursus nonnullis processibus hærent appendices: nam interior scapulæ processus anchoræ imagine, & scapulæ spina, quæ itidem scapulæ processus est, appendices habent. Illud tamen adnotandum

Luxatio manufacta.

Luxationis species quæ diffiaillime curatur, et cur.

Α' πὸ φύσεως. i. processus quid sit.

Processus & appendicis differentia prima.

Differentia 2.

Differentia. 3.

Processus Trochanteros videntur appendices.

femoris processus, qui trochâteres, siue rotatores vocâtur, appendices verius esse, quàm quòd appendicibus muniti dici debeant: tota enim pars illa, quæ protuberat, & iccirco processus dicitur, appendicis locum tenet, vt ibi idem sit

Vesalius male distinguit in rotatoribus processus ab appendicibus.

processus, qui & appendix, licet Vesalius discrimen posuisse videatur. Nam si rotatores in nuper editis animantibus auellantur, vt ea ratione appendices abeant, nihil loci processibus relinquetur. Cùm itaque ablatis appendicibus, processus vnâ auferantur, meritò partem vnâ, atque eandem processum, & appendicem eo in loco iudicabimus. Sed hæc parui sunt momenti. Præterea differunt proces-

Differunt.

sus, & appendix, quoniam pauca sunt admodum ossa, quibus aliquis non adsit processus, cùm fieri vix possit, quin aliqua ex parte emineant. at multa tamen sunt ossa appendice destituta, vt ossa capitis, maxillæ superioris, brachialis, & quædam alia. Differuntque processus inter sese, cùm diuersas figuras sortiantur, alij enim tenues sunt, & acuti styli formam referentes, propterea Styloides à Græcis vocati, alij acuti quidem, sed non ita tenues, quales in cerui conspiciuntur & in arcus cornu, vbi neruus assidet. Huiusmodi processus in inferiore maxilla

Quæ ossa appendicibus careant.

Styloides processus qui.

Corona processus qui.

reperias, & hi sunt, quos coronas Galenus appellauit, quasi processus in acutum tendentes, alij anchoræ similitudinē præ se ferunt, vt interiores scapularum processus ancyroides, alij in caput

Anchyroides processus qui.

put definunt, idq; bifariam, nam quidam illud depressum habent, vt postbrachialis, vbi cum brachiali iungitur, & pedij ossa vbi cum ossibus tarfi, & fibulæ cum suprema parte tibiæ: quidā verò oblongum, & prominens, vt femoris caput superius, quo articulatur cum osse cœxendicis, in aliquibus etiā caput rotundum est, quale est humeri cum scapula, & ossium postbrachialis, cum primis articulis digitorum: longi capitis processus ceruicem quoque habere dicuntur. Ceruicis autem nomine eam partem intelligimus, quæ in ipso processu tenuior est, & ab osse vsq; ad ipsum caput pertinet, quod spatiū collo quā simillimum apparet, sicuti perspicuum est in superiore femoris parte, quæ in cœxendicē ingreditur. Et quoniam capitū facta mentio est, quæ ideo effecta sunt, vt aliorum sinus articulationis gratia subeant: sciendum est pro capitum varietate sinus quoq; varios esse, siquidem illis ipsis proportionē respondent. Nam si oblongū fuerit caput, oblongum æquē esse sinū oportet, in quem inferatur: sin autē depressum, humilē etiam, ac modicam cauitatem requirit. Sinum amplum profundū, & valde perspicuum Latini acetabulū, Græci verò κοτύλην siue κοτυληδῶνα dicunt, planum autē, & obscurum γλήνην, qui sinus adeò leuiter, superficiēque tenus cauatus est, vt vix primo aspectu cōprehendi queat. At eorum sinuū, qui ampliter caui sunt, profunditates augere solent processus quidam circulares, quos

Processus capite depressu.

Processus oblongi & prominētes.

Processus capite rotundo.

Cervix in ossibus quid vocetur.

Caput in processibus cur factum fuerit.

Sinus proportionē respondēt capitibus processuum.

κοτύλη, vel κοτυληδων. i. acetabulum, quid.

γλήνη in sinibus ossium quid sit.

Sinus ossis quādoque a processu & cartilagine amplificatur

in superficie positos labra, siue supercilia vocamus. augent etiam huiusmodi cauitates, cartilagine, quæ in aliquibus inueniuntur, quæadmodum in scapula, vbi cohæret cum humero, & in coxædicis articulatione cum femore: & hæc luxationem difficiliorem faciunt. Processus nō figura modò, sed etiam numero distant, quædam enim ossa pluribus, quædam verò paucioribus sunt donata, quemadmodum ex vniuscuiusque ossis descriptione patebit. Processuum verò vtilitas non vna est duntaxat. Nam facti sunt ab opifice Deo, tum vt cōmodam ossium articulationem, compositionemque præbeant, tum vt inde quasi ex rupibus, aut collibus quibusdam muscoli prodeant, vel in eos ipsos implantentur: tum demum vt propugnaculi munere fungantur, quales sunt scapularum, vertebrarumque processus. Quid vertebra sit, notum tibi fiet tractatu de vertebris, quid verò articulus, sequenti tabula intelliges.

CAPVT III.

QUÆCUNQUE superiore capite complexi sumus, dedimus operam, vt quàm breuissimè perfringeremus: quando eadem repetere contingeret, & fusiùs fortasse alibi pertractare. sed nullo modo prætermittenda erant, præsertim vt ossium structuræ diuisione faciliùs intelligatur: quæ nusquam aptius, quàm hic locari poterat: & ob declaratas iam voces, & quia
vni-

Quid femoris luxationem difficiliorem reddat.

Processus differunt numero.

Processuum vtriusque triplex.

Curr tabula de ossium diuisione hic posita sit.

vniversæ huic historiæ luminis multum afferer. Cum itaque constet sicuti initio dictum est, totam ossium molem esse veluti fundamentum animati corporis, cuius proprium est, ut sentiat, & moueatur: inutilis ea constructio fuisset, quæ continua esset, ac solida. quid enim illius fabrica à lapidea vel ænea statua differret? sed ossa, etsi natura per se immobilia habeantur, moueri tamen eadem apprime necessarium fuit: ut ad ipsorum motum animalis motus cōsequeretur, ac præsertim hominis animantium omnium perfectissimi: cui ob infinitas propemodum artes, quas ipse tractat, innumerabilesque actiones, quas edit, infinita penè motuum genera debebantur. Talem igitur cōpositionem ossa postularunt, ut neque omnino disiuncta, ac dissoluta, neque prorsus continua essent modo venarum, ut malè Aristoteles putauit tertio de Natura Animalium Cap. v i i. Ergo contigua ossa, cōiunctaque esse oportuit, ut super aliquo quiescente moueri possent, tametsi ossium vnio, quæ ob motum præcipuè facta est, ob transpirationem etiam, transirumque corporum facta fuerit, ut futura in caluaria, quam & tutelæ causa ex pluribus ossibus efformatâ esse suo loco audies, ac demum ob partium diuersitatē, vbi dura mollibus cōmittuntur. Cum autē in cōponendis ossibus sapiens natura non vnâ rationem seruauerit, ut faciliè quisq; intelligat, quàm variè sint inuicem composita, sequentē tabulam subiecimus.

*Cur homo non
constat ex osse
vno continuo &
solido.*

*Ossium compo-
sitio qualis esse
debnit in homi-
ne præsertim &
cur.*

*Cōtra Aristō. 3.
de natura Ani-
mal. Cap. 7.*

*Sutura capitis
ob trāspiratio-
nem facta sunt.*

*Cranium tuta-
menti gratia fa-
ctum.*

*Ossium cōposi-
tio varia est.*

Tabula compositionis ossium.

OSSA HUMANI CORPORIS

inuicem componuntur.

Per articulum, qui est ossium
compositio cum motu. huius
duæ sunt differentie.

Diarthrosis,
quæ est dearticulatio ad
motum manifestum.
diuiditur autem in

Enarthrosim,
Arthrodiam,
Ginglymon.

Enarthrosis fit, ubi rotû
dû aut oblongû caput
in cauû aliquod infe-
ritur: vt est articulatio
femoris cum coxæ dice,
humeri cum scapula,
primæ aciei digitorum
cum ossibus postbra-
chialis.

Arthrodia est, quæ le-
niter cauum, & in su-
perficie, & capitulum
etiam depressum ha-
bet: vt prima cernicis
vertebra cum secunda,
& radius cum cubito.

Synarthrosis,
quæ est coarticulatio cû
motu obscuro: in easdẽ
autem species diuidi-
tur, in quas & *Di-
arthrosis* diuisa est, vide-
licet in
Enarthrosim,
Arthrodiam,
Ginglymon.

Eo verò inter se tantum
differunt, quòd hæ ob-
scurum, illæ manifestû
habent motum.

Nec mirandam est eas-
dẽ res diuersimodè cõ-
sideratas, posse sub di-
uersis in eodem prædi-
camentò generibus col-
locari, nam id quan-
doque in diuersis præ-
dicamentis contingit.
Exempla in hoc gene-
re sunt.

Enarthroseos. Tali os

Per Symphysim, quæ
est ossiû inter se con-
iunctio, siue vnio si-
ne motu. hanc no-
bis visum est diui-
dere in

Suturam,
Gomphosim,
Harmoniam.

Sutura ea compositio
est, quæ in capite ha-
betur in serræ mo-
dum, vt est sutura co-
ronalis, sagittalis, &
labdoides.

Gomphosis est, cum ad
instar clauis os ossi
infigitur: vt sunt de-
tes in maxillis.

Harmonia est ossium
structura per simpli-
cem lineam: vt sunt
commissuræ maxillæ
superioris, et ea præ-
cipuè, quæ in naso ha-
betur, quæque secun-
dum longitudinẽ pa-
lati fertur.

Gingly-

Ginglymos ea est, in qua ossa sese inuicem ingrediuntur, & tum suscipiunt, tum suscipiuntur, vt vlna, siue cubitus cum humero, femur cum tibia, secunda, & tertia digitorum acies.

cum osse cymbam referente, & tertium os brachialis, cum primo & secundo eiusdem. Arthrodia. Tarsi ossa inter se, cyboides cum calce, & quaedam ossa brachialis inter se. Ginglymi. Tali os cum calce, & nonnulla inter brachialis ossa inter se.

Omnia hæc inuicem committuntur.

Synchondrosi,
quæ est ossium unio
per cartilaginem
facta vt videre
est in osse pubis,
pectoris, & ilei,
qua sacro con-
nectitur.

Syssarcosi,
quæ est ossium con-
iunctio appositio-
ne carnis resul-
tans vt inter dē-
tes, & maxillas
cernitur, atq; e-
tiā in articulis,
quos muscoli cir-
cundant.

Syndesmosi,
quæ est eorundem
per ligamentum
compositio, vt in
articulis patet,

Plura sequenti capite vtriusque generis exempla adducemus, ubi explicanda nobis est huiusce nostræ diuisionis ratio, quam illa passim occurrent in vniuersa ossium tractatione.

CAPVT III.

NE fortè quispiam admiretur, quòd in superiore diuisione neque Galenum, neq; Vesalium in omnibus sequuti sumus, ratio reddē-

B

*Cur in ossis di-
uisione neque
Galeni in om-
nibus, neque Ve-
saliū sequatur.*

*Galeni error
vel cōtradictio
potius.*

*Galeni error
alius.*

*Gal. error ter-
tius.*

*Galeni error
quartus, vel cō-
tradictio potius*

Vesaliij error.

da est, quamobrem ab illis dissentiamus. Nam licet Galenum tanquā numen veneremur, Vesalióque in dissectionis arte plurimū tribuamus, vbi cum rei natura cōsentiunt: tamen cū aliquando videamus rem aliter multò se habere, ac ipsi descripserint, veritas eadem, cui magis addicti sumus, nos cogit ab illis interdum recedere. A Galeno itaque nunc discedo, quoniam definiēs Synarthrosim, coarticulationē esse dixit ad motum quamuis obscurum, cuius deinde veluti species enumerat Sutura, Gomphosim, & Harmoniam, quæ omni prorsus motu carēt. Præterea Symphyi tantū adscribit coniunctiones illas, quæ media cartilagine, aut ligamento, aut carne fiunt. Cū tamen articuli quoque omnes ligamentorum ope vniantur, quos ad Symphyim referre non decet, quando ille hæc sibi inuicem opponit, per Articulū, ac per Symphyim. Postremò cū asserat fungosa, ac mollia ossa nullius rei interuentu connecti: & apertè videamus ossa pectoris præcipuè & sacrum constituentia fungosa, & mollia per cartilaginem vniri. Adde quòd in Introductorio, siue medico, maxillæ superioris vnionem sub Symphyi ponit, quā in libello de ossibus ad Harmoniam retulit. Dicendum itaque aut harmoniam speciem esse non Synarthroseos, sed Symphyseos, sicuti nos fecimus, aut artem illū in hoc confuisse. Sed hactenus de Galeno: ad Vesaliū trāsco, qui Symphyim cū Gomphosi, Sutura, atq;

Har-

Harmonia cōnumerat quatuor efficiēs differē-
 tias eius structuræ, vnde nullus omnino motus
 prouenire solet. At rectiùs poterat Symphyseos
 nomine genus intelligere innominatum, quod
 tres illas sub se differētiās cōprehenderet. Quòd
 si diligentius structuram ipsorū ossium consi-
 deremus, alia profectò videbimus ita coalescere
 vt cōnata prorsus videātur, alia cōiuncta, & col-
 ligata rectiùs appellari. Quę cōnata sunt, ea sub
 Symphysi ponenda vidētur, sicuti etiam ipsius
 vis vocabuli prę se fert. Vbi ossium autē cōposi-
 tio ad aliquem motū facta est, ad Articulū non
 referri non potest. Cū igitur quę per Gom-
 phosim, Harmoniam, Suturaque vniuntur,
 eiusmodi sint, cuiusmodi Symphysim esse dixi-
 mus, quid obstat cur sub Symphysi, veluti sub
 natura quadam communi nō reducantur? Iam
 verò cū Vesalius ita distribuatur ossium com-
 missuras, vt alteram fieri dicat alicuius partis
 ope, alteram nullius (pace tanti viri dixerim)
 falsa, & rationi minimè consentanea protulit.
 Nam si quid ego in cadauerum dissectionibus
 diligenter obseruaui. id vnum præcipuè fuit,
 vt aliquando certò scirem, an vsquam reperiri
 posset ossium vnio, siue compositio nullius me-
 dij beneficio: quod equidem (vt ingenuè fa-
 tear) nusquam inuenire potui. sed mihi vel ca-
 ro, vel ligamentum, vel cartilago semper oc-
 currebat. Exemplum verò quod de appendici-
 bus attulit, absurdum mihi, ne dicam perridi-

*Ex ossibus alia
 cum aliis cōna-
 ta, alia coniu-
 cta videntur.*

Vesalijs errat.

*Os quodcumque
 cum alio vni-
 tur media car-
 ne vel ligamēto
 vel cartilagine.*

*Vesalius malè
 putat appendi-
 ces nulla re me-
 dia ossibus uniri*

culum, videtur. Etenim ut appendices in natu grandioribus adeò coalescant, ut discernere nequeas, an partes sint ipsorum ossium, quibus adnatæ sunt, non ex eo tamen sequi debet nullius partis ope fuisse coniunctas, cum per cartilaginem unitæ fuerint: quanquam ea temporis progressu tandem exicceretur, atque aboleatur. Quocirca aliam diuisionis formam exco- gitauimus hoc pacto. Primum diuissimus ge- nus. Humani scilicet corporis diuisionem in articulum, ac Symphysim, quid esset Symphy- sis, ex superioribus patuit. Articulus græcis ἄρθρον. i. ar- ἄρθρον est ossium compositio alicui motui desti- nata, (quanquam Hippocrates arctius articuli nomen acceperit, pro ea commissura, in qua pars aliqua ossis rotunda, caput inquam in pro- ximum ossis alterius sinum committitur) nos articulum naturalem ossis compositionem om- nem vocabimus voluntarij motus gratia factâ, siue is motus euidentis fuerit, ut femoris ad os coxendicis, & capitis super collum, siue obscu- rus, ut postbrachialis ossium ad ossa brachialis: & calcis cum talo, atque aliorum id genus, de quib⁹ alibi dicitur. Ergo pro duplici motu duas articulationis differentias cōstituimus, alteram, in qua neminē motus latere potest, Diarthro- sim, alteram in qua difficilis est exploratu mo- tus, Synarthrosim vocantes. Rursus utranque speciē subdivisimus, tres differentias unicuique tribuentes, nomine easdem, illa tamen ratione disun-

Cartilagines ap- pendicium ran- dem abolerentur. Propria diuissio- nis ossium com- positionis cau- sam reddit.

ἄρθρον. i. ar- ticulus quid sit Articuli nomi- ne quid intelli- gat Hippocra- tes.

Motus perspi- cui exempla.

Motus obscuri exempla.

Diarthrosis quid.

Synarthrosis quid.

disiunctas, qua differunt ipsorum genera. licet enim Enarthrosim tam sub Diarthrosi, quã sub Synarthrosi collocemus, non est tamen vtrobi-
 que eadem : nam Diarthrosis motum perspicuum includet, quæ verò incerti, obscurique motus fuerit, ea sub Synarthrosi ponetur. Id quod in cæteris duabus seruandum erit. Enarthrosim itaque esse dicimus, cùm sinus altus, atque profundus, quem acetabulum suprà vocauimus, caput ossis longum, ac rotundum excipit, quæ articulationis species faciliè apparet in coxendice, & femore, in humero cum scapula, & postbrachialis, ac pedij cum primis digitorum ossibus. Atque hæc exempla illam Enarthrosim explicat, quæ Diarthroseos species est: siquidem in his nō modò manifesti motus, sed omnes etiam motuum differentia deprehenduntur : in talibus enim articulis planissimè cernimus extensionis, ac contractionis motum ad latera, nec non etiam in circulum. multæ insuper aliæ dantur huiusmodi articulationes, de quibus cùm vsu venerit, separatim agemus. Verùm vt faciliùs intelligatur, quid intersit inter Enarthrosim sub Diarthrosi positam, & eam, quæ ad Synarthrosim pertinet, intueamini articulationem tali ossis cum osse cymbam referente, & septimi ossis brachialis, cum primo, & secundo eiusdem. Hæ namque articulationes, quamuis eo modo fiant, quem Enarthroseos definitio præscribit, non ad Diarthrosim tamè,

Non est eadem Enarthrosis sub Diarthrosi quæ sub Synarthrosi

Enarthrosis quid.

Enarthroseos sub Diarthrosi exempla.

Enarthroseos sub Synarthrosi exempla.

sed ad Synarthrosim referēdas iudicabitis: motus enim obscurissimus est, & nisi multa diligentia adhibeatur, vix animaduerti potest. Arthrodia ea est osium coniunctio, quorum alterum capite sit depresso, alterum sinum habeat lenem, ac planum, quem glenem appellant, alterius, quod suscipiendum erat, capiti respondentem, in quo difficile est dignoscere caput ab ipso sinu, cōtrā quàm accidit in Enarthrosi: quo fit, vt non ita euīdēs sit motus in Arthrodia, qualis in Enarthrosi. Verū in ipsa Arthrodia motus datur alio euidentior, quāquam omnes parum sint euidentes, vsque adeo, vt qui minus euīdēs sit, obscurus penitus esse videatur, si cum euidentiori comparaueris. Manifestioris motus Arthrodia, species erit Diarthroseos, obscurioris autem Synarthroseos. Prioris exempla sunt in ea coniunctioe, quæ fit costarum cum vertebris, & earundē processibus. Sensui etenim patet costas constringi, ac dilatari, qui motus quemadmodum & quorsum fiat, non huius est loci explicare. Sed Arthrodiā paulò manifestiorem animaduertes in articulatione primæ vertebræ cum secunda, ac etiam radij cum cubito: obscurioris autem Arthrodiæ exempla sunt ossa postbrachialis cum brachiali, in quibus tamen motus quoquo modo obseruari potest: nam si ad pollicem minimum digitum sensim adduxeris manum ipsam inflectēdo, planè cōspicies postbrachialis ossa, quæ

*Arthrodia
quid.*

*In Arthrodia
differt motus à
motu per magis
& minus obscu-
rum.*

*Arthrodia sub
Diarthrosi ex-
empla.*

Costa constringuntur & dilatantur.

*Arthrodia sub
Synarthrosi ex-
empla primæ.*

*Qui motus sit
proprius osium
postbrachialis.*

quæ alioqui manu porrecta, atque in planum
 extensa, planam, ac rectam figuram obtinebāt,
 circumduci, atque obliquari: qui motus pro-
 prius est ipforum postbrachialis ossium, at mul-
 tō aptius obscuram Arthrodiā, expriment tria
 ossa tarfi, quæ cum nauiformi committuntur:
 & cyboïdes cum calce, ac etiam nonnulla alia,
 in quibus etsi motus aliquis omnino sit, est ta-
 men obseruatu valde difficilis. *Ginglymos ter-*
 tia articuli species est, vbi mutuus fit ossiū con-
 gressus, ita quod in alterutro extāt partes pro-
 minentes, quæ alterius sinum expolcant, par-
 tēsque illæ gibbæ, ac protuberantes vnius ossis
 in alterius sinum immittuntur, & huius cauæ
 partes illius gibbas excipiunt. Itaque fit vtriuf-
 que partis mutuus ingressus. Hæc articulatio in
 motu manifesto, & obscuro inuenitur: mani-
 festus, & euidens *Ginglymos* erit femur cum
 tibia, cubitus cum humero, & alia, obscurus ve-
 rō tali cum calce connexus, & ossium brachia-
 lis: in quibus, si rectē animaduerneris, articula-
 tionis formam offendes. Atque hæc hæcenus
 de articuli partibus, ac differentiis. Nunc sym-
 physim persequamur, quæ ossiū structura om-
 ni penitus motu, cum obscuro, tum etiam ma-
 nifesto caret. Huius tres differentias diximus,
 Suturam, Gomphosim, & Harmoniam, in his
 enim nemo vnquam motum deprehenderit,
 quanquam non defuerunt, qui ausi sunt affir-
 mare cranij ossa, quæ per Suturam committun-

Ginglymos
quid.

Ginglymi sub
Diarthrosi ex-
empla.

Ginglymi sub
Synarthrosi ex-
empla.

Symphysis quid

Symphysis sedi-
visio.

Causa erroris ex
istimantiū ossa
cranij moueri.

tur, moueri motu, (si Dis placet) manifestò, inani specie meo iudicio delusi. Cùm enim cernerent frontis, capitísque cutim, quæ crassa est, & musculosa, altè, atque insigniter in aliquibus moueri motum illū ex ossium dimotione proficisci existimarunt: quemadmodum si quis nasi ossa, quæ per harmoniam vniuntur, motum edere, cum narium pinnas moueri viderit, arbitraretur. Neque enim credendum est futuras capitis laxari, atque ita mouendis ossibus anam præbere, quæ alioqui adedò compactè inuicem in hærent, vt nulla vi laxari possint, nisi quis scalpello diuellere, aut frangere tētauerit, adedò vt in nulla Simphyseos specie motum inesse planè perspiciatur. Sed ad singulas ipsius species deueniamus. Sutura, quæ Græcis *ῥαφή* dicitur, consutarum rerum similitudinem præ se fert, vel contrarij ferrarum occurfus, quo mutuum ingressum faciunt, quādo dentatæ vnus partes, alterius sinibus occurrant. quidam etiam vnguim commissurarum exemplum addunt, non quòd mutuo sese respiciant, sed interstitia illa occupent, ac stipent, quæ inter digitorum vngues resident. At propiùs ad rei naturam accedere videntur, qui ferrarum, quàm qui vnguim similitudinem in medium afferūt, quandoquidem illa rara admodum est, hæc autem frequentissima: cuiusmodi tres sunt in capite. Sutura, quæ in senioribus appendicum more coalescunt, vt vix vestigia appareant: in iunioribus

Ad motū pin-
narum nasi e-
ius ossa non mo-
uerant.

Calvaria Sutu-
ra vix scalpel-
lo diuelluntur.

ῥαφή, id est.
Sutura vnde di-
cta.

Sutura tres ca-
pitis, in valde
senibus vix sunt
conspiciæ.

ribus autem maximè sunt conspicuæ. Vna quidè in sincipite *σεφανεία* dicta, altera verò in occipite dicta *λαμβρόδης*, tertia medio vertice resecta, *δρελίσια*, quasi sagittalis, de quibus suo loco latius agetur. Nō me latet apud aliquos plures tribus futuras dari, qui voluerunt squamosa temporum ossa per futuram copulari. Equidem non negarem in quibusdam caluariis talia ossa dentatum esse resecta, vt faciliè coniicere possis instar ferrarum esse coniuncta, sed id in paucissimis, ac in superficie tantum ipsorum ossium obseruavi. Quamobrem vera talium ossium vnio, vt in pluribus ad Harmoniā potiùs, quàm ad futuram referenda videtur. est autem Harmonia ossium structura per simplicem lineam, vbi scilicet neque adsunt sinus, neque tubera, & nonnunquam ne asperitates quidem reperiuntur: quod tamen non tollit, quin veteres futurarum voce Harmoniam quādoque intellexerint: cū videlicet ossa rupta sibi mutuo per harmoniam occurrunt: quanquam hic occurfus non ad amussim per simplicem fit lineam. Adsunt enim asperitates quædam sese mutuo ingrediētes: ideo mixta potiùs est vnionis forma harmoniæ, futuræque particeps. Verū id obiter sit dictum, quando sermo institurus est, de naturalibus ossium compositionibus, nō de iis, quæ casu, vel arte, licet natura præuia fiunt. Simplici ergo linea, atque harmoniaca vniuntur nasi ossa, & illa, quæ palatum constituunt,

Sutura σεφανεία quæ.

Sutura λαμβρόδης quæ

Sutura δρελίσια quæ.

Ossa squamosa cum vniuntur per Sutam non est profunda.

Ossa squamosa vt in pluribus vniuntur per harmoniā quæ per Sutam. Harmonia quid sit.

Sutura nomine veteres quandoque harmoniam comprehenderunt.

Ossa fracta vniuntur forma quadā harmoniæ, & Sutura particeps.

Harmonia exempli.

Gomphoseos exemplum.

Alueoli dentium.

Maxilla quandoque instar ossis indurefcit callo, itaque dentis munere fungitur.

Synchondrosis quid significet, Synneurosis quid.

Nerui nomine ligamēta comprehendunt veteres.

Syndesmosis quid.

Syffarcosis quid.

Synchondroseos exempla.

ac secūdum totam ipsius longitudinem feruntur. Huiusmodi etiam sunt reliquæ omnes maxillæ superioris commissuræ, cuius ossa sola linea distinguuntur. Porro Gomphosis in solis dentibus locum habet. ita enim illos infixos in maxillas videmus, quemadmodū clauī ligneis tabulis, quibus reuulsis inania foramina conspiciuntur: sic dentes suos habent alueolos, ex quibus extrahi solent, cū vfu venit. In viuo capite non ita apparent, siquidem carne obducuntur, aut gingiua contracta replentur, quæ subinde callosa fit, atque ita indurefcit, vt dentium munere plærunque fungatur. At inde mortui caluaria nuda, atque exiccata conspiciuntur in maxillis alueoli, è quibus leui opera dētes educuntur. Iam verò cū ossa omnia alicuius rei beneficio componantur, licet aliis aliter videatur, rursus affirmamus ossa inter se tribus mediis iungi: aut enim intercedit cartilago, quā vnionem Græci Synchondrosin appellāt, aut nerui, ligamentiue ope cōiunguntur, Synneurosisque dicitur (nerui enim nomine ligamenta quoque veteres intellexerunt) sed ramen differūt, ac rectiūs dixeris ligamentum, quod Græcis Syndesmos est, & propterea Syndesmosis: aut carnis appositione vnio ipsa fit, & Græco nomine Syffarcosis nūcupatur. Synchondrosi copulātur pubis, ac pectoris ossa, vertebræ ipsæ, & partes sacrum os constituentes, & quæ cum sacro committuntur, ac demum appendices suis ossibus per

per cartilaginem, iunguntur. Synneurosi componuntur omnia illa ossa, in quibus cernere est ligamenta, quæ per eam partem prodeunt, quæ solent appendices suis ossibus adhærescere. Talibus enim ligamenti inuestiuntur ossa ad articulos colligandos. Prominent quoque, atque enasci quodam modo videntur valida ligamenta in mediis quorundam ossium capitibus, per quæ suis sinibus vinciuntur, vt tenaciùs inhæreant, qualia extant in articulatione femoris cū coxendice, atque etiam inter femur, & tibiam, neque alibi reperire licebit: nisi addideris ligamentum, quo dens secundæ ceruicis vertebræ occipiti nectitur. Carne autem veluti glutine quodam firmatur dentes in suis alueolis, idque per Syssarcosin fieri dicitur, femoræque carne neque cohærere, neq; stare vlllo modo possunt. Aristoteles existimauit articulos quoq; per carnem vniri, vbi scilicet assideant muscoli circumdantes, & valli instar illos muniētes: cuius sententia, si cui fortè arrideat, non multum laboro. Sed hæc de diuisione compositionis ossium fat sunt, ad singula describenda accedamus.

De Capitis ossibus, siue Caluaria.

C A P V T V.

A C A P I T I S ossibus exordiemur, quoniam caput in corpore principem locum tenet, quòd in eo residet cerebrū, cui principatus iure optimo debetur: quanquam Arist. multò aliter senserit: & quòd hinc humanæ fabricæ de-

Synneuroseos exempla.

Ligamenti ex ossium capitibus enascentis exempla.

Syssarcoseos exemplum.

Aristotelis opinionē de vniōne articulorum per Syssarcosin neque laudat, neque vituperat.

Cur ossium anatomē a capitis ossibus incipiat

Cerebrū est princeps membrum totius corporis contra Aristot.

scribendæ initium rectè sumi possit, ut à nomine ipse capitis, quasi principij cuiusdam admonemur. A capite igitur exorssi, illud primum pro virili discutiamus, quod diu præclara ingenia fatigavit, oculorumne, an cerebri causa caput natura construxerit? Oculorum gratia factum sensit Galenus, postquam scarabeorum, cæcorum, ac quorundam aliorum id genus animalium oculos est contemplatus, quibus cum nullum adesset caput, in quo tanquam in arce summa oculi collocarentur, vnde longiùs prospicerent, processus quosdam natura largita est, qui capitis vicem gererent. Veruntamen capitis figuram rectè considerantes secus iudicabunt. licet enim Galeno cõcedatur necessarium fuisse in suprema parte corporis, ceu in altissima specula oculos constituere, atque illos ideo, capitis sedem sibi tanquam propriam asciscere, in cuius sinibus manerent vndique tecti, ac minuti: ne ab externis iniuriis læderentur, non propterea tamen fatendum fuerit ad hos tantum usus caput ipsum ea magnitudine, ea figura, torque ossibus fuisse constructum. quam formam quis non videt cerebri etiam gratia fuisse conditam? Immo verò cerebri potius quam oculorum? quid enim obstabat cur summus opifex caput in duos duntaxat prominentes processus diduceret, in quibus oculi tanquam speculatores insiderent, atque hos ipsos quemadmodum in cæcis duriores efficeret? vel si molliores omnino

*Questio utrum
caput sit gratia
oculorum vel ce-
rebr.*

*Gal. opinio ocu-
lorum gratia con-
struxit caput.*

*Galeni impu-
gnatio.*

*Probat caput
factum potius
gratia cerebri
quam oculorum.*

*Cæcorum ocu-
li duri.*

nino futuri erant, quales humani, alia præfidia, ac munimenta pararet, per quæ tutissimi ab externis incommodis redderentur. Mihi igitur nunquam fiet verisimile oculorum causa caput fuisse conditum, ad cerebrum potiùs talem formam spectasse crediderim, nèpe ad illud, quod futurum erat domicilium rationis, quâ ratione homo diuinum propemodum animal iudicatur. est enim virtutum omnium, animaliumque facultatû regina, cui vt præstò esse possent sensus omnes veluti satellites, ac ministri, in ipso capite, suas singuli sedes obtinuerunt: quod quàm appositè factum fuerit, suo loco explicabitur. Cùmque sentiendi vis per nervos deferatur, quorum fontem, atque originem esse cerebrum cum Galeno opinamur, quis nõ videt maiorem inesse cerebro quàm sensibus dignitatem, cùm à cerebro sensus dependeant, non à sensibus cerebrum? Cerebro verò caluariæ formam inseruire ex eo maximè patet, quòd pro eius figuræ diuersitate cerebri constitutionem physici perspectam, atque exploratam habent. Sed ad alia utiliora properamus. Capitis ossa neque prorsus sunt solida, neq; omni ex parte fungosa, rara, ac pumici similia, ex hoc enim fragilem naturam, & leuissimæ cuique iniuriæ obnoxiam sortita essent: ex illo verò onere satis molesto premerentur. Præterea huiusmodi substantia minimè transpirabilis esset, sicuti expediebat. caput nanque futurum erat veluti operculum

Cur cerebri gratia conditum caput.

Ratio est virtutum omnium regina.

Cerebrum est origo nervorum.

Cerebrum dignius sensibus. Cerebro craniû inseruire.

Capitis ossa qualia.

Capitis ossa cur non fungosa. Capitis ossa cur solida omnino non sunt facta. Capitis ad olla operculum comparatio.

*Cur caluaria su-
turis distincta
sit.*

*Historia iuue-
nis mortui ob
dolorē capitis,
in quo suturae
non erant con-
spicuae.*

*In viris & mu-
lieribus capite
mire dolentibus
suturas aug-
mentatas inveni-*

quoddam ebullienti vasi superpositum, non se-
cus atque calidæ domus rectum. Multis itaque
vaporibus, atq; excrementis continenter ad ce-
rebrum ascendentibus, nisi exitus pateret, vt re-
liqua omittam incommoda, nemo diuturnam
sibi vitam polliceri posset. Idcirco prouida na-
tura perforatam esse voluit caluariam, variisque
futuris distinctam, vt purgando à recrementis
cerebro nusquam occasio deesset. Quòd autem
futuræ hunc vsum inter cetera præstent, præter
authorum probatissimorum, ac præcipuè Gale-
ni testimonium, nos etiam ipsa experientia do-
cuit, vt mox audietis. Patauij superioribus an-
nis iuuenem quendam propinquorum volun-
tate ad me delatum domi in magna amicorum
corona secui, qui diutino capitis dolore vexatus
nullis remediis sanari potuerat: in cuius calua-
ria vix suturarum vestigia apparebant adeò cō-
pacta, vt in vnum coacta capitis ossa videren-
tur. Quamobrem pro comperto omnes, qui
tunc aderant habuerūt, non aliundè ingentem
ac ferè continuum capitis dolorem profectum
esse, quàm ex arctissima illa ossium compo-
sitione, ex qua nullus exitus patebat fumidis illis,
crassisque vaporibus, qui & perpetuò doloris
causa fuerant, & tandem mortem intulerant.
Sed neque semel id mihi contigit experiri: com-
plures etenim secui, qui dū viuerent, in frequē-
tem capitis dolorem incidere solebant, in quo-
rum caluariis exiguas futuras, & eas coagmen-
tatas

tatas inuenimus: neq; in viris modò, sed etiam in muliere: quod mirum fuit, vt vix credibile. nudatum enim, ac decoctum illius caput ferè sine futuris offendimus. & hæc pariter multo, magnòque capitis dolore quàm diutissimè affecta, atque afflicta, postremò phrenesi laborauit, & mortua est. Certissimum ergo argumentum nobis erit capitis futuras non modò conferre ad salutem corporis tuendam, verùm eò plus conferre, quò maiores, laxiorésque fuerint. Quare Cornelij Celsi sententiã ego nunquam approbare potui asserentis capita sine futuris non modò validissima esse, ac firmissima: sed etiam ab omni penitus dolore immunia, eaque reperiri in calidis, & æstuosis regionibus. Nam ille extrinsecas tantùm causas caput lædentes animaduertit. Quòd si Celsi vera esset sententia, imbecilliora essent capita, & ad patiendum promptiora, quæ insignes futuras haberèt, quàm quæ aut exiguis essent prædita, aut eisdè prorsus carerent. Cùm verò contrà res habeat, maiùsque impendeat damnum ipsi cerebro ab internis fuliginosis recrementis, quàm ab externis noxis, concludendum est à dolore longè tutiora esse capita futuris amplioribus, quàm iis ipsis destituta, aut exilibus admodum, arctissimisque intersecta. Præterea cùm cranium sit veluti galea quædam, ac propugnaculum cerebro, primò illud considera carne, ac cute quàm parum munitũ fuisse, nisi obducto etiam osse,

*Capitũ futura
quo maiores ce
meliores.*

*Cornelij Celsi o-
pinio de bonita-
te capitis abs-
que futuris, re-
probatur.*

*Caput amplio-
ribus futuris est
dolori minus ob
noxium.*

*Cur craniũ ef-
ferum.*

*Cur os capitis
multiplex.*

*Cur suturas ha-
beat caput.*

Prima ratio.

2

3

*περιρράγιον
gignitur à dura
membrana.
Arist. opinio de
canum calvaria
absque suturis
ref. II. & ar.*

quod durissimum, ac densissimum esset. Deinde cum caput alioqui osseum graui aliquo ictu percussum labefactari, frangique posset, ideo multiplex fieri oportuit, ut si quando pars aliqua frangeretur, aliæ partes integræ seruariëtur, cum ictus ille longius protendi nequeat, quàm quò fines percussæ partis pertinent, quod secus eueniret, si ex vnico osse caluaria constaret. id quod exemplo facili perspicuum fiet, si lapide, aut ligno fictile vas, vitreumue feriat. sæpe enim contingit, ut vna parte contusa, scissura ad alteram vsque permeet: ut penè totum ipsam vas abrumperetur. Ossa igitur capitis futuris non iniuria distincta sunt, ut illud iniuriis minùs pateret. Suture autem non illud solùm præstant, ut per ipsas transmitti possint humida recremèta, sed etiam ut prohibeant, ne vnico ictu nisi illud grauissimum sit: petita caluaria vndique confringatur. Ad has vtilitates accedit tertia, ut scilicet inde pendeat interna membrana, quæ durior est: ac rursus per easdem suturas effusa, membranâ alteram ex se gignat, quæ cõuexam caluariæ partem circundat, & ideo à Græcis περιρράγιον dicitur. Sed de hac posterius. Illud interim non omittendum Aristotelem falsò tradidisse canum capita continua, ac sine futuris existere, cum vel lippi ipsi cernât in canum caluariis insigniores, atque elegantiores suturas, quàm in humanis apparere. Consimile illud est, quod quidam literarum monumentis tradidè-
re, ho-

re, homines caluariis continuis, nullisque futu- *In Perfide cal-*
 ris distinctis in Perfide reperiri. At nos ean- *uarias futuris*
 dem in eadem specie naturam semper esse exi- *carere falsum*
 stimamus: neque magni æstimamus, si in ali-
 quibus indiuiduis aliquid euariet. Etenim quã-
 uis conspiciamur eorum, qui diutissimè vixe-
 runt, appendices, atque illas in ossium, quibus
 adnatæ fuerant, portionem abiisse planè perspi-
 ciamus, adeò vt neque separari, neque dignosci
 queant: futuras itidem in senum capitibus ple- *Appendices in*
 runque abolitas, ac deperditas: tamen negan- *valde senibus*
 dum nullo pacto est appendices dari, vel sine fu- *non possunt ab*
 turis caluarias esse: quemadmodum in infanti- *ossibus separari*
 bus partes aliquæ tenerrimæ cartilaginis natu-
 ram sapiunt, neque dum ossæ, nisi aliquot pòst *Sutura in val-*
 mensibus fiunt. Ecquis autè dicere audeat par- *de senibus ali-*
 tes easdem, non ossa, verùm cartilagines esse: *quando deper-*
 Sed ad rem redeamus. Caput cùm dicimus, par- *duntur.*
 tem supremâ nostri corporis intelligimus, ocu- *Ossium partes*
 lorum, cerebrîq; gratia factam, cuius figura na- *aliquæ in pueris*
 turalis rotunda, oblongaque esse debet, nempe *ob mollitiæ car-*
 ad oblongæ spheræ vtrinque depressæ similitu- *tilagines viden-*
 dinem, eam ab vtraq; maxilla distinguimus, & *tur.*
 modò caluariam, modò cranium appellamus
 ex pluribus ossibus, vt suprà attigimus, meritò
 constructum, atque ex iis, quæ interiùs, atque
 exteriùs densam, & lenem superficiem haberet,
 cùm meditullium fungosum sit, ac pumici per-
 simile. Nam si substantiam vndique asperam a- *Caluaria sub-*
 depta essent, nihil impedimento futurum erat, *stantia cur not-*
fit aspera.

C

quo minus adhærentes membranas læderent, atque eroderēt : cauernosa verò inter vtrunque squamam ossa capitis extiterunt : non modò vt leuiora forent , sed etiam vt medullam continere possent, suum ipsorum pabulum, ac nutrimentum. Perforata verò sunt crebris foraminibus exiguis illis , nullumque ordinem seruantibus, vt per ea pateat aditus venulis , atque arteriolis , quæ sanguinem pro alimento, spiritumque pro calore fouendo, ac vita conseruanda deferunt . Hoc autè interstitium pumicosum causata fuit, vt nōnulli dixerint ex duobus parietibus caluariam conditam esse , quas tabulas vocant, duas illas crustas, seu squamas intelligentes, quæ duræ sunt, & aliquantulum crassæ, atque vndique spongiosam, ac medullosam illam substantiam claudunt . Ossa verò ipsa suis vndique coniuncta sunt terminis, quos ferè omnes lato vocabulo Suturas nominarunt. de quibus hîc nobis agendū est, cū plurimū cōferant ad capitis ossa explicanda. Suturarum aliæ sunt legitimæ, aliæ nothæ, quæ cū potius commissuræ quædam sint, ad harmoniam magis, quàm ad Suturam referendæ videntur. Octo itaque omnes sunt, quinque spurix, propriæ, ac veræ suturæ tres, ex quibus vna est, quæ in occipitio, & in eius basi, quæ vergit ad vtrunque aurem, diuellitur, latèque disiuncta in ipso ascensu sensim angustior redditur, atque in cuneum coit græcæ literæ Δ formam constituens, itaque lab-

doidis

*Cur media pars
ossium calua-
riæ fungosa est.*

*Cur ossa capitis
sunt crebris fo-
raminibus pra-
edita.*

*Duo caluariae
parietes.*

*Tabula ossium
capitis.*

*Due crustæ &
squamæ calua-
riæ quæ.*

*Suturæ quæ di-
cantur.*

*Suturarum co-
gnitio in ossium
capitis explica-
tione necessaria
est.*

*Suturarum di-
uisio.*

*Suturæ non le-
gitimæ sunt har-
monia.*

*Suturarum nu-
merus.*

*Labdoidis Sutu-
ræ descriptio &
usus.*

ðoidis nomen adhuc retinet : dirimit ossa fin-
 cipitis, & temporum ab osse occipitis. Altera in
 sincipite posita, è regione labdoidis, antero-
 rem supra frontem circuli speciem ambit, &
 quia vel similis est corollæ, vel quia coronæ ibi
 potissimum locari solent : ideo coronalem om-
 nes vocant, & stephania à Græcis nominatur di-
 rimens ossa sincipitis ab osse frontis. Tertia per
 verticem rectâ incedit, & quodammodò par-
 tem caluariæ dextram à sinistra seiungit. Hanc
 ὀφειδία Græci, nos sagittalem, & rectam ap-
 pellamus. παρόδοσιν quoque vocant, cùm vir-
 gæ similitudinem referat. & ea est quam Gale-
 nus in libello de ossibus seruari semper affirmat:
 vbi ex professo agit de variis capitum figuris.
 Reliquas verò duas testatur deleri, aliquando
 ambas, aliquando alterutram tantum. Ego verò
 (pace tanti viri dixerim) vtrunque falsum esse
 affirmare ausim, sexcenta millia capitum inspi-
 cere manibusque attrectare mihi per otium li-
 cuit multis in locis, ac præsertim Florentiæ in
 Diuæ Mariæ Nouæ amplissimo Xenodochio,
 vbi per innumera propemodum secula demor-
 tuorum ossa in elegantissimas strues digesta
 seruantur : necnon Romæ in communi gen-
 tium omnium cœmeterio, quem Campum san-
 ctum nominant, & tamen ne vnū quidem cra-
 nium cernere potui, quod figura non naturali
 conitaretur, aut cui Sutura illa deesset. Sciendū au-
 tem, vt suprâ attigimus, caput eam figurâ à na-

*Coronalis Sutura
 re descriptio &
 usus.*

*Sagittalis Su-
 tura nomina,
 descriptio, &
 usus.
 Gal. lib. de ossi-
 bus seruari sa-
 gittale in omni
 capitum figura.*

*Gale. opinio de
 capitum diuer-
 sitate in futuris
 experientia duce
 re probatur.*

*Sancta Mariæ
 Nouæ hospitale
 Florentiæ.*

*Campus San-
 ctus Romæ.*

*Capitis figura
 naturalis quæ.*

*Capitis figura
varia futurarū
non variat nu-
merum.*

*Suturarum dif-
ferentia.*

*Sagittalis in vi-
ris & mulieri-
bus quandoque
ad nares usque
descendit.*

*Aristoteli irri-
det qui mulie-
rum Suturam
circularem posuit
Squamosarum
Suturarum de-
scriptio.*

tura obtinere: ut sphæram vtrunque leuiter cō-
pressam referat: ita ut in longum aliquo pacto
protuberet. ab hac autem forma nōnullas eua-
tuare comperies, ut modò vertice sint acutiore,
ac magis fastigiato, modò fronte prominentio-
re, modò pressius contracta, quod pari etiam ra-
tione de occipitio dici potest. Lateribus item
constat modò magis, modò minus compressis,
quæ tamen formæ omnes naturales sunt, neque
adeò differūt, ut has naturales, illas non natura-
les appellauerit, seruariq; in his semper cognos-
ces futuras omnes, licet hæ quoque nōnihil dif-
crepent. Atque ut prætermittamus, quòd in a-
liquibus grandiores, ac laxiores appareant, in
aliquibus exiles, & compactæ magis, quemad-
modum suprà diximus: illud est tamen adno-
tandum, in quibusdam Caluariis tum virorum,
tum mulierum quicquid alij dixerint, sagitta-
lem ipsam per mediam frontem, usque ad nasi
summum descendere: sed hoc rarò admodum
accidit. Quamobrè vix satis mirari possum A-
ristotelis diligentiam, qui differentiam in viris,
& mulieribus quòd ad futuras, quæ nulla est, ob-
seruauit. Sequuntur duæ futuræ in decliui ca-
pitis longitudine sitæ, à sagittali æquè distantes,
quæ ab extremitate descendente coronalis cir-
culari quodam ductu supra aures feruntur, & in
quibusdam humillimam labdoidis sedem per-
tingunt, in nonnullis verò os mammillare
non transeunt, à qua non magni refert, si alios
anato-

anatomicos sequentes principium sumamus harum futurarū. Sat enim esse debet, si cum rei veritate descriptio consentiat. Hæ duæ futuræ vtrinque scilicet vna, cūm squamosa ossa constituent, atque conglutinent, squamosę & ipsę dicuntur, ossa verò hæc squamosa meritò nuncupantur, quoniam instar squamarū componuntur. Quod enim exterius ab aure ascendit, paulatim attenuatur: quod verò subest, descendendo fit tenuius, Aut alteri pars, tenuior parti alterius crassiori incumbat, & æquali proportionē hinc inde agglutinetur. Hæc forma tibi faciliè occurreret: si piscium squamas, aut ferreas loricæ laminas aliis alias incumbentes & inhærentes intueberis. Verū prius quā ab his ossibus discedas, illud adnotabis, quod extrinsecus affidet, illo durius esse multò, quod est suppositum, cūm illi natura hoc ipsum tāquam propugnaculū cōstituerit. Quinque futuræ iam explicatæ ipsius capitis sunt propriæ: sexta sutura illa erit, quæ ab extremitate labdoidis deducta per medium lapidosorū ossium fertur tendens ad capitis basim, vbi caput prima cum vertebra iungitur, quam partem Galenus additamenta labdoidis futuræ nuncupat. Inde itaq; incipiens sexta sutura sursum vtrinque repetit ad caua tēporum, vsq; ad fines coronalis, ac reflexa deorsum ad extremos dentes, atque ad palatum: & ibi capiti, ac maxillæ superiori communis est, vniuersūque os cuneale in se comprehendit.

*Ossa squamosa
cur dicta sint,
& qualia.*

*Squamosorum
osium figuram
aliis exemplis
illustrat.*

*Ex ossibus squa-
mosis cur superius
est durius.*

*Sutura sexta
descriptio.*

*Additamenta
labdoidis quid
sint Gal.*

*Vbi sexta Sutura
cōmunis est
cap. & maxillæ
superiori.*

*Septima Sutura
descriptio.*

*Octaua Sutura
descriptio.*

*Sutura extra
conspicua sent,
intra uix appa-
rent.*

*De ossium capi-
tis numero.*

*Gal. lib. de ossi-
bus Aristot. de
Par. Animalis.
Galenus 1. de V-
su Partium.
Vesal. opinio de
numero ossium
capitis lauda-
tur.*

*Bregma quid
sit.*

*Aristotelis opi-
nio de bregma-
te.*

*In Bregmate
pueri Diafoles
& Sistolés con-
spicua est.*

Septima propria os capitis, quod octauum nu-
merabitur, ab osse frontis distinguit, ab omni
parte illud separans. Octaua, & ultima futura
nobis fuerit, quæ à cauis temporum ortum ha-
bet, ubi sexta, quæ reflectitur, rectâ incipit de-
scendere, ac per mediam minoris canthi regio-
nem, mediâmq; oculi orbitam serpit, & ad sum-
mum nasum transversum delata maxillam supe-
riorem à fronte diuidit: at in interna caluaria
iuxta basim os cuneale ab osse frontis disiungit.
Et hæc de futuris breuiter dicta sint. in quo vnū
illud animaduertendum est futuras omnes ex-
trinsecus magis apparentes esse. Intrinsecus e-
nim futurarum imaginem non referunt, sed in
harmoniam potius degenerant. Reliquum est,
ut tandem capitis ossa explicemus. Ossium cal-
uariam constituentium numerus non est idem
vbique apud Galenum. Nam in libro de ossibus
sex enumerat, & hoc ei cum Aristotele conue-
nit: at in x. 1. de Partium utilitatibus septem ef-
se dixit. Ego verò octo vnâ cum Vesalio nu-
meravi. Duo sincipitis siue bregmatis. bregma
enim dicitur pars superior cranij iuxta futuram
coronalem, quæ infantibus, ac nuper natis te-
nerrima est, paulatim autem durefcit, ita ut tem-
poris progressu ossea fiat. Aristoteles obserua-
uit, pueros non prius vocem dearticulare posse,
quàm vniuersa caluaria in os concreuerit. In
bregmate, cum adhuc molle est, Sistolé, ac Dia-
stolem planè perspicimus: id quod nobis opti-
mè

mè confirmat perpetuò constrictionis, ac dilationis motu cerebrum donari. Præterea sciendum est vulnera in bregmate accepta lethalia esse solere: ossa autem hæc illa sunt, quæ inter labdoidem, coronalemq; futuram clauduntur, quæ sagittalis dirimit, atque interfecat: itaque utrinque alterum constituitur, ambo verò descendunt in vnionem squamosorum ossium. & quadrilateram fermè formam habent, atq; hoc modo circumscribuntur, superiore parte per rectam penè lineam à sagittali, anteriore à coronali, posteriore à labdoide, inferiore autem à squamosis cōglutinationibus. Tertium os quod occiput vocamus, à futura labdali fines habet, præterquàm quòd in basi per sextam futuram transuersim incidentem ab osse sphenoide disiungitur. Hoc os partibus constat inæqualibus, aliis quidem crassioribus, aliis verò tenuioribus: in media enim basi crassissimū est, necnō etiam ab eo foramine, per quod in spinalem medullam cerebrum deriuatur, insurgit prominentia quædam, quæ sursum ad summum vsque ascendit: vt vbi os validius fieret. Ergo si quando in supinum quis laberetur, minus ex eo casu pateretur ossis huius robore munitus. semper enim natura conseruādi operis sui studiosa vbi maius periculum impendet, ibi quoque maiora struit præsidia. Cū itaque ictus occipitis neque propulsari possent, neque oculis præcaueri, ossis crassitiē munimēti instar esse voluit. Vt videatis

Cerebrum motetur necnō dilatationis & constrictionis. Bregmaris vultura lethalia.

Bregmaris ossis descriptio.

Occipitis circūscriptio.

Cur in occipite prominentia sit.

Cur occipitis os crassissimum.

Arist. opinio 3. de hist. Animal. quod occiput sit tenuissimū reprobatur. quàm longè erret Aristot. qui primo de animalium Hist infirmissimum, tenuissimūque ossium omnium occiput esse dixit, reliquæ partes ab eo, quod diximus, tuberculo tenuissimæ quidem sunt: sed admodum densæ, ac solidæ, neque excarnes, siquidem à musculis teguntur posteriorem colli sedem occupantibus. In hoc ipso osse cerebellum residet, neque vlllo pacto est

Aristoteles falsū putavit occiput esse inane. Vesalius falsò Galen. citat in lib. de ossibus.

inane: sicuti falsò asseruit Aristoteles. Vesalius Galenum inquit in calce libelli de ossibus temerè scripsisse in cerebro quoddam os dari, idque esse processum illum in canibus conspicuū, qui inter cerebellum ac cerebrum iacet. Sed falsò Galenum citat hoc loco Vesalius. nusquam enim, quod ego viderim, huius ossis mentionem

Occiput constat quinque lateribus non tribus ut Gal.

Galenus fecit. Occipitium iam à nobis descriptum non tribus lateribus, ut Galeno placuit, sed quinque mihi constare videtur: quorum duo prima incipiunt ab infima parte suturæ labdoidis iuxta temporum ossa, & sursum à sutura nunquam declinantes ascendunt, donec ad mucronem eiusdem suturæ coeant. duo verò alia ab eiusdem suturæ calce secundum os mammillare, ac deorsum tendunt vsque ad eam lineam, seu futuram, quæ dirimit occiput à sphenoide, cuius suturæ transversim deductæ beneficio quintum occipitis latus necessariò conficitur.

Occiput in infantibus nunc quinque nunc septem ossibus constare videtur.

Scire insuper licet occiput in adultis vnicū esse: at in pueris ex quatuor, quinque, & septem ossibus constructum videri. Ad amplum enim foramen,

foramen , per quod medulla dorſi egreditur, quatuor diſcrimina apparēt, quibus in quatuor partes os ipſum diſiunctum dixeris. Ex his autē interſitiis effluit cartilago, quæ ligamenti vice caput primæ, ac ſecundæ vertebræ cōnectit, vt moles tanta capitis paruis oſſibus firmiùs hære poſſet : de qua articulatione miranda multa refert Gal. lib. de Part. Uſu x i i. Sed de his ligamentiſ plura ſuo loco dicemus. Illud poſtremò animaduertendum eſt ab ipſo ſinu dorſalis medullæ iuxta occipitis baſim prominere duo tubera, longa illa quidem, & cartilagine in cruſtæ modum obteſta, verùm minus acuta, quàm cenſuit Galenus, qui illa coronæ aſſignauit, quæ ideo facta ſunt, vt immittantur in ſinus primæ vertebræ ad capitis articulationem conſtituendam. Quartum eſt os frontis, quod ſimplex atque vnicum eſt, exceptis caluariis quibus recta futura, ſiue ſagittalis uſque ad ſummū naſi perſtingit, quod tamen rarò inueniri diximus. Proinde vnicum os frontis, quale in omnibus ferè comprehenditur, circumſcribemus. Illud quidem primum coronali futura à ſincipitis oſſibus diſiungitur, à cuneali autem diffidet ea futura, quam ſextam fecimus, præcipuè quæ per temporum caua ſubiugalibus tranſiens, & coronalis ſinibus accedēs ad interna penetrat: vbi perſpicuum eſt, quod ponimus diſcrimen. Tertiò ſeiungitur per ſeptimam futuram ab oſſe capitis octauo. Vltimò à cuneali, ac etiam à maxilla

*Occipitis mul-
tifiſi in pueris
utilitas,*

*Gal. 12. de Uſu
Part. capiti-cū
prima & ſecū-
da vertebra ar-
ticationem
effert.*

*Tubera duo in
occipite qualia
& cur talia.*

*Tubera duo oc-
cipitis non ſunt
vt coronæ con-
tra Galen.*

*Os frontis ſim-
plex.*

*Quibus os fron-
tis duplex eſt.*

*Oſſis frontis cir-
cumſcriptio.*

superiore, cuius interuentu futuræ, quæ à cauis
temporum orta per medias oculorū sedes per-
reptat, vsque ad summum nasum peruenit, vbi
supercilia desinunt. os frontis crassum est, sed
non æquè ac ipsum occipitium, tenuius tamen
se ipso redditur, vt in oculorum regione. atque
vbi cum octauo osse committitur, ac tandem
supra supercilia, vbi veluti duas in partes didu-
citur : vt sinum amplum ibi conficiat ad aërem
continendum, qui sinus ferè semper duplex re-
peritur, tam ad dextrā quàm ad sinistram ver-
gens : quod ita esse in publicis, priuatisque dis-
sectionibus obseruauī. hanc cauitatem Galenus
ignorauit. Frontis ossis figura rotunda est, qua-
lis sphaeræ compressæ portio esse debet. os istud
quà committitur cum verticis ossibus, & sagit-
tali futuræ occurrit, tenuius est, & infirmius,
neque mirum est, cū in nuper natis pars illa
membranea sit, qualem paulò suprā diximus
esse sincipitis portionem coronali futuræ finiti-
mam. Sequuntur ossa temporum, quæ superio-
re parte, quam sagittalem spectant, squamosis
agglutinationibus circumscribuntur. Posteriore
autem ab additamentis futuræ labdoïdis, & à
sexta futura, quæ infimam quoque eorundem
offium partem à Sphenoïde, anteriorem verò
à maxilla superiore disiungit : ossa hæc ad trian-
gularem figuram Galenus reuocauit. Sed ego
cum Valsalio potius, circularia dicerem : cum
talìa maximè videantur superiore sui parte, nisi
hanc

*Ossis frontis sub-
fractæ qualis.*

*Sinus amplus
in osse frontis su-
pra supercilia.*

*Gale. ignorauit
cauitatē in osse
frontis.*

*Os frontis ubi re-
nuius & cur.*

Ossa temporū.

*Temporalium
ossium figura.*

hanc formam multi processus obscurarent, & primùm mammillaris, de quo etiam suprà meminimus, rupis similitudinem referens. Mammillaris ideo nuncupatus, quòd vaccini vberis formam imitetur, Græcis *μασσειδής* vocatur, qui processus nō solūm musculorum insertioni deferuit, de quibus postea dicetur, sed etiā vt intus excauatus amplam sedem relinquat auditus organo apprimè necessariam. Ideo vacuum illud intus reperiās, ac diuersis veluti speluncis excauatum. Deinde non procul hinc erumpit processus alter in eiusdem ossis basim implan-
tatus, pertenuis, longus, ac durus, qui diuersis nominibus donatus est pro diuersarum figurarum ratione, quibus comparatur. Ab acus enim imagine *βελονοειδής*, à styli scriptorij similitudine *γραφοειδής*, vel *συλοειδής*, ac demum à galli calcaris specie *πλήκτρον* appellatur, nos vbique styloidem dicemus. cuius nomine, quidā perperam intellexit totam eam partem, per quam meatus auditorius in cerebrum ducitur, & hūc Galeni testimonio *βελονοειδή*, seu *γραφοειδή* nūcupari asserit. Adest quidem processus alius iuxta hunc ipsum in longum protuberans interiore caluariæ parte, in quo effingitur labyrinthus, reflectendis aëris ictibus quàm appositissimus, auditorium sinum excipiens: sed non is est, quē acui, aut stylo similē esse diximus. Ad hos processus accedit quart⁹, qui portio est iugalis ossis, de quo sequēti capite agemus: & ab auris meatu

*Mammillaris
processus etymologia.*

*Mammillaris
processus usus.*

*Idem est βελονοειδής pro
cessus.
γραφοειδής
συλοειδής &
πλήκτρον.*

*Error cuiusdā
de processu styloide.*

Processus tertius ossis temporalis descriptio.

Processus quartus ossis temporalis.

incipit, in primūque maxillæ superioris definit, quo cū per obliquam suturam coniungitur, & pontis quodammodò formam constituit superequitantis caua temporum. Ab ortu eiusdem processus iuxta meatum auditorium sinus est altus cartilagine incrustatus, non oscitanter omittendus, in quem inferi, atque articulari solet processus alter maxillæ inferioris, qui longior est: quem sinum non rectè Galenus descripsit libro de ossibus. ponitur namque inter aurem, & processum constituentē iugalem. Iam verò temporum ossa infrà ad basim anfractuosa sunt, & aspera rupes ceu lapides imitantia, vnde græci λιθοειδῆ quasi petrosa, vel lapidosa vocarunt, supra autem leuigata, & quamuis tenuissima sint, ac præcipuè vbi assident musculi, durissima tamen existunt mirabili naturæ prouidentia, cū vix frangi sine certo vitæ dispendio possint. locus admonet ne silentio præteream, quod felicissimè cessit prudentissimo, ac doctissimo ætatis nostræ chirurgus Ioanni Antonio Plato cognomento Lonigo, quo præceptore septennium vsus sum, adeò vt quātum in hac medendi arte profecerim: me nūquam pœnitere possit. Hic Patauij puerum in Diui Antonij collegio, qui ex alto cadens temporis os ad ocularis formæ magnitudinem fregerat: miro ingenio, atque arte sanauit, quamuis certa mortis signa omnia adessent. Eundem ego fortunæ, curationisq; exitum in Romano puerum sum

Gal. error.

Ossa λιθοειδῆ quæ.

Naturæ prouidentia in ossibus petrosis.

Lonigus præceptor meus.

Historia pueri cui os petrosum fractum erat.

Historia alia similis.

ro sum affecutus. Os capitis septimum varias formas præ se fert. propterea Græci πολύμορφον id vocauere, quod etiam σφηνοειδές alio nomine dicunt, hoc est cuneiforme, quâdoquidem inter ossa capitis, superiorisque maxillæ veluti cuneus quidam immittitur. barbari os basilare vocant, quòd non secus ac basis quædam cerebro subternatur: nam in media capitis basi sedet circumscriptum vndique à sexta futura, quam diximus totum hoc os in se cōprehendere: præter quàm in anteriori parte, vbi terminum ab octaua etiam futura capit. In ipsa basi crassum est, atque intus antrum habet, quod cōtinuum est cum cauitate ossis frontis, in qua diximus aërem sursum per nares attractū seruari, vsquequò in hoc ipsum antrum delabatur. Ex quo fortasse materia cerebro suppeditatur ad animales spiritus gignendos, quidquid alij de hac re senserint, vt infrà ostendemus. Huiusmodi antrum in omnibus ferè amplum est, & vacuū, in aliquibus tamen spongiosæ cuiusdā substantiæ plenum. Squama itidem tectum est dura, & densa, nec vllis foraminibus peruia, quanquam Galenus foraminibus refertum esse voluit cribri speciem referentibus, per quæ cerebri pituita percolaretur. In internæ caluariæ medio hoc os sinum quendam habet perelegantem, equi sellæ simillimum, in quo sita esse solet glandula quædam pituitam suscipiens, vnde postea defluit in palatū, ac nares per meatus ad palatum

Tertium os

πολύμορφον

ἢ σφηνοειδές.

Os cuneale.

Os basilare.

Sphenoidis ossis descriptio.

Sphenoidis antrum.

Nota opinio de spiritibus animalibus.

Galenus error.

Sella in Sphenoides.

Glandula suscipiens pituitam.

ea in regione vtrunque tendentes, de quibus a-
 gemus tractatu proprio de capitis foraminibus.
 Ad latera, quæ temporum caua respiciunt, duæ
 sunt partes intrinsecus cōcatæ, extrinsecus ve-
 rò conuexæ. Item ea parte, quæ cohæret cum
 extrema maxilla superiore, vbi molares infixi
 sunt, ad caluariæ basim geminos vtrunque pro-
 cessus inuenies alarum vespertilionum effigiem
 exprimētes, propterea à Græcis dicti *ἡσπυροειδῆς*.
 in horum processuum medio sinus est profun-
 dus, vnde exoriuntur muscoli in ore delitescē-
 tes, vt illud claudant. Octauum os capitis in
 media frontis basi positum à sphenoïde per se-
 ptimam suturam, interna caluariæ sede seiungi-
 tur, extrà verò ad secundum, tertiumq; os ma-
 xillæ superioris terminatur. Tenuissimū id est,
 crebrīsq; foraminulis distinctum. quamobrem
 Græcæ *ἡσμοειδῆς* dicitur, quòd imaginem cribri
 referat, per quæ foramina patere solet ascensus
 odoribus cerebrum petentibus: cuius rei argu-
 mentum inde sumimus, quòd coriza, vel graui
 destillatione laborantes odorandi facultatem
 interim amittunt. opplentur enim foraminula
 hæc pituita spirituum grauitate detenta, atque
 olfactitia organa ita impediuntur, vt ne vllum
 quidem odorem sentire queant, aut sensili vir-
 tuti suggerere. Media huius ossis regione pro-
 minet altus, subtilisq; processus sedem vtran-
 que interfecans, quæ olfactus instrumenta sunt
 sita, qui etiam in nares descendens nasi septum
 constituit.

*Sphenoidis
 processus ἡσ-
 πυροειδῆς.*

*Octauum ossis ca-
 pitis delineatio.*

*ἡσμοειδῆς os
 cur ita dicatur.*

*Cur laborās co-
 riza odorem nō
 percipiat.*

constituit. Hoc os Galenus missum fecit in libello de ossibus, de quo tamen I. de Partium Vsu meminit.

Gal. non meminit de isthmoide in lib. de ossibus

De Osse Iugali.

C A P. V I.

OS Iugale Græcis ζύγωμα describi solet separatim ab ossibus capitis, ac maxillæ superioris,

ζύγωμα.

quamvis vtriusque portio existat: nam ex duobus processibus constitutum est, quorum alter à maxilla superiore sub paruo oculi angulo enascitur, alter verò ab ea parte ossium temporum, quæ auditorio foramini superposita est.

Iugale est portio ossium capiti & maxillæ superioris.

Hi duo processus committuntur per suturam.

Iugalis descriptio.

quam in medio obliquam habent, atque ita os vnum efformant, quod iugo simile est: ac etiam pontis cuiusdam instar esse videtur, quod sit propositum temporis musculo, ceu propugnaculum quoddam à natura paratum, propterea

Iugale instar pontis.

Vsus Iugalis primus.

foris gibbū est, intus autē cauum, & vt extrinsecus occurrentibus pertinaciùs resistat, durissimum est ac penè solidū. Non enim omni prorsus cauitate destituitur, aut omnino expers est medullæ quæadmodū Vesalius existimauit. Id namq; effractū cauernosum prætinus apparebit, ac intus nutritimētū cōtinēs. Factū præterea fuit iugale os, vt ab eo māsorius musculus principiū duceret, sicuti ostenderetur vbi de musculis agemus.

Iugale non caret medulla cōtra Vesalium.

Secunda utilitas Iugalis.

De ossiculis organi Auditorij.

C A P. V I I.

ANTE QVAM maxillæ superioris ossa pertracto: operæpretū est explicare nonnulla

Gale. ignorauit ossicula organi auditus.

Vesalij laus.

*Carpus ante Vesal. meminit of-
ficulorum meatus auditorij.*

*Inuenit tertium
oficulum.*

*Nemini præclu-
sa est philoso-
phandi via.*

*Oficula organi
auditus mem-
branis inuol-
uuntur.*

*Quomodo inue-
niuntur oficu-
la hæc.*

*Figura primi of-
ficuli.*

oficula, quorum cùm apud Galenum mentio
nusquam fiat, coniiciendum est veteribus ana-
tomicis ignota fuisse, atque à recentioribus tã-
dem inuenta. quis tamen inuentor fuerit, me
planè later. Equidem Vesalium horum inuen-
torem libenter agnoscerem, cùm Anatomica
artis studiosissimus sit, & de illa optimè meri-
tus: nisi Carpus de his ante illum suis scriptis
meminisset. Auditus organi cõstructionem in-
grediuntur, de quo hîc non est scribendi locus,
sed infrà cum reliquorum sensuum instrumen-
tis. Ex his oficulis recentiores duo duntaxat
nouerunt, quæ etiam descripserûnt. At ego cùm
hæc accuratè peruestigare, tertium præterea
inueni, quod describam post aliorum duorum
descriptione: vt videas nemini præclusam esse
philosophandi viam. Inter ossa temporum, vt
suprà attigi, adest processus ad cerebri basim,
qui in iugi modum extenditur, in acutum de-
sinens, cauernamque intus habet instar laby-
rinthi, in cuius propè media regione adstât of-
ficula suis membranis adnexa. Ideo per audito-
rium meatum iter est ad horû oficulorum in-
uentionem, quorum primum propinquius est
foramini interiori, longiusculum, ac femoris fi-
guræ quàm simillimum, à quo tamen aliquan-
tulum euariat: siquidem parte inferiore nõ de-
pressis est capitibus, vt femur, sed mucronis ri-
tu in acutum rēdit: parte verò altera capite est
oblongo, rotundoque. Præterea duobus pro-
cessibus

cessibus donatur similibus iis, quos rotatores in femore vocabimus. Parte sui acuta, ac tenui in membranulam inferitur, quæ intenditur ipsi, ac illi, quod succedit, ad quam pariter extenditur, & adhæret veluti ad eam stratum: parte altera, quæ crassior est, & capite insignita, illam ipsam membranam tympani modo quatit. Incirco ab usu magis, quàm à forma malleū hunc dixerant: quemadmodum alterum, quod immediate sequitur, incudi simile esse voluerunt, quòd incudis vices gerat, excipiens quodammodo ictus permoti, ac percutientis malleoli iam descripti. Id secundum ossiculum, quod incudis nomine donarunt, parte superiore crassiusculum est, qua planam incudis partem refert: & in duos tenues, acutosq; processus tanquam crura desinit: quorum alterum immititur in tertium ossiculum, de quo mox dicam, & in membranula ibi assistente detinetur, ac stabilitur. Ossiculum hoc me iudice molari denti aptius comparaueris, qui duas radices habeat, alteram longiorem, ac tenuiorem, alteram verò crassiorem, ac breuiorem. Cæterum vsus gratia, vt dicebam, incudis nomine dictum est. Natura non temerè duo hæc ossicula ita construxit, vt crassiore parte mutuo se respicerent, ac penè contingerent. Nam cum ex aëris motu auditio fiat, ictus aëris in meatum ad hæc ossicula deferitur: sitque ibi quædam repercussio ad eum ciendum sonitum, qui sentitur. Hæc igitur

Cur primū ossiculum dicatur malleus.

Cur secundum ossiculum dicatur incus.

Incudis ossiculi descriptio.

Secundum ossiculū simile est denti molari.

Vsus duorum ossium organo auditus.

D

*Situs tertij of-
ficuli.*

*Staphia compa-
ratur figura ter-
tij officuli.*

*Officula tria au-
ditus organo ser-
uiunt.*

*Officula organi
auditus nō sunt
solida contra
Vesal. tertio
excepto.*

*Administratio
officulorum.*

tur ossicula cedente membrana moueri, atq; in-
uicem confricari necesse est: vt cū primum os
aëris ictu percussum in alterū impingat, illudq;
feriat, meritò malleoli, secundum verò incudis
officio pariter, & vocabulo donatū est, vbi ista
articulata sunt, cartilagine incrustātur. His ter-
tium accedit nemini, quod sciam, ante nos co-
gnitū. Iacet hoc, vel latitat potius in cauernula
quadam fermè rotunda intra sinū auditorium
exculpta, quo fit, vt ad organi auditus fabricam
nō pertinere nō possit: cauum est, & perforati
egregiè ferrei instrumēti naturā imitatur, quocir-
ca stapham nouo vocabulo nuncupamus, in que
equorum fellis insidentes pedes sistunt. Vna
tamē à stapede differt, quòd caret eo foramine
in quod lora immittuntur ad stapedem fellæ v-
trinq; alligandā. At huius loco capitulū quod-
dam extat rotūdum, quo ad incudis processum
accedit. Quocirca cū ossicula hæc inter se con-
iuncta sint, & colligata: ex eo coniectare haud
dubiè possumus auditus organo simul omni
deseruire. Ossicula hæc cū minima sint: ideo
Vesalius illa more suo solida esse affirmauit: at
tamen in iis cauernulis quamuis exiguas reperi-
mus: intus enim spongiosa sunt, & medullā pro
magnitudinis proportionē cōtinent: præsertim
illa duo, quæ ab aliis descripta fuere. Etenim ter-
tiū propter nimiam sui tenuitatē solidum omni-
no esse crediderim. Si quis hæc ossicula inueni-
re cupiat, leuiter, paulatimq; incidat, quæ circ
meatur

meatum auditorium cōsistunt : & sensim meatum aperiat, donec cavitatem illā derectam, patentemq; videat: & vbi deuentum fuerit ad mediam ferè ipsius sinus regionē iuxta membranam, que ibi obducitur, ac implet cauernulas in eo sinu existentes, statim perquirenti occurrent forma à nobis descripta. Quæ administratio cū *Ossiculorum organi auditus ad optimum & maximum Dei amorem innuat.*

De Maxilla superiore.

CAPVT VIII.

QUAE nam sit maxilla superior, facillimè *Difficilis est explicatio maxillæ superioris.* quidē vel digito demonstratur: at nihil fortasse difficilius est quā verbis explicare, qualem figurā habeat, quot, quibūsq; ossibus cōster, quomodōue à cæteris capitis partibus distinguatur. Maxilla superior animātibus omnibus motu caret Crocodilo excepto, cui mobilis existit inferiore quiescente, & Psitaco, qui vtrāq; eodem tempore mouet, separatimq; alterutrā: quod ego primus, quod sciā, obseruauī. Ex penitissimis naturæ arcanis perquirendum esset, cur hoc solū animantium genus ab aliis euariet: satis tamen interim nobis esse debet effectum nosse: etiam si causa ignoretur. Verū in hominibus venustati est, ne dum commodō inferioris maxillæ motus: nam maxillam superiorē hominibus, æquē ac Crocodilo moueri, quid ridiculū magis, ac deformius humana facie fiat?

Crocodilus mouet maxillam superiorem. Psitacus mouet maxillā vtrāque.

Cur homo maxillam superiorem nō moueat.

D ij

totam siquidem contrahi, rugarique oporteret: unde ea vultus forma, atq; indoles corrumpetur, qua nihil intuētibus gratius, nihil iucundius offerri potest. In humana autē fabrica decus, & ornāmētum considerari quis admiretur, cū illa Deus Opt. Max. nihil absolutius crea-

In hominis fabrica ornāmētatio habetur.

Cur maxilla superior sit inferiore breuior.

Cur maxilla superior cōstet ex pluribus ossibus

Causa secunda.

De numero ossium maxilla superioris.

Gal. nō constat sibi in numero ossium maxilla superioris.

uerit, perfectius nihil? Adde quōd breuior facta est superior maxilla, vt rotundior, atque elegantior esset facies, nec promineret quēadmodum in brutis. Ex pluribus etiam ossibus constructa fuit, non ob eam causam tantū, quam Anatomici tradunt, ne si partes illius omnes in vnum coactæ vnicum os efficerēt, parte vna laborante labor in vniuersam maxillam diffundi posset: verumetiam vt ex eis futuris prodirent ligamenta musculorum constructionem ingredientia, per quæ illi firmius principiis suis inhererent. Neque id obseruatu est difficile, quando ex ipsa sectione, si musculos ita persequare, vt eorum ortum inuenias: cū ad principiū ventum fuerit, non obscuræ tibi erunt ligamentorum propagines ex mediis futuris prodeuntes, in musculorum substantiam dispergendæ, quarum beneficio cū muscoli tenaciū ossæ parti, unde ortum ducunt, alligantur: tum etiam validiores fiunt, vt suprā dictum est in appendicum vsu. Cū igitur ex pluribus ossibus construui maxillam superiorem necesse fuerit: vidēdum est, quot ea sint, & quibus finita terminis. In variis Galeni locis varius horum nume-

rus

rus traditur : nam libello de ossibus quindecim enumerat : x i. de Partium Vſu nouem : in Introductorio , ſiue Medico , Galeno adſcripto , duodecim , cui numero Veſalius ſubſcribit : at ego tredecim ſemper eſſe obſeruauī. Nā quinque in vtraque parte perſpectis vnum ſine pari adinueni , quod vltimo loco explicabitur. Oſſa igitur hæc tribus futuris à capitis oſſibus ſeparantur : ſexta , quæ ab extremitate coronalis deorſum ſubiugali ad dentes extremos delata ad palatum terminatur : octaua , quæ à cauis temporum principium ſumens ſurſum repit tranſuerſim faciem in ſummo naſo interſecans. demum ea futura breui , atque obliqua , per quam duo proceſſus committuntur temporali muſculo ſuperpoſitum os , quod vbique iugale dicimus , conſtituentes . Hæc itidem oſſa priuatim ſuis terminis ad hunc modum circumscribuntur. Primum , cuius figura varia eſt , quatuor habet oſſa contigua , quibus cōmittitur . nam poſteriore parte proceſſum emittit alterā iugalis portionem efformantem , atq; ibi cum altera eiſdem portione , hoc eſt cū tēporis proceſſu per obliquam futurā coniungitur , deinde in cauis temporum cuneiformi cōmittitur ſextæ futuræ beneficio , vbi ſeſe illa reflectit , vt deorſum ad poſtremos dentes feratur . Siquidem deſcriptione noſtra ſexta futura totū illud os ambit , quod eſt ueluti cuneiformis brachium in vtrunque latus ſubiugali exteſum , per quod ipſum cuneiforme

Gal. lib. de oſſibus.

Gale. 11. de Vſu Parr.

Gale. in Introduct.

Contra Veſal.

Oſſa maxillæ ſuperioris ſunt tredecim.

Oſſium maxillæ ſuperioris deſcriptio in vniuerſum.

Primum os maxillæ ſuperioris.

Sexta futura quid ſit.

temporali musculo in mediis cauis subsidet, ac ferè ad coronalẽ vsq; protenditur. Huius igitur particula ad oculũ vergens tãtũ cũ primo maxillæ superioris ossẽ cõtinetur, quantum futura ipsa recta descendit. Parte autẽ superiore iuxta supercilij extremitatẽ idem os cum frontis ossẽ coalescit per octauam futurã, quæ per mediam oculi cauitatẽ ducta transuersim summũ nasum ab ima fronte secat: inferius à tertio malæ ossẽ disiungitur quadã futura, quæ sub temporis cauo à sexta recedens sursum ad faciem repit: ac per mediã ipsam ductu sinuoso lata in oculi orbitam intrat: per quã ascendit, donec octauum attingat, ibiq; definẽs exteriorem oculi angulũ circumscribit, quem totum os istud in se cõprehendit. Secundũ omnium minimum in magno oculi sedis angulo iuxta nasum assidet, ac statim eiusdem anguli initio sese offert, vbi foramẽ est in nares peruium, cui præsidet caruncula glandulæ vice pituitam à cerebro manantẽ ad oculos excipiens, vt illa ad ipsas nares exprimat.

Secundi ossis maxillæ superioris descriptio.

Gal. opinio de medicamentis in oculos immisiss ad nares fluentib. reprobatio.

Vbi sunt agilopes, Agilopes si negliguntur transeunt in fistulas.

Quam rem vt apertius comprobaret Galenus, addidit medicamẽta in oculos immissa per nares effluere solere. Id quod hactenus mihi experiri minimè licuit. Et mirũ profectò est quomodo membranã, quæ ibi assistit, ocularia hæc medicamẽta penetrare possint. Animaduertendum tamen est hoc loco abscessus illos fieri, quos Græci αἰγίλωπας nominant: qui si negligantur, in fistulas lachrimales abeunt ad os vsq; penetrantes,

penetrâtes. Ossiculum id superiore parte octaua futura terminatur, quia sæpe iam dictum est os frontis à superiore maxilla diuidere. Idem quoq; ab illo diuidit, & simul etiâ à tertio, quibus pari ratione cōmissum est. Tertium, quod à Galeno os malæ dicitur cæteris lōgè maius, varium est, ac variis futuris definitur: illud autem est, quod omnes sui lateris dentes cōtinet: quamquam Galenus incisorios excipiat: cū futurā ponat inter caninum, incisoriosq; dentes, quæ licet in hominibus nusquā reperta sit, in simiarum tamen, canūmq; maxillis conspicua est: distinguatur autem id os tertium à primo maxillæ osse communi futura per mediā faciem sub genis in oculi orbitā repente, qua itidem diximus primum os huic ipsi tertio committi. superius per octauam futurā ab osse frontis terminatur. In interno oculi angulo à secundo dissidet linea totum id ossiculum ambiente. Quā verò nasum spectat, ab eius ossibus per futuram ab octaua descendente disiungitur sub palato ab eo osse, quod quintum numerabimus, insigni futura, quæ transuersim per palatum incedit: vbi quoque lineam reperiās per palati longitudinem deductam, sursumque inter incisorios dentes vsque ad imum nasum assurgentem, cuius opera tertium os in dextrum, sinistrūque diuiditur. Illud præterea notare libet, aliam sub palato ipso futuram dari transuersim, & ad utrunque caninum dentem terminatam, quæ

Os male est tertium os maxillæ superioris.

Galeni error in osse male. Gal. dictum verum est in simiæ canibus. Fines ossis male.

Sutura transversa sub palato in pueris.

D iiii

*Os is male sub-
stantia qualis.*

*Sedes oculi ex
quibus ossibus
constat.*

*Orbita cur dici-
tur oculi sedes.
Orbita diuisio.*

in pueris conspicua est, in adultis autem sic a-
boletur, vt nullum sui vestigium relinquat. Po-
stremò sphenoïdi finitimum est os istud, vbi
sexta futura, postea quàm diremit primū à tem-
porum ossibus, in amplam cavitatem discedit,
ibique disperditur, vsque dum extremis denti-
bus appropinquat. hoc insuper de tertio hoc os-
se adnotate, illud præter quàm quòd multis par-
tibus perforatū est, ac etiā spongiosum, amplam
in se cavitatem continere intus, extrâq; ab osse
veluti ampuloso, attenuatōque obtectā: quod
fortassis à natura leuitatis gratia factum fuit. Ex
his ossibus, quæ hætenus descripta sunt, omnia
colligere potes, quæ ad oculi sedē cōstitutedam
necessariò cōcurrūt. Nam partē superiorē, atq;
etiam interni anguli dimidium os frontis: reli-
quum tertij ossis portio, quæ cū nasi ossibus cō-
mittitur, inferiorem, ac simul externum angu-
lum totum primum os struit. Quod autem ad
interiorem ipsius sedis partem attinet: secun-
dum os ithmoïdes, & demum cuneiforme suā
operam, materiāque subministrant, quam o-
culi sedem, quòd in orbem exculptam cerne-
rent, ideo posteriores orbitam nuncuparunt,
eāque ab omnibus in magnum angulum inter-
riorem nimirum, & in paruum, qui exterior
est angulus, nec non etiam in superiorem par-
tem, quæ superciliis subiaceret, atque inferiorem
diuisa est, quæ genis supereminet. Verùm ad
reliqua maxillæ superioris ossa, vnde digressa
est

est oratio, reuertatur. Quartum itaque sequitur os, quod alterum ex duobus nasi ossibus Vesalio est. Nos verò nostrum ordinem sequētes quartum illud esse dicimus, quod ille pro sexto, atque vltimo accipit. Idq; repositum est iuxta palati extremum, cuius non minimā portionem occupat, distinctum ea futura, quam dictum est transuersum palatum secare, terminatur quā nares in fauces pertinet. Dirimitur præterea sphenoidis processibus, quos alis Vespertilionum comparauimus, sextæ futuræ beneficio ad intimos dentes decurrentis. Quintum os partem nasi superiorem, quæ verè ossea est, geminum existens constituit. Inferior verò nasi pars cartilaginea est, vt cum ictibus, casibusque maximè exposita foret, non ita faciliè frangi posset, quæ admodum assiduè contingeret, si ossea facta esset. Quod igitur osseum est nasi, cum duplex sit communi futura in dextrum, ac sinistrum distinguitur, ac frontis ossi inter supercilia committitur per octauam futuram, de qua sæpè meminimus. In descensu autem ab vtraque parte cum osse tertio per futuram communē vtriusque coniungitur. At in interna parte, vbi ambo hæc ossicula communi linea iunguntur, adhærent septo illi, quod ossis cribri speciem referentis partem esse diximus. & hæc dicta sint de maxillæ superioris ossibus: quæ cum in vtroque latere quina sint, omnia simul erunt decem. Cæterum his vnum mihi addere libet vndecimum,

Quartū os maxillæ superioris quid sit Vesalio.

Quid sit quartum os maxillæ superioris & eius termini.

Sphenoidis processus similes alis Vespertilionum.

Quintū os maxillæ superioris.

Cur nares sint cartilagineæ.

Terminus ossis quinti.

Vndecimi ossis descriptio.

*Vndecimi ossis
descriptio.*

*Vndecimum os
aratro simile.*

*Ossa spongiosa
in naso facile
eroduntur in
morbo gallico.*

*Epilogus prece-
dentis capitis.*

*Cur brutis sint
maxille oblon-
gæ.*

*Cur homini sit
rotunda facies.*

quod supra medium, intimumque palatum, intra nasi fauces positum est: atque ab ea parte, qua caput pertingit à lata rimula secundum totam longitudinē dissecatur, cuius bifurcata basis, quæ crassior est, in cuneiforme incūbit, extenditurque per nares septi partem imam constituens, quod tamē ab altera parte leui momēto diuellitur. huius formam aratri vomer imitatur, quod imaginem cultri seruat, præter quam quoddam & manubrio caret, & sinuosa, atque inæquali existit acie. Præter vndecimum addi potest duodecimum, & tertiumdecimum. Duc scilicet ossa spongiosa in interno naso sita, satinequalia, ubi mucus retinetur. quæ ossa gallicæ lue laborantibus facile eroduntur, ut praxin exercentibus videre facile est.

De inferiore maxilla. CAP. IX.

PRÆCEDENTI capite maxillam superiorem in animantibus omnibus, Crocodilo excepto, immobilem esse dicebamus; addidimusque inferiorem in Homine solā moueri, in Psittaco utranque. Causa verò, quāobrem hominis ac brutorum maxillæ figura non eadem sint, esse potest: quod animalia cætera manibus destituta inclinari oportebat ad cibum ab humo capiendum: proinde sapientissimns rerum opifex Deus maxillis oblongis, ac prominentibus illa muniuit, quibus manuum vice vterentur. Cæterum homo cum manus obtinuerit, quari opera ori cibum admouere potest, breuiorem

ac pe

ac penè orbicularem maxillam est adeptus: itaque elegantiorē, venustiorēque: cui maxillarum figuræ, & elegantia simia proximè accedit, quippe quæ non multum ab humana facie recedat, cum manibus & ipsa quodammodo vtatur. Verum inferior maxilla ex durissimo osse, magnaque ex parte penè solido constare debuit, vt validior esset, ac variis, fortissimisque motibus in mandendo, mordendoque sufficeret: & in arcum veluti obducta amplum sinum reliquit, vt leuior fieret, minusque incommodi mouentibus musculis præberet. In hominibus simplex, atque ex vnico osse constructa, quauis duplicem esse Galenus scripserit, eamque in summo mento laxari. Talem sanè reperiās in canibus, equis, bobus, atque id genus animalibus, quando longo ductu adhærere possunt. Hominis verò maxillam bipartitam nusquam reperiās. At Galenus hoc, vt alia etiam multa, ex simiæ simulachro in hominem non transtulit. Et enim nullum inuenias discrimen inter humanam, simiæque maxillam inferiorem. Verum sanè oportet in pueris lineam à summo mento protendi, ac mediam quodammodo maxillam superficietenus peruadere, quæ non multo post tempore cum prorsus aboleatur: ideo huic geminum esse maxillæ os coniici non potest. Hæc autem linea futuræ rationē interim habet, dum ex ea producuntur, atque exeunt ligamēta, quæ musculos ibi existentes ingrediuntur. Inferior

Simia facies similis humana. Simia manibus utitur.

Maxilla inferior cur ex osse duro constet.

Sinus maxilla inferioris cur.

Os maxilla inferioris non est duodecimæ curra Galen.

Simia maxilla inferior vnico osse constat.

Ex quo coniecerint maxilla inferioris os esse bifidum.

Linea in mento puerorum usus.

Processus duo inferioris maxilla.

*Acuti processus
usus.*

*Alterius pro-
cessus maxilla
inferioris descri-
ptio.*

*Cartilagine in
sinu & processu
secundo maxilla
inferioris usus.*

*Gal. error in se-
nu maxilla inf.*

*Cyr maxilla in-
ferior sit aspera
ante.*

Foraminum usus.

Alveoli dentium

*Quando alveo-
li dentium in
senibus obscu-
rantur.*

maxilla in duos processus utrinque definit, quo-
rum prior in mucronem tendit, posterior verò
capitulum, ceruicemque habet. Acutus proces-
sus factus est, ut excipiat temporalis musculi tē-
dinem, qui in illum validissimè implantatur.

Alter autē, qui oblongo transuersim capite do-
natur, in sinum sibi proportionem respondētem
inferitur: atque ita cum temporum osse inter
iugalis radicem, auditoriumque foramen arti-
culatur. Hunc sinum, & capitulū maxillæ pro-
cessus cartilago crustæ modo obducit: sed in-
ter sinū, ac processus caput intercedit quædam
cartilago mollis, & mobilis, quæ non modò li-
gamenti munere fungitur, ad continendum in
suo sinu processum: verum etiam lubricum ma-
gis eius articulationis motum reddit, ac simul
efficit, ne assiduo motu confricata ossa vel rum-
pantur, vel saltem atterantur. hunc sinum Gale-
nus posuit sub mammillari processu, cum tamē
à mammillari distet. Maxilla inferior parte an-
teriore aspera est, atque inæqualis, ut ibi inserti
musculi tenaciùs hæreant: suâque habet fora-
mina, per quæ arteriæ, venæ, ac nerui transmi-
tuntur, de quibus in capite de foraminibus ca-
pitis agemus. Præter hæc foramina sunt quam
plurimi sinus tanquam alveoli, in quibus den-
tes insident: ita in maxilla inferiore infixi, quē-
admodum in superiore, quos aliquando cerni-
mus in seniorum maxillis penè deperditos: cum
scilicet erutis, aut delapsis dentibus maxilla ea
parte

parte comprimitur, vsqueadeò vt os ipsum vndique cohæreat, cõstipetur, ac tandem vniatur. Id quod præter cætera mihi obseruare contigit in vetulæ cuiusdam caluaria, in cuius maxillis vix bini, aut terni dentes prodiisse videbantur: adeò erant oppleta alueolorum vestigia, & in vnum solidè coiuerant. Quot autem esse debeât alueoli in vtraq; maxilla, sequenti capite de dentibus planum fiet.

De Dentibus.

CAP. X.

QUEMADMODVM reliqua ossa omnia minimè sentire, ita dentes ipsos sensus participes esse, rerum magistra experientia docuit. Vtriusque autem causam perquirentibus facillimè constare potest, ex neruorum id propagatione euenire. Etenim molles quosdã, ac tenues neruulos à tertia neruorũ cerebri coniugatione ad dentes deriuari, ac per ipsorum radices ingredi, liquidò apparet, qui cùm per interna dentium disseminètur, ita eorum substantiam efficiunt, vt notatu dignam sentiendi facultatem inuehant. Verùm ad cætera ossa nulla neruorum portio pertingit, per eorum substantiam transfundenda, quanquã per illa nonnunquam, quemadmodum per capitis, ac vertebrarum ossa nerui transeunt, sed aliorum tamen sensum laturi. Quamobrem sensus omnino expertia esse fatendum est. In quo familiaris meus ac ciuis Io. Baptista Mazzolarius, egregius fanè iuuenis, moribus ac literis perornatus, vix fatis

Dentes sentiunt.

Cur dentes sentiant.

Tertia coniugationis nerui ad dentes.

Cur ossa non sentiant.

Nerui trãscentes per caluaria ac vertebrarũ ossa alio sensum deferunt.

Ioan. Baptista Mazzolarij Cremonensis opinio quòd dentes sentiant experientia confirmata.

mirari poterat illorum amentiam, qui aut offa cuncta sentire aiebant, aut ne in dentibus quidem sensum inesse oportere, quos aut sensum negantes indignos penitus iudicabat, qui audirentur: atq; ipsis precabatur, quod ipse per multos annos summo cum suo malo expertus fuerat, quando à septimo ætatis suæ anno ad vigesimum sextum vsque dentium dolore adeò grauius laborauit, vt cùm frustra reliqua medicamenta adhibuisset, ad ignem sæpe confugere sit coactus: addebátque quod pars illa dentis, quæ extra gingiuas extaret, nihil penè sentiret: pars verò, quæ in alueolis delitesceret, atque à gingiuis tegetetur, acerrimè esset sensus, cùm scilicet neruus, neruique virtus ad eam vsque regionem extenderetur, vbi cauitas dentis interna desinit, & gingiuarum terminus est. Quòd autem pars dentis, quæ nuda cernitur, atque à gingiuis prominet, insensibilis existat, ex eo probari potest: quòd dentes in ea parte secantur, limis atteruntur, æquari, decurtari, ac læuigari solent: necnon etiam candentibus ferris vri, & tamen vix sensus indicia deprehenduntur: quanquam ab iis animus abhorreere videatur, qui aliquam inde lèSIONem non potest prima facie non pertimescere. Dentium dolore Galenus & ipse vexatus diligentius inuestigans num dentes dolerent: non modò eos ipsos dolere, verùm etiam pulsare deprehendit: nec meherculè iniuria, quando certum est, sicuti ego in publicis dissectionibus

Dēis quæ prominet pars non sentit: sed quæ iacet in alueolis, & cur.

Probatio quòd dentis pars nudata gingiuis non sentiat.

Gal. dentium dolore laborauit.

Dentium dolorem pulsatilem sentiri posse cū Galeno probatur.

bus ostendere solitus sum, vnà cum neruo venam, atque arteriam valdè exiguas ad singulos dentes perferri: quo factum est, vt quemadmodum per neruos sentire dentes cognoscimus: ita quoque credamus per arteriam pulsare, & per venam nutriri, vnde alterum inter ossa, & dentes non leue discrimen habetur, quòd scilicet dentes perpetuò aluntur, & augentur, ossa verò alia non secus ac aliqua corporis partes ad statum vsque annorum numero augentur, ad quem vbi deuentum fuerit, protinus cōsistunt, atque ab auctione ipsa cessant. Quamobrem videas dentes exemptis oppositos crescere, & aliis qui in eadem sunt serie, prominentiores, exterosque magis fieri, cæteri nanque oppositorum è regione mutuo congressu, atque attritu, quantum augentur, tantum pariter imminuuntur, id quod læuigandis cibus potissimum euenit. Dentes, etsi numero euariât, cùm modò plures, modò pauciores reperiantur: attamen trigintaduo plurimum sunt, nam sexdecim in vtraque maxilla continentur. Atque hi tres in partes diuidi solent, in molares, seu maxillares, caninos, atque incisorios: quatuor primi anteriores incisori dicuntur, propterea quòd ea figura præditi sunt, vt incidendi munere fungi possint: latini enim sunt, & acutam aciem præ se ferunt, vt cibum oblatum cultri modo secent, quod facillimè præstant, cùm in totidem sibi aduersos, & ad eundem vsus fabricatos impinguntur, ac com-

*Per arterias
dentes pulsant.*

*Dentes semper
crescunt, ossa nò
semper.*

*Cur exempto
dente, qui illi à
regione respicit
der alios sui or-
dinis excedat.*

*Dentium nume-
rus variat.*

*Dentes pluri-
mum triginta
duo.
Dentium diuisio.*

*Incisorij dentes
qui & cur ita
dicti.*

*Canini dentes
qui & eorum
usus & etymo-
logia.*

primuntur. iuxta hos molares versus tendenti-
bus canini occurrunt, qui vtrunque singuli pa-
res sibi, ac respondentes habent, ampli ea parte,
quæ gingivis proxima est, in apice verò acuti
sunt: vt ad frangendum quàm maximè idonei
reddantur. itaque fit, vt cum incisoriis aliquid
offertur, quod præ eius duritie ab iis diuidi ne-
queat: tunc caninis traditur ita dictis, quoniam
exertis canum dentibus quàm simillimi existunt.

*Dentes molares
quot.*

Postremò succedunt maxillares quini ab vtro-
que latere tam superioris, quàm inferioris ma-
xillæ, qui & molares nuncupantur, quoniam fa-
cti sunt ad terendos, læuigandósque cibos mo-

Molariũ usus.

larum exemplo, quibus cereales fruges molun-
tur. Itaque ampli, duri, magni, atque asperi con-
structi sunt, alioqui cõminuendis cibis ineptio-
res futuri. Cur enim asperi esse debeant molæ

*Cur molares, a-
speri.*

ipsæ satis demonstrant, quæ cum diu molendo
asperitatem deposuerint: rursus arte solent exa-

*Cur dentes du-
rissimi.*

sperari. Iam verò durissimos fore dentes neces-
se fuit: vt cibis conficiendis sufficerent, neque
ab iis contererentur. ampli quoque, & magni
facti sunt: vt diutiùs, & cõmodiùs munus suum

*Cur molares
magni.*

*Dentes articu-
lantur maxillis
per Gomphosim*

obirent. Dentes in maxillis per Gomphosim
veluti clauis infixi inhærent, dentiũque sinus
in maxillis tanquam alueoli interstitiis suis di-
stincti sunt, atque ita præsepiola quædam esse

*φάρυα quid
Græci vocent.
De dentium ra-
dicibus.*

videntur. Ideo Græci φάρυα dixere. Sciendum
insuper est non paribus omnes radicibus im-
plantari. siquidẽ aliqui vna tantum, aliqui dua-
bus,

bus, nonnulli tribus, quidam etiam quatuor radicibus inferuntur. Anteriores dentes vt canini, atque incisori j vna tantum radice donantur, *Caninus & incisori j radix vna* molares autem pluribus. Verum ex ijs, qui inferioris maxillæ sinibus continentur, binas, qui in superioris ternas radices, possident. Nonnunquam etiam videre est & inferiores, tribus, & superiores quatuor radicibus donatos: sed id rarissimum est. Ad hæc quandoque inuenias molares duos superiores canino denti proximos ex binis radicibus constare: inferiores autem illis vtrique ipsis respondentes singulis. Ex quibus varietatum formis in vniuersum percipito molares inferiores vna semper radice à superioribus sibi oppositis superari, radicesque ipsas inferioribus breuiiores esse: superioribus autem longiores, neque id sine consilio. Quando quæ pendent, cum facilius labi, ac discuti possint, quam quæ in imo quasi solo insident: iccirco illa tenacius, atque altius infigi debent, vt firmius, validiusque hæcant. Obseruatu quoque dignum est, intimos, atque omnium postremos maxillares breuissimas radices obtinere, tum quia minimum cæterorum in leuigandis cibis exerceantur. Adde etiam quoniam illa maxillæ portio profundiorē insertionem non admittit. Hos genuinos appellari libuit, qui plerunque in cauisa sunt, cur varius dentium numerus habeatur: modò enim vno superaddito triginta tres constituentur: sicuti mihi sæpe videre contigit in

Caninus & incisori j radix vna

Molares dentes maxillæ inferioris habent plures radices quàm superioris.

Dentes superiores quatuor radicibus praeditos videre rarum est.

Cur radices dentium maxillæ superioris sint longiores.

Molaribus postremis breuissima radix & cur.

Molares postremi à pubertate nasci solent.

Molares postremi genuini dicuntur.

Dentes quãdoque triginta tres.

E

viro quodam nobilissimo: modò ducbus detra-
ctis, aut vno, numerum decrefcere, in aliquibus

*Dentes viginti
oſto.*

*Cardinalis Ar-
dinghelli dētes
viginti ſex.*

etiam viginti oſto, quod minimum eſt, inuenti
ſunt. Licet ego obſeruauerim Nicolaum Ardin-
ghellum Cardinalem, quem honoris cauſa no-
mino, in ore ſex tantum ſupra viginti dentes ha-
bere, neque tamen vllus deſiderabatur. Præter-

*Radices dentiū
perforatæ.*

ea animaduertendum eſt dentium radices om-
nes eſſe perforatas, quæ foramina deducuntur
ad ipſorum cavitates, quas intus habet, exiguas
quidem, verum notatu dignas, vt ſcilicet leuior-
es ſint, & commodiùs nutrimentum ſumant.

*Vſus foraminis
radicis dentiū.*

Admittunt autem foramina hæc venâ, arteriam
& neruum, de quibus ſuprà dictum eſt. Quæ tria
vaſa ad cavitatem illam, vſque ad dentis baſim

*Mēbranula ex
vaſis in radicē
dentiū.*

penetrant, ibi complicantur, & ex ſe membra-
nulam quandam gignunt, quæ imbibi nonnū-
quam ſolet materia à cerebro defluente, vnde
pariuntur dolores illi ingentiſſimi, qui perſeue-
rant, quouſque humor in membranula detine-
tur, vel purgato cerebro fluxionis cauſa tolla-
tur. Quod autem ad dentium generationem
attinet: ſcito non paucos putare eos tunc gigni,
cùm ex gingiuis prodeunt, qui manifeſtè errant.

*Cur dolores ve-
hementiſſimi
ſint quandoque
in dentibus.*

*Dentes in ma-
tris aluo gigni,
licet non pro-
deant.*

Nam dentes in ipſo matris vtero efformari cer-
tò comperi, ſicuti ego perſæpe oſtendi magna
aſtantium admiratione, dum ex demortuorum
infantium in matris aluo gingiuis ex ſuis alueo-
lis perexiguos dentes eruerem. Idem in nuper
natis, quod in extractis ex vtero, atque etiam in
arboribus

arbortibus septem & octo mensium explorare mihi licuit. Ea autem diligentia rem hanc perquisiui, quòd de his plerique ne verbum quidem, re nondum illis fortasse cognita, aut perquisita. Puerorum dentes appendices habent, quæ temporis processu, quanquam non omnes, laxari, ac vacillare solent: itaque vel sponte decidunt, vel vnguibus, aut filo non difficili negotio eximuntur. quæ autem manent, vt in molaribus frequenter accidit, ita cum dentibus committuntur, atque cohærent, vt ipsorû partes esse videantur, nec ita facile demi possint. Demptra itaque appendice cùm seruata sit radix: non mirum est, si non multo pòst tempore dens denuò crescit, & deperditæ appendicis locum occupat. Quamobrem cauendum est, ne cùm pueris dentes casu aut aliquo ictu effranguntur, quæ reliqua sit portio eruatur. Sed accuratissimè radix ipsa, quoad eius fieri potest, seruari debet. In ea enim veluti in semine quodam, ipsius dentis regenerandi spes residet, eaque radicitus euulsa, dentes non ampliùs vel rarissimè renascuntur. Dentes humani ordinem vnicum seruât, etsi aliquando duplex ordo inueniatur. licet raro in hominibus, triplex tamen in puero meo Phœbo conspicuus, qui rarus est, quemadmodum & ipse rarus est ordo.

De Capitis Foraminibus. CAP. XI.

DE foraminibus capitis acturi Galeno duce vti non possumus: nam cùm in libello de

E ij

Dentes in utero matris gigni.

Dentes habent appendices quæ decidunt.

Molarium appendix frequenter.

Radix dentium in pueris non excidit.

Radice dentium euulsa raro emergunt denno.

Phœbus filius habet triplicem ordinem dentium. Phœbus puer rarus.

Gal. non scripsit quod exeret de foraminibus ca.

ossibus tractationem hanc consultò prætermisisset: deque huiusmodi foraminibus in libro de neruorum, ac reliquorum vasorum dissectione acturum polliceatur: in libello de neruorum anatome, qui Galeni nomine circūfertur, nihil de his scriptum reperitur. Quamobrem hîc foraminum descriptionem cum Vesalio instituemus, ut cùm hæc ipsa fuerint explicata, faciliorem nobis viam relinquant ad ea scribēda, quæ tradere opus fuerit de venis scilicet & arteriis, ac neruis per caput ipsum meantibus. Cùm igitur natura reliquarum corporis partium gratia ossa construxerit, sicuti primo capite adnotatum fuit: ita illa efformauit, ut non modò illis adhærescere partes aliæ, verū etiam per eadem sine læsione transire possent. Idcirco ossa tanquam infimas nostri corporis partes aliis cedere necesse fuit, alioqui sua duritie multa incommoda allatura. & quod proposito nostro nunc deseruit, vasis transmittendis perforata sunt, ac præcipuè ossa, quæ vndique foraminibus scatent: per quæ tum nerui à cerebro demittuntur, tum venæ, atque arteriæ sursum feruntur ad cerebrum, partēsque alias in capite positas. ea primū commemorabimus, quæ septem neruorum coniugationibus famulantur: quarum coniugationum cū nobilissima illa sit, quæ opticos constituit: non immeritò ab eius foraminibus exordiemur. In interna itaq; caluariæ sede, quæ cerebri est basis, vbi exculprū est

Ex hoc posset aliquis conuicere de neruorum dissectione librum non esse Galen.

Vesal. scripsit de foraminibus capitū.

Tractatio de foraminibus capitū quam sit utilis.

Ossa sunt facta gratia aliarum partium.

Ossa sunt partes ignobiliores.

Ossa cur perforata.

Foraminum ossium usus.

Prima neruorum coniugatio oculis deseruit.

De foraminibus seruietibus primæ coniugationi neruorum.

est os cuneale in fellæ modum iuxta processus ipsi fellæ supereminentes: adsunt duo foramina in eodem cuneali, dextrum scilicet ac sinistrū, rotunda, & in oculorum sedem tendentia, quæ ad ipsorum radicem iuxta latus interni anguli penetrant: ibique oculi orbitam introspicienti primo occurrent. Per hoc foramen à cerebro nervus insignis emanat, & in medium oculum radice instar implatur opticus, & visorius appellatus: siquidem ad oculum ipsum virtutem visilem defert. Post hæc ad fines doctorum finis est semicircularis perfectū aliquādo orbem efficiens, per quem fertur secunda neruorū coniugatio. Atque inde per magnam rimam, quæ mox describetur: in oculos deducitur ad motum ipsorum musculus largiendum. Rima vero hæc ea est, quæ in ima oculi orbita apertè perspicitur: ac versus externi anguli regionem infernè foraminis rotūdi formam imitatur, quod tamen superiore parte effractum in lōgam, amplamque cauitatem extenditur, vt nō solū auditum præbeat secundæ neruorum coniugationi, quæ per oculorum musculos dispergitur ad ciendum motum: sed etiam aliis neruorum ramulis, qui à tertia proueniunt, & ad faciem per id foramen exeunt, quod est in supercilis supra internum oculi angulum. Itēmq; rima hæc musculus oculorum cedit, qui inde ortum ducunt, ac demū admittit & venas, & arterias trāsmittas ad oculos, oculorūmq; musculos enutriendos,

Sphenoides instar fellæ in basi capitis excavatum.

Foramē neruorum opticoeū.

Opticus nervus cur dicatur.

De foraminibus deseruentibus secundā coniugationi neruorum.

Secundā coniugatio neruorum mouet musculos oculorum.

Rima magna in ima orbita descriptio & usus.

Ramuli a tertia coniugatione.

Foram. quod est in supercilis usus.

Oculorum musculi unde ortū ducant.

*Quomodo gi-
gnantur lachry-
ma.*

*Foramē in sphen-
oide.*

*Masseteris or-
tus vbi.*

*Ramus octauæ
coniugationis ad
musculos mas-
seteras.*

*Ramus tertiæ
coniugationis ad
faciem per oculos.*

*Foramen aliud
in sphenoidē.*

*Ramus tertiæ
coniugationis ad
dentes & mus-
cul. temp.*

*Quarta coni-
ugatio nervorum
ad palati tunicā
& supremam partem
linguæ.*

& fouendos. In hac itidē ampla rima parte inferiore, vbi rotunda est, versus internum angulum latitat foramen, quod cæco quasi ductu ad palatum, narésq; tendit, per idq; à cerebro per glâdem suscepta pituita naturaliter ad ipsas nares, atq; ad palatum descendit. Et quoniam pituita hæc in rimam illam prius decidit, quæ ad oculos pertinet: hinc forassis via est gignendis lachrymis, cùm scilicet fluidus ille humor excernitur in oculos emanans, & ab oculis postmodum in genas delabitur. sub eadem rima in decliuore sphenoidis regione modico intervallo discernitur foramen in vtraque parte, vbi à sella declivis fit recessus, quod orbiculare est, ac longiusculum, idque in oculi sedē rectà tendere videtur: sed tamen flectitur ad latera, vbi tēporalis est musculus, ac masseteris ortus, quando per hoc foramen ramus octauæ nervorū coniugationis ad hos ipsos musculos transit: quem pariter comitatur tertiæ coniugationis ramus, qui ad faciem per oculos parte inferiore fertur, & cum musculis temporum, atque etiam cum massetere permiscetur. In ipsomet sphenoidē aliud est foramen, quod ad extremitatem alarum vespertilionis pertinet, penè ouale: per id portio tertiæ nervorū paris ad dentes transmittitur, atq; etiam cum tēporali musculo miscetur: per idem foramen, vnà cū illa portione quarta nervorum coniugatio cū ad palati tunicā, tum etiam ad superiorem linguæ partem gustus gratia de-

mitti-

mittitur. Iuxta foramen iam cōmemoratum ad radicē tēporis ossis, quod iugi modo eminere diximus auricularis labyrinthi efformandi gratia, aliud residet maius quidē, sed perfractum, atq; inæquale rectā deorsum tendens, per quod tertiæ neruorum coniugationis portio permeat, quòdque nō minus patet iugularis venæ ramulo ad partes anteriores repenti. At vbi à superiore foramine paululum versus temporis os recesseris, tibi occurrerit foraminulum, quod propter sui paruitatem in nonnullis caluariis, vel altera saltem parte deficiat, peruium exiguæ arteriolæ, & venulæ per crassam menyngem disseminandæ. verum vbi obturatū est, ac prorsus deletum, arteriola hæc, & vena viam sibi struit per foramen amplū, & inæquale, quod paulò antè descriptum est. Non procul ab amplo illo foramine. aliud videre est interna caluariæ parte vix conspicuum, ac rotunda tamen cauitate, oblongaque in suprā dictum foramen desinente notatur, & sub interiore styloïdis radice insigniter apparet: obliquum versus anteriora ductū præseferens, qualis debebat esse soporalis arteriolæ progressus, cui foramen id natura parauerat. In eodem tēporis osse, quia occipitium versus declinat, foramen inest, quod in superficie oblongum, ac veluti ouale visitur cæco ductu in labyrinthum: ac demū ad extremam auris regionē finitur, iccirco cæcum appellatū, aditum præstat quinto neruorū pari, facultatem sensificā audi-

Foramen tertiæ neruorum coniugat. portioni & iugul. anterioris ramo seruiens.

Foramen parvū quod quandoque deletur.

Vide Naturæ industriam.

Foramen soporalis arteriæ.

Foramen cæcū.

Quinta neruorum coniugatio sensum auditus organo describitur.

tus organo suggerenti, sub quo foramine inter os temporis, atq; occipitium abrupta sedes conspicitur magnū item, & inequale foramen constituens, per quod deducitur sextum nervorum coniugium, qui ad viscera tendunt, atque interrim recurrentes cognominatos efficiunt, vnde forināda vocis virtus penè omnis depromitur. hoc itidē foramen internæ iugulari venæ famularur, dum per idem ingressa ad vniuersam cerebri molem enutricandam cōscendit, simulq; menyngei crassæ insidet gemino sinu euecta, ac denique in partē posteriorem delabitur. osse illi plurimū cedēte, in eo siquidem profunda est cavitās in hāc formam 2 curuatæ versus labdalem occipitis futuram. In occipitis osse prope foramen omnium internorū capitis maximum vnum adest, haud amplum obliquè ad interiora vergens, per quod defertur septima nervorum coniugatio, quorū partem laryngis, & linguæ, parte temporū muscoli sibi vēdicant. In eodem occipitis osse inest foramen illud, quod paulò antè diximus interna omnia capitis foramina magnitudine superare, cū tamen externa oculorum orbita sit minus capax, quod cū sit sine pari mediam occipitis regionem occupauit: spinalique medullæ à cerebro defluentī destinatum fuit. Ex reliquis foraminibus in anterioribus spatiis primum illud est, quod cū vnicū, parūmque sit neq; admodū penetrās, sinus fortasse potius quàm foramen dici debet:

inter

Sexta coniugatio ad viscera.

Quintum par nervorum efficit nervos recurrentes.

Nervi reuersi formant vocē.

Iugularis interna vniuersum cerebrū enutrit

*Vbi cedat os cra-
nei crassæ menyngei.*

Septima coniugatio nervorum per quod foramen fertur.

Septima coniugationis nervorum.

*Foraminis in occipite max. v-
sus.*

inter os frontis, ac medium ithmoïdis interuallum iacet, quo terminatur, ac pertinaciùs incūbit tertius duræ cerebri mēbranæ sinus, de quo aliàs dicitur. In ithmoïde ad vtrunq; dicti interualli latus iuxta frontis os affident. duo longiuscula foramina rimulæ speciem referentia, quæ odoratus organorum terminis opplentur.

Vfus foraminis inter os frontis & ithmoïdis.

Ithmoïdis foramina.

Cæterùm ithmoïdes quamplurimis foraminulis in cribri morem effingitur, quæ odorem ne, an aëris, an superfluitatum causa facta sint, non est nostri instituti disputare. sed vbi opus fucrit, non prætermitemus. In ossē frontis in regione

Ithmoïdis figura.

superciliorum duo foramina vtriq; vnum, per quod tertiæ portio neruorum conjugationis ad musculos frontis, & palpebrarū disseminatur. Foramina hæc tamen semper sunt orbicularia,

Tertiæ conjugationis portio ad musculos frontis & palpebrarum.

sed aliquando sunt media, ac si quis vngues in ceram immitteret, detraheretque. Media fronte supra nasi summitatem eo nempe spatio, vbi spongiosum interstitium gemina caluarię tabula disiungitur, cavitates reperiuntur, quæ in nares penetrant antiquis (vt opinor) prorsus ignoratæ, illæq; nunc binæ, nunc ternæ, in quibus cū nihil vnquam præter membranam re-

Cavitates in fronte a veteribus ignoratæ.

pérerim, licet aliquando & muccus reperiatur, aërem tantūm per nares attractum detineri existimaui, de cuius vsu quid sentiamus alibi plannū fiet. Os malæ, quod tertium diximus, sub regione inferiorum palpebrarum, quatenus in genas dilabitur, foramen habet rotundum,

In cavitatibus media frontis plurimum aër solus quadoque muccus reperiatur.

Foramina ossis malæ.

quod ab interna, inferiorèq; parte orbitæ oculorum principium sumit ex rima longa, profundâq; in foramen ipsum desinente è regione primi molaris dentis. per id transmittitur tertiæ neruorû cõiugationis portio, quæ ad nasi musculos, & ad eos pariter, qui labrum constituunt defertur. In oculorum angulo maiore parte inferiore, quæ inter tertiũ & secundum os maxillæ superioris intercedit, non modicum inest foramen, cui sinum facit secundum os, vt illi quodammodo cedere videatur. hinc descendit ad nares humida materia internam oculorum partem obsidens, cui excipiendæ præstò est glandula quædam instar spõgiæ ad ipsum foramen affidens. Vnde Galenus falsò arbitratus est medicamenta oculis apposita, tum in nares, tum in palatũ defluere, vti suprâ attigimus, vbi de maxillæ superioris ossibus loqueremur. Hoc loco ægilops gigni solet, quam lachrymalẽ fistulam Latini vocarunt. Verũ in exteriori angulo, qui minor dicitur, parte item inferiore ampla rima sita est, quæ partem ossis temporum, partem etiam maxillæ superioris perforat, cui adfigitur temporalis musculus, qui cùm maximam cum oculo affinitatem habeat, non mirum est, si laborante oculo temporalis iste musculus sæpe afficiatur, quemadmodũ crebrò experti sumus, cum ratione experientiam coniungentes. Faciei foraminibus si oculorũ sedes, orbitas dictas annumerare libeat, scito illas temporum, frontis, maxil-

Tertia coniugationis portio ad nasi musculos & labri.

Vnde inhumiditas ad nares & oculos descendit.

Glandula excipiens humiditatem oculorum.

Gal. error.

Locus in quo ægilops nascitur.

Cur oculo laborante afficiatur musculus temporalis.

Orbita oculorũ sedes.

maxillæque superioris osse conflatas. Inter eas si descenderis, duo reperies nasi foramina ad palati fines, & ad fauces penetrantia. Iugale etiam os ex duobus veluti ossium processibus pontis instar constitutum, magnum foramen, oblongumq; efficit, in quo temporalis ipse musculus residet. In anteriore palati regione inter incisivos dentes medium est foramen, per quod vena, arteriæque pertrāsīt: & descendit pituita ad humectandā palati membranam, quæ in eo ipso foramine illigatur, non secus quàm duram cerebri membranam, paulò supra ithmoïdis interstitium foramini modico innecti dixerimus. In extremo palato non procul à postremis dentibus vtrunque foramen videre est in eo quinto osse, quod quartum maxillæ superioris fecimus. Id autem foramen in geminos, acutōsq; angulos producit: admittit cū venulam, atque arteriolam, tum verò quartæ neruorū coniugationis portionem, qua palati tunica gustandi sensu particeps redditur. Inferior maxilla binis vtrunque foraminibus donatur, totidem intus, quot extrā: verū interna foramina maiora multò sunt externis, per quæ vena, arteria, neruus demittuntur ad singulas dentiū radices nutrimentum, vitam, sensumq; illis adferētes, vt suprà Cap. De Dentibus memorauimus. Nerui tamen eiusdem portio extra mentum egreditur, & ad musculos inferioris labri permeat, cui aditum præbent bina illa foramina

Nasi foramina.

Iugale instar pontis.

Temporis musculorum sedes: Palati foramina.

Quæ descendat pituita ad humectandā membranam palati.

Quarta coniugationis portio tunica palati gustandi sensu donat.

Foramē maxillæ inferioris.

Ad singulas radices dentiū fertur vena, arteria & neruus

Quinta neruorum cōiugationis portio ad muscūlum temporalem.

Aluoli dentiū respondent numero radicū numero.

Quæ foramina neque sedē neque numerum seruent.

Quandoque foramina os sincipitis penetrant.

Ossium usus.

Lingua voci articulanda præcipuè utilis.

externa iuxta circularia. In capitis basi, in ea temporum ossis parte, quæ cuneiformi proxima est, datur geminum foramen, unde quintæ neruorum cōiugationis portio ad temporalem muscūlum transmittitur. ad posteriorem styloïdis processus radicem, qua os mammillare respicit, foramen intueberis, per quod vena, & arteria antrum ingreditur ad auditus organū enutriendum. Iuxta processum mammillarem parte posteriore aliud foramen est aditum venæ, & arteriolæ præbens ossa nutriendi gratia. Tam superiori, quàm inferiori maxillæ insunt foramina multa, quæ præsepilolis aliàs cōparauimus, in quibus dentes fixi sunt, quæ non solum dentiū numero respondent, verum etiā pro eorundem radicū diuersitate variant. Ideo certus eorum numerus vix assignari potest. Habes insigniora foramina capitis: aliā verò per quæ venulæ, atque arteriolæ ad internam ossiū capacitatem, & ad membranā crassam pertranseunt: quoniam neq; firmam sedem habent, neque ordinem vllum obseruant, minimè digna nobis visa sunt, quæ describerentur. aliquando nonnulla reperies, quæ à latere ad latus perforant ossa sincipitis.

De Osse Hyoïde.

C A P. XII.

SA T I S constare arbitror ob hanc præcipuè causam genita fuisse ossa, vt super his muscoli consistere possent. Quamobrem cum in ore linguam natura formasset organū apprimè necessarium

cessarium tum voci articulandæ, tum aliis quoque functionibus, opus erat os aliquod parare, in quod ea commodè infereretur. nam cùm sit corpus molle, facilè concideret, nisi ab aliquo duro, stabilique sustineretur. Proinde os conditum est, quod linguæ peculiare esset, illique vni deseruiret, quando non potuit neque in occiput, neq; ad dorsum, neque ad latera vtriusque maxillæ implantari, quin aut fauces teget, impedirétque: aut certè magnam suarum vtilitatum partem amitteret. Hyoïdes id Latini cum Græcis appellant: idq, voce contractione, ὑψιλοῖδες siquidem dicendū esset, quòd ὑψιλον literæ formam exprimat. à nonnullis quoque vocatum est λαβδοῖδες, sed quoniam vbi coniunctum est, ac sinum facit, non ita acuto angulo terminatur, rectius illud ὕ figuræ quàm λ simile dicemus. quòd si quis os istud maxillæ inferioris imagini comparare velit, non malè fortasse fecerit, cùm non modò in arcum eiusdem maxillæ more curuetur, verùm etiam in duos, sicuti illa, processus desinat: quanquam hi non omnino eadem cū illis speciem seruent. Hyoïdes os ita hac figura fuit à natura exculptum, vt quamuis faucibus, ac laryngi præpositum esset, liberum tamē cùm inspirationi, tum etiam cibo, potuique transitum relinqueret. Quocirca medium ipsius officulū aliud maius anteriore parte, qua os respicit connexum est: & in valde obtusum angulum coit: posteriore

Hyoïdes os lingua peculiare.

Causa situs hyoïdis.

Hyoïdes os & hypsiloïdes & labdoïdes idē.

ὑψιλοῖδες rectius dicitur os lingua quàm labdoïdes.

Ossis hyoïdis cū maxilla inferioris figura collatio.

Cura ea contigerit figura ossis hyoïdi.

Hyoïdis ossis descriptio.

autem, quæ interna magis, & ad fauces vergit, concavum, superiore item gibbū, inferiore vero simum. pars anterior, ac superior linguæ insertionem suscipit ex duobus musculis constructam, quorum discrimen exiguum quodam processu terminatur, qui in superiore huius offis regione ad flexionis medium eminet: at posterior inferiorq; eiusdem officuli portio caua, & in sinum adducta fuit, ut cederet aperienti, ac sese attollenti linguæ, quæ tanquam claustrum laryngi supereminet, atq; ob id Epiglottis Græcè est appellata. ad laterum fines huius medij officuli duo alia committuntur in duos longiusculos processus diducta, qui extremas appendices habent, atque ij cum superioribus laryngis lateribus suis ligamenti innectuntur. ab horum processuum appendicibus nasci solent musculi, qui linguæ motibus deseruiunt, quemadmodum in libro de musculis dicitur. Iam verò cum os istud veluti pensile existat, satis firmitudinis, ac roboris habiturum non erat, si vnam tantum, quam diximus, in ipsam laryngem insertionem habuisset. Ideo natura duos alios eidem offi processus addidit: non ita prolixos tamen, ut qui iam descripti sunt: iuxta quos hi pariter exurgunt: at superiore parte, qua maius officulum, quod in medio situm est, hinc inde terminatur. nā per hos processus os hyoïdes processui stylum referenti, qui temporū offi utrinque affigitur, insigni ligamento connectitur, atque

*Epiglottis cur
ita dicitur.*

*Musculi linguæ
mouentes unde
orianitur.*

*Cur hyoïdes ha
beat plures pro-
cessus.*

*Quomodo hyoï-
des ligetur sty-
loidi.*

atque ita firmat vt in medio facilè consistat, ac neutram in partem distrahatur. ad hunc itaque modum ex quinque ossibus hyoïdes constructum habes, quod tamen aliquando priuatum inuenies processibus: nunc verò altero tantum, quorum locum tunc subeunt ligamenta lōgius à medij officuli finibus ad processus styliformes prætensa. & hæc de Hyoïde fat sint, quod in libello de ossibus missum fecit Galenus, fortè eius descriptionem parum necessariam arbitratus. Nihil igitur mirum est, si quidam de hoc ipso nihil meminerit, quem sicuti certò affirmare ausim cuncta, quæ de Anatome scripsit, ex Galeno transtulisse: ita dubito nunquam humanum corpus secuisse, aut aliorum sectionibus minimè interfuisse. Galenus tamen de Hyoïde lib. xi. de Partium Vsu nonnihil meminit. huius dicta excipiens Oribasius suo de ossibus libello in proprium caput redegit.

Hyoïdes ex quinque processibus.

Sagacitas Naturæ deficientibus processibus hyoïdis.

Gale. in lib. de ossibus non describit os hyoïdes.

Gale. 11. de Vsu Part. inuenit de hyoïde. Oribasius caput habet de hyoïde

De Larynge.

CAP. XIII.

SCIO non paucos admiraturos, quòd in hoc libro, vbi de ossibus duntaxat agere instituimus, laryngis explicationem interferamus: de qua in tractatu de cartilaginibus cæteri Anatomici meminere, à quibus veluti cartilagineum corpus describi solet. Ego verò cùm in his anatomicis nomen meum profitear, qui in nullius placitum iurauerunt, licere mihi arbitror, meam, quæcunque fuerit, sententiam

Cur in Tractatu de ossibus tractetur de larynge.

Anatomici complures describunt laryngem, itaque corpus cartilaginem.

in medium proferre, vt vobis cum re ipsa licebit conferre. Cum igitur ex innumeris prope modum sectionibus obseruauerim humanā laryngem in prouectionis ætatis corporibus ossēa esse, non cartilagineam : (quanquam à teneris annis cum nondum ad suam duritiem, soliditatemque redacta est, ex cartilaginea substantia constructa esse videatur) non possum non opinari eam magis ex ossēa natura, quàm ex cartilaginea cōstare. Hoc igitur in causā fuit, quamobrem in ossium numero laryngem adiudicantes de illa in ossium tractatu agamus. Vt igitur alios nunc omittam anatomicos, ac de Galeno, & Vesalio rātūm dicam, ambo sunt accusandi: Galenus quidem primo, quòd neglecto humano corpore simias dissecandas curauerit : deinde quòd vel in simiis ipsis laryngis substantiam ossēam prorsus non animaduernerit. Vesalius autem, quòd in humanorum corporum sectionem profiteretur, non humanam tamen laryngem, sed bruti secare semper solitus est. idque publicis theatris, quibus ego persæpe interfui. Nos igitur laryngem inter ossa connumerantes dicimus eam esse asperæ arteriæ caput, quod ad os, atque ad fauces pertingit, in cuius postremam superficiem præcedenti capite diximus, Hyoides os duobus processibus oblongis implantari, atque ita cum larynge ipsa committi. organum est, per quod spiritum admittimus, ac eundem reddimus, nec nō etiā vocis formadæ, quemad-

Larynx hominis senis ossēa est.

Larynx in tenera ætate cartilago videtur.

Gale. reprehenditur.

Gale. simias secuit non homines.

Larynx simiæ ossēa est. Vesalius secabat laryngem bruti non hominis.

Laryngis descript.

Larynx ossēa est.

Larynx est caput tracheæ.

Laryngis situs.

Laryngis usus.

quemadmodum ex eius descriptione patefiet, quam licet ossēā dixerimus, ad eius tamen compositionē concurrunt non ossa tantum, verum etiam cartilagine, ligamenta, muscoli, ac membræ: ut interim missas faciam venas, arterias, & nervos. Cæterum ossa, ex quibus larynx præcipuè conficitur, quinque sunt, ex quibus duo maxima corpus ferè ipsius laryngis cōstituunt. Parte posteriore latè disiuncta sunt, anteriore verò testitudinis ritu per acutum angulum vniuntur, cuius imaginem scuto, quod fortasse veteres in præliis gestabant, assimilantes, Anatomici scutiformem cartilagine, siue scutalem, siue peltalem, Græcè θυρεοειδὴν vocarunt. Eius posterior pars suprà infrâque processus habet, quos ex suis vtrinque lateribus singulos educit superioribus processibus, qui inferioribus longiores esse solent. Primi cōmittuntur hyoïdis processus, ac membraneis vinculis inuicem firmantur. Inferiores autem scutiformis processus posterioribus lateribus eius nempe partis quam reliqui secundam cartilagine innominatam appellant, nos verò tertium os innominatum facimus, cuius forma circularis est similitudine referens illos Parthorū anulos, quibus pollicem muniunt, ut validiùs sagittas eiaculentur, nam parte posteriore gulam, seu stomachum spectante latius est, & in acutum spinæ modo extenditur. Deinde quo magis ad anteriora pergit, magis extenuatur, donec quā

Quot concurrant ad laryngē componendū.

Ossa laryngis quinque.

Scutalis cartilago ab Anatomicis dicta quæ pars sit laryngis

Quomodo processus hyoïdis & laryngis cōmittantur.

Tertium os innominatū quod alij secundam cartilaginē innominatam appellant.

Tertij ossis innominati figura.

*Asperitas in
osse pro inser-
tione musculo-
rum.*

*Cur tertia os
circulare.*

*Quartum &
quintum os la-
ryngis appella-
tur tertia carti-
lago ab alijs &
cur.*

*Rima qua vox
modulatur.*

diximus figuram effingat. Vnde quaque teres est, nec ullam asperitatem præfert, præterquam quod posterius nonnihil eminet: ut duorum ibi existentium musculorum insertioni subseruiat, qui ab hoc tertio osse in quartum, ac quintum recto ductu feruntur, ut in libro de Musculis docebimus. Id autem os perfectè circulare natura fabricauit, ut esset basis, ac firmamentum laryngis, nec non etiam quoddam asperæ arteriæ propugnaculum, cuius est initium. nam nisi interna parte coalesceret, neque ea duritie præditum foret, periculum immineret, ne deglutiendo re aliqua crassa, vel dura, arctius respirationis via comprimeretur, unde fieret suffocatio. Vndique igitur continuum os istud factum est, ut asperam arteriam validius tueretur.

Quartum, quintumque os laryngis nobis erit, quod alij vnam, ac tertiam cartilaginem numerarunt. nam si partem hanc membranis, quibus obregitur, liberam sedulo intueberis: & laxari deprehendes, & in duo diductam cognosces. Quamobrem visum est nobis in duo partem hanc ossa distinguere, quæ ab apice tertij ossis intrò spectantis exurgunt. Huic enim tuberculo inarticulantur, atque inde à sua basi duas veluti pinnas emittunt, quæ ad imam scutiformis regionem parte anteriore copulantur, ac rimam constituunt modulandæ voci quam maximè accommodaram: sursum verò in duos processus tendunt, qui mutuò dexter cum sinistro vniuntur,

uniuntur, & vasis cuiusdam imaginem præ se ferunt, quo abluendis manibus aquam affundimus. Idcirco Græci partem hanc laryngis ἀρύτιαν, & ἀρύτιανοσδὴν vocarunt. Hæc duo ossicula inæqualia sunt, atque inuicem per ligamentum, ac per cartilaginem uniuntur: & supernæ membranæ ibi copiosissimè affidētis beneficio molliuscula esse videntur, vbi in duos processus desinunt, quibus scilicet natura veluti lingulis quibusdam vti voluit, non modò ad claudendum laryngis amplitudinem, & asperæ arteriæ meatum, ne quid, ex vomitu præsertim, quod lædat in internam illius capacitatem decidat, atque ad pulmones deferatur: sed etiam vt rimam illam moderetur variarum vocum efformandarum gratia, non secus atque in fistulis, aut tibiis lingulæ quædam imponi solent, ex duabus arundinum laminis cōpactæ. Propterea istorum processuum id genus lingulam constituentium vnio γλωττίς nūcupatur. Quòd autem ossa hæc sint, quæ hæcenus exposuimus, non diu anceps ille fuerit, qui eorum ipsorum colorem, duritiemque considerarit, ac præterea medullosam substantiam conspexerit, qualem ego sæpenuerò deprehendi, quo vno potissimùm cartilagine ab ossibus differunt. Siquidem cartilago omnīs ex omnium sententia medulla penitus caret. Ad hæc succedit cartilago vna, propterea illa quoque explicabitur. Hanc ἐπιγλωτ-

Quid significet ἀρύτιανοσδὴς.

Duorum processuum quarti & quinti ossis laryngis usus.

γλωττίς quid vocetur. Quomodo ossa esse nō cartilaginea.

Quæ laringem constituunt cognoscat.

Differentia præcipua ossis & cartilaginis.

ἐπιγλωττίς
quid significet.
Epiglottidis v-
sus.

Epiglottidis fi-
gura.

Cur de mēbra-
nis & musculis
laringis nunc
non doceatur.

τίδα Græci vocant, quòd lingulæ modò enar-
rata superemineat, atque operculi vicem ge-
rat, ne quid cibi, potúsve in laryngem de-
fluat, nec non etiam vicissim clauditur, ac re-
feratur ob mutuam inspirationis, & expiratio-
nis operam. Hæc modicè curuati scuticuli for-
mam imitatur, superiore parte ampla est, ac
sensim arctatur in mucronem desinens, quo
anteriori, ac superiori scutiformis parti, vnde
ortum habet, inferi videtur. Reliquum esset,
vt describerem, quibus membranis, & quomo-
do larynx intus, forisque inuestiatur: ac præ-
terea quor, quive sint muscoli motum hisce os-
sibus largientes: verùm ne doctrinæ ordo in-
terturbetur, congruè magis alibi hæc declara-
buntur.

De Dorso in vniuersum.

C A P V T X I I I I.

Dorsi structura
admiratu di-
gna.

Vertebrarum
compositio in-
star carinae.

Dorsum dat ro-
bur corpori.

NI H I L in vniuersi corporis humani fabri-
ca, quòd ad ossa pertinet, magis quàm dorsi
contextus admirabilis parentis nostræ indu-
striam attestatur, in quo vix fatis mirari possu-
mus quàm incredibili vsa sit artificio, vbi tot
vertebrarum situm, varietatem, ordinemq; in-
tuemur, quarum compositio instar carinæ cu-
iusdam esse videtur. Etenim si oculos in nascē-
tis naus exordium conieceris, facillimè perci-
pies, cum naus fundo rectè dorsum comparari
posse, ~~ad se~~, ad quod ipsæ costæ veluti curuatae
trabes

trabes affixæ adhærescant : atque ita corpus efficiant . quò fit , vt dorso corporis ipsius stabilitamentũ , & robur non immeritò tribuatur . Dorsum autem totam regionem interim nobis significet , quæ à basi occipitis vsq; ad extremum coccygem pertingit , quæque triginta quatuor vertebriis perficitur . Vertebrae verò siue spondyli nobis erunt ossa quædam egregia , formæ varietate distincta , ex quibus tanquam partibus dorsum cõflatur , quemadmodum infra plenius demonstrabitur . Dorsi beneficio præsertim humani (hoc enim duntaxat describendum suscepimus) recti stare , rectique ambulare possumus , qui legitimus est hominis motus , ac præterea antè , retrò , ad latera , & in gyrum quoquo modo flectere corpus valemus . Quãobrem ex vnicò , integròq; osse constare minimè debet . quãuis enim ita . promptius dorsalem medullam ab externis iniuriis vindicasset : homo alioqui diuinum animal quoddã veluti lapideũ , ligneũ , ve animal , neque sese erigere , inclinareque potuisset , neque tam varios motus edere . qui ad multos vitæ vsus maximè sunt necessarij . Iam verò minus debuit ex paucioribus , vt quatuor , aut quinque ossibus constare . Nam licet motus iidem fierent , difficilius tamén fierent , ac deinde dorso luxandæ occasio preberetur , id quod citra vitæ periculum vix vnquam euenire posset : quod luxationis genus animaduertens diuinus Hippocrates lib. de Articulis inquit . Si

Dorsi significatio.

Dorsum 34. vertebriis.

Vertebra quid.

Dorsum hominis describitur.
Dorsi vsus.

Ambulatio est legitimus motus homini.
Cur dorsum constet ex pluribus ossibus.

Cur dorsum ex paucioribus ossibus non constet.

Dorsi vertebra rû luxatio quã pertimescenda.

Hippocratis loci lib. de Art.

plures vertebrae, quæ ordine se consequerentur luxari contingat, graue quidem, sin verò vnā exilire, & à reliquarum compage dimoueri perniciosum fore. neque id iniuria. Nam si

*Luxata vna
vertebra spin-
alis medulla redi-
gitur in acutū
angulum.*

*Spinalis medul-
la sapit naturā
cerebri.*

*Pluribus verte-
bris luxatis spi-
nalis medulla
redigitur in se-
micirculum.*

*Cur dorsum con-
stat ex tot ver-
tebris.*

*Vertebrae tuen-
tur medullam.
Spinae situs &
causa.*

*Cur spina ita di-
cta.*

*Cur vertebrae
dorsi habent pro-
cessus in spina
& lateribus.*

vna vertebra luxetur, spinalem medullam ita secum diuellit, vt in acutum penè angulum illam cogat. Iccirco vel frangatur ipsa, vel comminatur necesse est, id quod lethale est: siquidem medulla hæc cerebri natura prædita est.

sin autem plures vertebrae simul luxentur, in angulum obtusum, vel magis in semicirculum deduci eandem oportet, ex qua distractione paritur quidem, verum non adeò, vt mors necessariò consequatur. Ergo ex pluribus ossibus veluti crebris, breuibusque intermediis constructum est dorsum: vt, quoad eius fieri posset, immune redderetur ab eiusmodi luxatione: nec non etiam vt vertebrarum corpora sic affabre facta in quencūque motum procliuiora forent.

Ad hæc vertebrae spinalem medullam, quam intus habent, mirum in modum tuentur. hinc non spinam modò tot processibus conspicuam habuere, qui mediam dorso regionem extrinsecus occupant, quod præcipuum est medullæ propugnaculum, vnde à potissima dorso parte totum Græci ἀκανθα hoc est spinam vocarunt: verum etiam ex lateribus hinc inde processus alios producant promptioris, maiorisque tutamenti gratia. quos interim tamen musculorum implantationibus subservire natura voluit: quæ æquè

æquè sollicita fuit de spinali medulla, ac de cerebro muniendo quoniam huic ex cerebri substantia productæ, & oblonquo tanquam cerebro gignendi erant nervi. In medus vertebra foramen extat, in quo dorsalis medulla sedet. ipsæ vertebræ quò magis à ceruice recedunt, eò magis augefcunt, & processus longiores, ac robustiores habent. sustinent enim superiores. Quæ igitur in imo positæ sunt, aliarum maximæ corpore constituerunt: vt vniuerso oneri ferendo sufficerent. Nam rationi consentaneum est, vt quod gerit, re lata maius existat. Præterea vertebrarum, processuumque magnitudo conferre plurimum videtur ad tuenda maxima vasa, venam scilicet concavam, arteriamque magnam, quæ sub ea regione resident. Dorsum quinque in partes diuiditur: in ceruicem, collumve, thoracem, lumbos, sacrum os, & coccygem. Quinque hæc suis vertebra constituantur, quæ in vniuersum triginta quatuor numerantur. Nam collo septem tribuuntur, thoraci duodecim, quinque lumbis, sex sacro ossi, postremæ quatuor coccygi. Cæterum ex his viginti quatuor iure optimo vertebræ nūcupantur. quippe quarum munere corpus in varias partes vertatur, & hæc ad sacrum terminantur. quæ autem ad os sacrum cum coccyge attinent: potius à similitudine, quàm cum superioribus aliqua ex parte obtinent, quàm quòd vertebrarum munere fungantur: vertebræ sunt

Processus laterales vertebrarum musculus etiam ferunt.

Natura est sollicita de spinali medulla ut de cerebro & cur. Spinalis medulla est cerebrum productum.

Locus medulla spinalis.

Cur vertebræ inferiores habeant corpora maxima.

Vertebra corpora & processibus magna melius tuerentur venam cavam & arteriam magnam.

Dorsi divisio.

*Colli vertebræ 7
Thoracis vertebræ 12.*

Lumborū vertebræ 5.

Ossis sacri vertebræ 6.

Coccygi vertebræ 4.

Vertebra propria quæ & quot.

Differentia vertebrarum ab iis qua per similitudinem ita dicuntur. appellatæ quæ pariter alio articulationis genere à superioribus inuicem componuntur. illæ namque Arthrodia articulantur, hæ verò postremæ per Symphyfim vniuntur. Sed clariùs hæc in priuata singularum tractatione sequentur quatuor capitibus.

De vertebra cervicis, & capitis motibus.

C A P V T X V.

Quæstiones quas omittit dedita opera.

Cur cervix constet ex vertebra.

Septem vertebra colli a se ipsis differunt & quomodo.

Cervicis usus.

AC PRIMVM ab illis vertebra supremis dorsi exordientes illud disputare omittemus, cur omnibus animalibus cervix non conveniat: & an illam pulmonum, vocisve gratia natura finxerit, quando hæc, atq; id genus problemata ex Aristotelis, aliorumque rationibus abundè discussa sunt. Quòd autem cervix ex vertebra constare debuerit: rei natura nobis apertissimè demonstrat. nã cùm emanet à cerebro spinalis medulla, in vertebraisq; cõrineatur, capiti vertebra contiguas esse oportuit, totum id spatij occupantes, quod à capite ad summum Thoracem interest, colli siue cervicis nomine donatũ. Cæterum hæ vertebra septem numero sunt, nō solùm à cæteris, verumetiam à se inuicem differentes. prima nanq; à secunda, & hæ rursus à subsequẽtib; diuersæ sunt. At quatuor à secunda ad septimam vsq; sibi similes in figura conspiciuntur. verùm septima ab omnibus distincta est, sicuti ex singularum descriptione patefiet. Cervix autem non modò hunc usum

vsu præstat, vt caput fulciat, sed etiam vt eius motibus potissimum conferat. Quamobrem operæ precium est cognoscere, quinam sint capitis motus, quóque illi ipsi modo fiant. Nam quod Galenus de iis scripsit, prorsus à veritate alienum existimatur, quemadmodum summus Anatomicus Vesalius longè hac in parte Galeno diligentior ex rei natura deprehendit. neque verò Galeni error librariorum incuriæ, aut insciitiæ ascribi potest, cùm pluribus in locis idem repetat. vt in x i i. de Part. Vsu. in lib. de offibus. & i i i i. de Aggessibus Anatomicis, quos mira diligentia se conscripsisse profitetur. Cùm itaque caput pluribus motibus moueatur: cùm illud Galeno teste x i i. de vsu Part. nullo motu careat, scire oportet illud partim suos, ac proprios motus edere, partim ad alienos motus cōsequi. Peculiares capitis motus duos esse non sequi. Peculiares capitis motus duos esse non semel eodem lib. Gal. asseruit, vnum, cùm caput antè retróque flectitur annuendo, renuendóq; alterum cùm ad altera circumducitur, hósque fieri manente ceruice. cùm autem caput valdè in pronom, ac supinum demittitur, atque etiam ad humeros vehementer adducitur, tales motus non sunt ipsius capitis proprii. siquidè cum tota ceruice fiunt, neque vlllo modo ea quiescente cieri possunt, & ceruix moueri nequit, quin simul etiam caput ipsum moueatur, nimirum qui est proprius ceruicis motus, hunc pariter capitis communem iudicamus. Iam verò proprios

Gale. errauit in capitis motibus.

Ves. in describendis capitis motibus Gal. diligentior.

Gale. errores de capitis motibus non possunt excusari.

Gale. est sibi similis in doctrina de motibus capitis libro de Vsu Part. de off. & quarto de Anat. Aggess. De motibus capitis.

Gale. 12. de vsu parti, Diuisio motus capitis.

Proprii motus capitis qui. Quod motus Gale. fiant manente ceruice.

Motus capitis & ceruicis communis.

Quomodo motus ceruicis proprius fiat capitis communis.

*Motus proprij
capitis sunt su-
per prima, &
secunda verte-
bra.*

*Prima & secun-
da vertebra
cap. alligantur.
Cur occiput in
pueris sit ex plu-
ribus ossibus.*

*Caput cervici
firmissime iun-
gitur.*

*Articulatio oc-
cipitis cum pri-
mis duabus ver-
tebris colli quo-
modo habeat.*

Gal. error.

*Quæ circum-
guntur axi inni-
suntur.*

motus super primam, secundamque vertebra-
tantum fieri certum est, cum hæ duæ cum capi-
te potissimum colligentur. Ab occipitio enim
multis partibus ligamenta fluunt, propterea di-
stinctum est in rimas ab initio, adeo ut puerorū
occiput ex pluribus ossibus cōstructum sit, quæ
postmodum ætatis processu ita coalescunt, ut
ne vlla quidem diuisionis nota appareat, atque
ideo vnicum ab omnibus censeatur. His liga-
mentis vndique annectuntur occipitio primæ
duæ vertebrae, ne caput huc, atque illuc temerè
delabi possit, quo fit, ut firmissimè cum ceruice
cohæreat. At suos ut motus commodius effice-
re queat, pereleganti artificio cum primis dua-
bus vertebribus occiput articulatum fuit, quæ arti-
culatio ad hunc habet modum. Ad eam occi-
pitij partem, ubi amplum est foramen, per quod
in dorsum spinalis medulla descendit, anterio-
ra versus duo assident prominentes, & in lon-
gum diducti processus, utrinque videlicet vnus,
qui primæ vertebrae sinus subeunt, quos in supe-
riore sui parte ascendentium processuum media
fede excultos cernimus. Huius articulationis
ope Galenus falsò putauit caput in gyrum verti
posse. Nam huic sententiæ aduersatur eiusdem
articulationis forma, quandoquidem illa, quæ
verti, ac circumagi debent, rei vni veluti axi in-
niti solent, non autem duabus oppositis parti-
bus infigi. Nam si caput moueretur, ut censuit
Galenus, circumduci non posset, nisi alteruter
processus

processus semper è sua sede exiliret: vnde luxari caput perpetuò necessum esset, quod nunquam sine vitæ dispendio accidit. Ergo solùm ex hac articulatione colligere possumus eũ motũ, quo caput modò inclinatur modò reclinatur. Circumducitur autè ad latus altera articulatione, quæ in secundæ vertebræ cū prima cõpositione miro modo celebratur. Exurgit enim è medio corpore vertebræ secundæ processus quidã rotundus, ac longus crassitie mediocri, quẽ nõ inuenistè Græci ὀδοντοειδὴς & ὀδόντια nuncuparũt, quoniam caninũ hominis dentem quodammodo referat. Proptereà Hippocrates huius partis gratia totam secundam vertebram dentem nominavit. quod perperam intelligens quidam processum posteriorem huius dentis loco accepit. Huiusmodi itaque dens primæ vertebræ sinu suscipitur, qui eo exculptus est loco, qui vertebræ corpori destinatus fuisset: nisi eius ipsius sinus gratia corpore priuatum iri oportuisset. quod itidem loco teres, ac solidũ hinc atq; hinc ligamentũ ducitur, dentem ad eò claudens, vt ne ibi dorsalem medullam appositam cõuulneret, aut certè comprimat, & tamen laxam articulationẽ illam relinquat, cuius beneficio circumagi vertebra superior possit, in quam infixum, ac persistens eo quo diximus modo caput simul ad latera circumuertatur. qua in re Galenus quoque reprehensione non vacat: quippe qui non animaduertit eiusmodi esse hanc articulationem,

Caput sine vita discrimine non luxatur.

Caput inclinatur & reclinatur ope articulationis eius cū prima vertebra.

Caput circumducitur articulatione secundæ vertebræ cum prima.

Quid sit processus odontoides.

Cur Hippocrat. vocat secundam vertebram dentem.

Error cuiusdã. Describitur articulationis secundæ vertebræ cū prima.

Ligamentum processus dentis dicti.

Gal. error.

Valuarum cardinibus articulationem comparat. Epilogus.

qualem in valuarum, hostiorumque cardinibus intuemur, quibus ostia ipsa, valuarque sustinentur, & tamen non sursum, neque deorsum mouentur, sed solummodo circumaguntur. Ex his iam tandem constare puto qui sint proprii, quive communes capitis motus, & quomodo cum hi, tum illi fiant: quanquam ad hos ciendos necessaria sit vertebrarum cum capite coniunctio. ac demum veritatis cultoribus cum Galeo errandi occasionem sustulimus. nunc reliquum est, ut ad vertebrarum colli descriptionem redeamus. Prima ceruicis vertebra aliis quidem tenuior, verum densior, ac solidior existit corpore: processuque superiore caret. Etenim sciendum est vertebram in corpus, ac processus multiuges diuidi solere. corporis nomine partem magnam, ac veluti corpulentam intelligimus. reliquum verò, quod à corpore superat, partim foramen dorsali medullæ paratum constituit; partim in processus absumitur. Processus autem cum dicimus, eas vertebræ partes intelligimus, quæ ex iis qualibet sede protuberant. Parte igitur anteriore primæ vertebræ, ubi corpus esse debuit, adest portio quædam pertenuis, quæ intrinsecus, quæ respicit foramen, per quod spinalis medulla pertransit, in sinum excavatur: extrinsecus verò in œsophagum pertinet tuber quoddam emittit, quo tanto crassior, firmiorque redditur, quanto ob posteriorem dictam cavitatem gracilior, ac imbecillior facta fuerat. Hoc
sinu

Prime vertebra cum aliis comparatio.

Vertebra diuiditur in corpus & processus. Corpus in vertebra quid.

Processus in vertebra quid.

Prima vertebra anterioris figura.

Tuberis primæ vertebrae usus.

Sinus primæ vertebrae usus.

sinu (sicuti paulò suprà dictum est) dentem à secundæ vertebræ corpore productum excipit, cui crustæ modo cartilago innititur, cuius beneficio & lubrica magis in edendo motu fit articulationis, & cauetur ne nimio motu atterantur ossa, Id quod in omnibus aliis vertebrarum articulationibus obseruatum cernimus. Præterea operæpretium est, ut diligenter annotes ascendentes, ac descendentes processus, quibus æquè omnes vertebræ donatæ sunt. Nam in aliis altera tantum parte sinus habentur, quemadmodum suo locò dicam. In prima verò utrinque sunt excavati: ut supernè quidē admittant occipitij processus, infernè autem superiores secundæ vertebræ. unde colligere potes primam vertebra nullam ex parte suscipi: sed utrinque tam superiorum, quàm inferiorum ossiū insertionem suscipere. Item è lateribus eiusdem primæ vertebræ versus anteriora erumpunt duo alij processus prælongi, ac perforati, qui & maiores sunt, quàm in cæteris vertebris, & foramen quoque maius habent, per quod vena, arteriaque transeunt ad caluariam, & ex se propaggines aliquas ad medullam dorsalem trāsmittunt. Ad processus superiores & inferiores, quos ascendentes & descendentes nominauimus: versus posteriora, si primam spectes, sin autē reliquas anteriora versus sinus utrobique singuli iacent, quibus effingendis non modò vertebræ os, quod ambit foramen dorsali medullæ paratum, sed postre-

Cartilaginis in prima vertebra articuli cum secunda usus.

Observatio in omnibus vertebrarum articulationibus.

Omnes vertebra habent processus ascendentes & descendentes.

Cur prima vertebra processus sint utrinque excavati.

Prima vertebra utrinque suscipit non suscipitur.

Processus laterales primæ vertebræ quales.

Foraminis processus lateralis usus.

Processus superior & ascendens idem, & processus inferior descendens.

Vertebra penè omnes dorſi in- ciſe ſunt ubi committuntur.

Sinus inter pri- mam & ſecun- dam vertebrā ab aliis diſſe- rentia.

Thoracis verte- brarum ubi cō- mittūtur ſinus qualis.

Sinum verte- brarum ubi cō- mittitur uſus.

Coniugia neruo- rum tot ſunt quot vertebra.

Primi neruorū coniugij & ver- tebra ortus.

Secundi cōiugij neruorū ortus.

Vena & arteria ortus in ſinibus neruorum con- iugij commu- nibus.

Secunda verte- bra descriptio.

Dens oritur in ſecunda verte- bra ex corpore ipſius.

Dentis ſuperfi- cies cur aſpera & acuta.

Tuberculi aſpe- ri in ſecūda ver- tebra uſus.

ma quoque proceſſuum portio ceſſit: id quod cōmune eſt omnibus ferè dorſi vertebris, quas incifas eſſe comperies, vbi inuicem committū- tur, ita vt tam ſuperioris, quàm inferioris verte- bræ ſubſtantia participant. Hi ſinus in prima, & ſecunda vertebra oblongæ rimæ ſpeciem ſer- uant, in reliquis orbiculari ſunt figura, præter- quàm in Thoracis vertebris, vbi in longum ex- cauantur. Per hos ſinus efluunt neruorū con- iugia numero diſtincta, quemadmodum & ipſe vertebra diſtinguuntur. Quamobrem è ſinibus ſuperioribus primæ vertebrae producitur primū neruorum coniugium: ab inferioribus autem, qui nihilominus ſunt ſecundæ vertebrae com- munes, exeunt ſecundæ coniugationis nerui, ex aliis verò alia paria pro vertebrarum ſitu, ac numero. Hi verò ſinus, quos diximus, non mo- dō neruis, verū etiam venarum, atque arteria- rum ramis aditum præbent: vnde nutrimentum tam dorſali medullæ, quàm vertebrarū oſſibus ſuppeditetur. Secunda vertebra præter ceteras dotes, quæ primæ tribuūtur, & corpus, & pro- ceſſum poſteriorem habet. Ex ſummo corpore dētem illum promit, de quo ſatis ſuprà dictum eſt, cuius ſuperficiem aſperam quoquomodo, a- cutamque natura conſtruxit, vt inde commo- diūſ vinculum prodiret, quo occipiti alligare- tur ea parte, quæ ab utroque occipitij proceſſu memorato eque diſtat, vbi adnatū eſt exiguum, aſperūque tuberculum, cui tenaciūſ adhæref- cat.

cat. Processu item posteriore insignita est, vt inde enasci possint musculi duo in occiput inserendi, quibus musculis sursum perentibus ne quicquam posterior primæ vertebræ processus officeret, illum prorsus natura ademptum voluit: posterior autem secundæ processus in extremitate scinditur, ac vt ita dicam, bifurcatur: vt commodiorem musculorum nexum efficeret, quam bifurcationem in reliquis etiam colli vertebris obseruabis. Hanc Galenus ignorauit suis delusus simiis, in quibus integri sunt: & si postrema nōnunquam illum integrum, nec bifidum gerat. Præterea secunda vertebra laterales processus longè breuiores obtinuit, quàm prima, in quibus peculiare illud est, quod foramen obliquè, non autem rectè vt in aliis exculptum est. Dantur item huic & ascendentes, & descendentes processus: sed ascendentes leuiter extuberant, ideo in humiles inferiorum primæ vertebræ processuum sinus immittuntur, ac descendentes exilibus pariter sinibus præditi sunt, vt sequentium processuum insertionem admittant. Iuxta hos processus adstant illi sinus, siue illa foramina, de quibus antea dictum est, quæ transmittitur secundum neruorum coniugium à spinali medulla descendentium. Iam verò scire oportet ceruicis vertebrarum corpora, prima tamen excepta, quam corpore destitutam esse diximus, in longum aliquo modo extendi, ac partem anteriorem planam exigere: cùm illi

Cur secūda verteb. habet processum posteriorem.

Cur prima verr. careat processu posteriore.

Cur posterior processus secundæ vertebræ sit bifidus.

Processus posteriores verr. colli omnes sunt bifurcati contra Galen.

Processus laterales secundæ verr. sunt breuiores & foramine obliquo.

Processus ascendentes.

Processus descendentes.

Sinus per quos exeunt nerui vena & arteria sunt iuxta processus.

Corpora vertebrarum colli qualia.

Cur anteriora corpora verr. colli sint plana.

Oesophagus descendit in ventriculū.

Aspera arteria tendit ad pulmones.

Committuntur corpora vertebrarū colli pene ut ossa temporū.

Prima vertebra caret appendice.

Omnes vert. colli præter primā habent appendices.

Cartilago crassa & mollis cur sit inter appendices vertebrarum.

Cur processus laterales vertebrarū colli post secundum sint bifidi.

Septima vertebra colli qualis.

Posterior processus septimæ vertebrae nō est semper bifidus.

Cur plana sit inferior pars posterioris processus septimæ vertebrae.

substratus sit œsophagus in ventriculū descendens, ac simul affidet aspera arteria ad pulmones tendens. Harum itaque committendis corporibus aliam à cæteris rationem natura exco-gitavit: nam præcedentis pars inferior declivè sensim exciditur, superior verò sequentis modicè quoque declivis est, ut portio illius portionem excipiat modo haud absimili à temporum ossium commissura. Colli vertebrarum corpora, prima tamen excepta, appendicibus utrinque decorantur: inter quæ locum habent cartilaginee crassæ, ac molles, ut flectendi munere in quamcunque partem liberiùs fungantur. Cæterum, vertebræ, quæ secundæ succedunt, proprium id habent, quòd earum laterales processus bifidi sunt, quod ob musculorum implantationem factum fuit, ut etiam in posteriore processu suprà adnotatum est. Septima vertebra, cum finitima sit thòracis vertebra, non nihil est earum naturæ particeps: itaque à superioribus distinguitur. Aliquando enim illius posterior processus integer est, non bifidus. Præterea inferior huius corporis pars, quæ spectat primam thoracis vertebra, non obliquè, nec declivè extenditur, sed plana est aliquantulum: quò sequētis corporis parti æqualiter cohæreat.

De Vertebri Thoracis. CAP. XVI.

Thoracis vertebrae 12.

THORACI deseruientes vertebræ duodecim numero sunt, quibus singulis binæ costæ articulantur, ita ut numero sint vigintiquatuor.

quatuor. Tametsi quandoque superesse vna, quandoq; desse inueniatur. rarissimum quidem vtrunque est, verum rarius multò est, vt desit.

Costa quandoque 24. Costa quandoque etià 23. vel 25.

Variant hæc à ceruicis vertebris, si quidem maiore sunt corpore, quanquam ab illis densitate, ac soliditate substantiæ superantur. & profectò

Rarius est vt ex costis vna desit quam super sit.

maius corpus fortiri debebant, quando maiores non esse non poterant superioribus sustinendis addictæ. verum obseruabis ea, quò magis mole

Differentia vertebrarum thoracis à vertebris colli.

augmentur, eò rariore, ac fungosiore substantia prædita esse, ac prætereà foraminibus quamlibet exiguis referta, vasorum nutrimentum de-

Cur corpus vertebrarum thoracis sit maius corpore vert. colli.

fererit excipiendorum gratia. At corpora hæc, præterquàm quòd & rariora, & fungosiora sunt:

Corpora vertebrarum quanto maiora eo fungosiora.

figura, & situ à ceruicis vertebrarum corporibus non parum discrepant. Etenim minimè lata sunt, nec depressa, qualia illa esse dicebamus.

Foram. in corpore vert. usus.

Sed in medio protuberant, & in rotundum adducuntur: præter duas primas, quæ ob colli vici-

Figura corporum vertebrarum thoracis lata.

nitatem quoquo modo corpore sunt depresso, ac lato. Horum itidem corpora suprà, infràque

Plana.

plana existunt, & multam cartilaginem interiectam possident. In eo prætereà ab usdem cer-

uicis vertebris diuersæ sunt, quoniam posteriores processus nec bifidos, nec rursus latos,

Processus vertebrarum thoracis quales.

atque in extremitate rotundos gerunt: sed oblongos, & acutos quadrangularis pyramidis

ritu, ac deorsum decliues, neque transuersis sunt processibus bifurcatis, sed longis & magnis, necnon in rotundum, & crassiusculum

G

*Costarum tuber-
ra articulatur
cum camitati-
bus processuum
vertebrarum tho-
racis.*

*Thoracis verte-
tres prima de-
orsum, tres po-
steriores sur-
sum respiciunt
media medio
modo.*

*Processus trans-
uersi undecima
& duodecima
vert. quales.
Costa nothæ ce-
dunt quādoque
intestinis tumē-
ribus.*

*Quomodo ver-
tebra costis va-
lidissimè alli-
gentur.*

*Prima vertebra
undecima & 12
quales sinus ha-
beant.*

caput desinentibus, qui primo exortu sursum feruntur, inde verò. flectuntur deorsum tendentes, partēque interna excauati costarum tuberibus commodam articulationem præbent. quæ cavitates in tribus primis inferiorem regionem, in tribus autem postremis superiorem occupant, adeò ut illæ deorsum, hæ verò sursum respicere videantur. at quatuor mediæ medio se habent modo. Cæterum transuersi undecimæ, ac duodecimæ processus non sunt eiusmodi. namque iis nothas costas veluti breuiiores atque intumescensibus intestinis plerunque cessuras, tam valide alligari minus expediebat. Quamobrem vnica illa, & mediocri articulatione vertebrarum corporibus duntaxat committuntur. Reliquæ omnes validissimis ligamentis nectuntur, atque ut firmior sit huiusmodi nexus: ad latera corporum vertebrarum sinus adsunt costarum capitula excipientes, qui tamen non in omnibus eundem seruant situm. Nam præter primam, undecimam, ac duodecimam sinus isti communes sunt, siquidem ad corporum extremitates, quæ vertebræ mutuo vniuntur, iacent iuxta foramina transmittendis nervis parata: sed prima, undecima, & duodecima hos sinus in suis ipsarum corporibus excultos habent, quos omnes cartilaginea crusta oblitos licet animaduertere. Iam verò thoracis vertebræ aliis quoque nominibus inuicem distinguuntur. Etenim posteriorio-

steriores processus, qui spinam constituunt, neque ita longi, neque acuti in tribus postremis conspiciuntur: sed lati quodammodo sunt, & in extremitate in orbem circumscripti, nec absimiles vertebrarum lumborum processibus in eadem serie constitutis, vbi adnotare operæpretium est, posteriorem duodecimæ processum omnium breuissimum, & minus alijs dorsum spectantem. Hîc non est prætermittendum, quòd quæ nos cum rectè sentientibus duodecimæ tribuimus, ea Galenus decimæ ascribit: verùm illi canes, & simiæ imposuere, in quibus decima est dorso vertebrarum medium, ac veluti punctus & axis quidam: quo omnino quiescente cæteræ hinc inde moueantur. quod in duodecima hominis verum deprehendes, quæ parem articulationis speciem ab vtraque parte est consecuta. infrà namque supràque processus mediæ extuberantes habet, vt vtrinque suscipiatur, contrà quàm primæ cervicis vertebræ vsu venit, quam vtrinque suscipere capite superiore demonstrauius. Quòd si quis huius articulationis varietatis diligentius rationem requirat, animaduertere oportet eandem motus rationem in superioribus vertebris ad duodecimam vsque seruari: inde verò à subsequentibus nempe lumborum vertebris contrariam. Quocirca contrarius quoque in illarum superioribus, inferioribusque processibus articulationis modus reperitur, & fortè præcedetium

Processus posteriores vertebrarum thoracis quales.

Decima vertebra in cane & simia est medium vertebrarum dorso, sed in homine 12. Gal. error.

Duodecima vertebræ vsus & figura.

Duodecima vertebræ vtrinque suscipitur.

Prima vertebra vtrinque suscipitur.

Cur non sit eadem in omnibus thoracis vertebris articulatio.

Dorsum quomodo in anteriora flectatur. Qua opè dorsum ad posteriora curuetur.

articulatio aptissima est ad dorsum in anteriora flectendum : cùm verò illud ipsum ad posteriora toto penè corpore curuatur , id muneris tunc lumborum vertebræ præstiterint . Thoracis vertebræ illud postremò commune habent , in quo à superioribus maximè differunt , quòd quinis appendicibus sunt donatæ , binis ad ipsorum corpora suprà infràque totidem ad trāsversos processus , ac demum singulis ad extremitatem spinæ.

Vertebra thoracis habent quinque processus & quos.

De Lumborum Vertebribus.

CAPVT XVII.

Vertebra lumborum 5.

Substantia vertebrarum lumborum qualis. Processus superiores & inferiores quales. Cur vertebra lumborum committantur diverso modo.

Processus transversi.

Prima & quinta vertebra.

Ex ijs, quæ suprà de colli, ac thoracis vertebribus dicta sunt , non pauca eliciuntur , quæ ad vertebrarum lumborum explicationē attinent , quæ repetere nullo pacto est opus . Lumborum igitur vertebræ quinque numero sunt , atque hæ superiorum omnium maximæ : verùm substantia rarissima , & foraminibus crebris pervia constant . Harum superiores processus sinu speciem referunt inferiores autem in hos immittendi paululum eminent , atque ita sua & ipsi cartilagine recti cōmittuntur , contrà quàm in superioribus fiat , quoniam hæc articulatio oppositam motus rationem præstat . Transversi processus longiores multò his , quàm thoracis vertebribus , attamen tenuiores , atque inter se dispares . Prima enim & quinta lumborum vertebrarum breuiores illos habent , quàm medix : qui à se inuicem prætereà dissident , quoniam

niam superiores deorsum, inferiores sursum, v-
nius verò, quæ media est transuersi processus,
nec sursum, nec deorsum vergunt: quicquid
de his senserit Vesalius. Tales autem processus
costularum vicem quodammodo gerunt pecu-
liate maximis vasis propugnaculum allaturi.

Non enim eo loco iustæ magnitudinis costæ
produci potuere: siquidem non conducebat
eam intestinorum regionem ossium mole, ac
duritie comprimi, quam ad immodicam ex-
tensionem nonnūquam deuenire oportet, præ-
sertim in fœminis, quando vterum gestant. cui
rei natura consuluit accuratius: cum duas po-
stremas costas, & breuissimas efformarit, & sen-
sim à pectoris osse obduxerit: satis fore existi-
mans si transuersos lumborum vertebrarū pro-
cessus tantum porrigeret, quantum venæ cauæ,
magnæque arteriæ muniendis opus foret. Non
procul ab his processibus duo alij, vtrinque sin-
guli, exoriuntur exigui admodum iuxta nervi
exortum, quos Vesalius in homine nunquam,
in canibus verò, ac similibus se animaduerrisse as-
seuerat. Cui ego hac in parte subscribere nullo
pacto possum, & verissimā esse sententiam Ga-
leni cogor fateri, cum sæpe in cadaueribus pu-
blice sectis Patavij, Pisis, Romæque eius gene-
ris ossa animaduernerim: & pleno theatro attre-
ctanda proposuerim, quæ haud dubiè nuper
dictis processibus abundabant. Quid? quòd apud
me sceletos adhuc perstat, in cuius lumbo-

*Transuersi pro-
cessus media
vertebra lum-
borum quales.
Error Vesalij.*

*Transuersorum
processuum u-
sus.*

*Cur in loco pro-
cessuum trans-
uersorum costæ
non sint produ-
ctæ ad maiore
longitudinem.*

*Productio trans-
uersorum proces-
suum vertebra-
rum lumborum
quanta sit.*

*Processus alij
duo.
Contra Vesal.
præ Galeno.*

*Processus est a-
natomen, Para-
vij, Pisis, Romæ*

*Sceleron habet
domi.*

rum vertebris tales processus insigniter apparent. Hi tamen non in omnibus apparent. Aliquando inveniuntur vertebræ, in quibus obscurissimi sint. Atque hæc prolixius dicta sint, ut omnibus perspicuum sit, me in rebus Anatomicis non tanti Galenum & Vesalium, quos plurimi facio, quàm veritatem ipsam facere: veritatem appello, vbi cùm rei natura oratio maximè concordat. Dantur prætereà lumborum vertebris posteriores processus, neque longi, neque acuti, neque ita deorsum tendentes, quales in superioribus vertebris visuntur: sed validi sunt, crassi, ac lati, & in extremitate circulari linea definiti. Hæ tandem vertebræ aliarum more appendicibus exornantur, quæ quanto cæteras magnitudine antecellunt, tanto etiam cartilaginem, quæ inter ipsarum corpora mollißima intersidet, maiorem, & crassiorem adæpta sunt, neque foraminibus illis destituuntur ante inferiores, superioresque processus exculpis, per quæ tam patet ingressus vasis nutrimentum afferentibus, quàm exitus nervis ex dorsali medulla progredientibus. Hæc autem foramina à superioribus differunt. non enim verè orbiculata sunt, neque magis in vnius, quàm alterius vertebræ parte excavantur, sed parem vtriusque portionem exemptam postulant, quemadmodum videre est in quibusdam ceruicis vertebris. id quod si minus obseruatum videris, non magni referre putato, si humilior isto-

Galeno & Vesalio in rebus Anatomicis veritatem præfert.

Processus posteriores lumborum quales.

Vertebra lumborum habent appendices.

Cartilago inter corpora vertebrarum qualis.

Vasis foraminum ante processus inferiores ac superiores.

Differentia foraminum vertebrarum lumborum ab aliis.

istorum foraminum sedes inferioribus vertebra-
 tribuatur. Illud autem omnium vertebra-
 rum dempta ceruicis prima commune fuerit,
 quòd in posteriore corporis parte, quam vtri-
 que spinalis medulla parte sua anteriore attingit,
 adfistit foramen patens, ac peruium sub-
 intrantibus venis, atque etiam arteriis, vt ali-
 mentum abundè suggerant. Atque hæc hac-
 tenus de ceruicis, thoracis, ac lumborum ver-
 tebris: quarum descriptio à Galeno tradita om-
 nino reiicienda est, quando cum brutis po-
 tiùs, quàm cum humanis conuenire videtur.
 In sacro item, & coccygis osse Galenum ea-
 dem ratione non sequemur, vt sequenti capite
 palàm erit. Illud insuper adnotabis postero-
 rem processum, quem spinam vocari diximus,
 deorsum tendere à secunda ceruicis vertebra
 vsque ad vltimam lumborum, quamuis secus
 Galenus senserit, qui dixit processus sub decima
 sursum vergere.

*Commune om-
 nibus vertebra-
 rum, præter primam
 ceruicis.*

*Galen. errat in
 vertebrarum fa-
 cri & coccygis
 descriptione.*

*Spina tendit de-
 orsum a secun-
 da vertebra col-
 li ad vltimam
 lumborum.*

Gal. error.

De Sacro, & Coccygis osse.

CAP. XVIIII.

DO R S I duæ iam postremæ partes restant,
 quarum alteram sacrum, alteram verò coc-
 cygis os nuncupamus, vtroque à Græcis sum-
 pro vocabulo, siquidem illi hoc *ἱερόν*, illud au-
 tem *κόκκυγας* dixere, nonnunquam etiam sacrum
πλατὺ vocarunt: latum id, amplumque intelli-
 gentes. superat enim non modica amplitudine
 reliquas omnes vertebrae, quibus veluti basim

*ἱερόν.
 κόκκυγας.
 Cui πλατὺ
 vocent os sacrum.*

G iiij

substratum animaduertimus. idem verò apud
 veteres ἑρὸν, quod magnum sonat. Illud de hoc
 osse satis absurdum est, atque à rei natura maxi-
 mè abhorrens, quod nonnulli magni etiam no-
 minis authores commenti sunt: os istud fœmi-
 nis, dum pariunt, ita dilatarì, ac retrocedere, vt
 percommodè tœdus edi possit: ac propterea sa-
 crum appellari. Neque mihi adducenda videntur,
 quæ Galenus variè de hoc osse tradidit,
 cùm satis constet, non humanum os sacrum,
 sed belluinum, quale est canum, ac simiarum,
 ab eo fuisse descriptum, quemadmodum plu-
 ribus verbis quàm fortasse necesse fuit, Vesa-
 lius ostendere conatus est. Verùm enimvero
 hæc, atque alia quandoque in medium afferri
 debent, vt nonnulli discant legendis authori-
 bus iudicium adhibere, neque Pythagorico-
 rum more satis esse ducere, quod ipse dixerit.
 cuius tantum opinio præiudicata poterat, vt e-
 tiam sine ratione valeret autoritas. Quis enim
 non videt magnum Galenum quandoque dor-
 mitare. cùm ossa non distinxerit, quantum à
 brutorū ossibus humana distarent? Illud enim
 ne à sacro osse discedamus, quod scripsit Gale-
 nus in sacro osse tria tantum inueniri forami-
 na, quæ in ossium, ex quibus id ipsum constar,
 compage exculpra sunt: videre non possum,
 quo pacto verisimile sit tribus foraminibus do-
 nari posse, cùm duas tantum commissuras ob-
 tineat. quandoquidem vult ex tribus id ossibus
 constru-

ἑρὸν, id est, magnum. Etymologia sacra: os quod ita vocetur quia in parientibus dilatarur absurdissimum est.

Gale. descripsit os sacrum belluinum.

Vesalii sermonis prolixitas.

Authoribus legēdis iudicium adhibendum. Pythagorici sacri erat αὐτὸς ἑρὸν.

Gale. quandoque dormitat.

Galenus error.

constructum, quem simiæ, vel canis, vel leonis os sacrum inspicienti non obscurum erit, minus verò tria hæc foramina sacro ossi humano tribuentur: quòd videlicet non ex tribus, neque ex quatuor (vt ille arbitratus est) verù ex quinque, & sex plurimum ossibus conflatum est. Quæ tametsi in ætate adhuc tenera laxari, ac separari possunt, neque tunc multum à reliquis vertebri differre videantur: tamen cùm facta sint, vt consistent, ita coalescunt, vt nisi interna parte, quæ anterior est commissurarum notæ seruarentur, vix quisquam crederet ex pluribus illud ossibus constare. Cæterum ossa hæc nō secus inuicem commissa sunt, atque superiores vertebrae, præterquam quòd interstitio cartilagineo carent, quo minimè opus erat immobilibus futuris. Quamobrem in vertebrarum numero habentur, non quia vertebrarum vsum præstent, cùm nulla ratione moueri possint, verùm quia similitudinem quãdam retinent, per quam cum illis conuenire videntur. Nam si à teneræ ætatis corpore sumpta hæc ossa decoxeris, & à se inuicem diuulsa consideraues, & corpus in iis, & processus, ac demum eandem penè figuram obseruabis, quam vertebrae ipsæ præ se ferunt. Porro non aliam ob causam os istud à natura paratum fuit, quàm vt super eo quiescente reliqua ossa inferiora, æquè ac superiora mouerètur. licet enim ad ossa partes corporis vniuersæ adhærescant, atque iis motis eæ-

In simia cane & leone verum est quod scribit Galen. de osse sacro.

Os sacrum hominis ex quinque vel sex ossibus.

Os sacrum in ætate tenella laxatur & separatur.

Vbi seruetur vestigium commissuræ in osse sacro.

Quomodo intel ligatur os sacrum haberi in numero vertebrarum.

Ossis sacri usus.

*Os sacrum cur
unum.*

*Cur in medio si-
rum est.*

*Cur in medio
ipsius sunt fora-
mina.*

*Spinalis medul-
la transiens per
os sacrum nervi
naturam sapit.*

*Nervi a sacro
esse ad nates &
aliquot muscu-
l. femoris.*

*Os sacrum ad la-
tera ante & re-
tro est perfora-
tum.*

*Si ossa sacri
sunt sex forami-
na utrinque
sunt quinque
& qualia.*

*Foramina utrin-
que in osse sacro
extra minora,
intro maiora
sunt.*

dem simul moueantur, ex naturæ tamen lege vnum præcipuum os esse debuit, ad quod reliqua ossa stabilirentur. quod profectò commodius alibi, quàm in medio penè corpore locari non potuit: vt tam superioribus, quàm inferioribus mouēdis assisteret. At quoniam dorsalem medullam admittere debebat, transmittendūsq; ab illa nervis vias recludere: iccirco in eo foramina sunt incisa, per quorum medium spinalis medulla descendit, quæ adeò dura, solidāq; existit, vt nervi magis, quàm medullæ naturā sapiat. Quapropter in nervos plures, ceu in ramulos definit, qui extra fines sacri ossis parte posteriore progressi ad nates, & aliquot vtriūsq; femoris musculos deferuntur. ad latera item antè, retròq; perforata sunt ossa ista, quæ scilicet inuicem cōmittuntur. foramina verò rotunda sunt, & æquè superioris, ac inferioris ossis portionem occupant, vnde nervi fluunt. Cùm autem sex ossa (totidem enim illa sepe numero esse solent) quinque necessariò commissuris vniantur, quibus etiam utrinque foraminibus donari oportet: quorum duo prima maxima sunt omnium: reliqua verò quo longiùs à primis abscedunt, eo minora fiunt: verùm extrinseca omnia si cū intrinsecis conferantur, minora cernuntur. Quòd si etiam addas partem illam, qua cum postrema lumborum vertebra superior primi sacri ossis portio coniungitur, cū illic extent duo alia foramina: dicendum est sacrum iis pariter foraminibus

foraminibus abundare. Ex quibus omnibus, qui nerui transmitti soleant, suo loco docebi-
mus. Huius ossis figuram non video cui rei cō-
ferre possim, nisi protuberantis propugnaculi
formam imitetur. Etenim supernè planum ha-
bet corpus, cui incumbit quinta neruorum ver-
tebra, & se in bina latera protendit, crassa illa
quidem, ac geminis processibus parte postero-
re munita, atque ita respondet secundo: post-
modum descendens semper fit angustius, quo-
vsque in acutum ferè tendat, vbi primum os
coccygis coalescit. Præterea parte anteriore le-
ue est ac simum, vt organis, quæ subsunt, cedat,
neque abesse vlllo pacto possit. posteriore verò
parte gibbum est, vt firmitus hæreat, ac eas par-
tes, quas munire debet, validiùs tueatur: nec
minus asperum quoque est, multòsque sinus,
ac processus facit, quæ potiùs tubercula quæ-
dam mihi esse videntur. Posteriores item pro-
cessus breuiore sunt, nec secus atque ossa, vn-
de prodeunt, inuicem committuntur, ac vnam
veluti spinam constituunt: quod tamen in qua-
tuor, vel tribus primis ossibus obseruabis. At
quæ sequuntur posteriores processus in duas
quodammodo partes diducunt: vt exerenti se-
se medullæ, ac in plures, vt dictum est, pro-
pagines diuisæ sinum parent, qui tamen hinc
inde prominentes aliquantum illam tueri vi-
dentur. Primum os sacri hoc habet pecu-
liare, quòd superiores emittit processus leui-

*Neruorum de-
scriptionem aliò
reicienda.
Figura ossis sa-
cri.*

*Os sacrum cur
antere sit le-
ue ac simum.*

*Cur posteriore
gibbum.*

Cur asperum.

*Sinus ac proces-
sus ossis sacri.*

*Os primum sa-
cri quid habeat
peculiare.*

ter cauos, quibus immittuntur inferiores postremae lumborum vertebrae processus modicè protuberantes. Demum notandi sunt tres sinus in extremis trium superiorum ossium lateribus, quorum medius maior est, ac profundior cæteris. in hos tenaciùs inferuntur prominentes iliorum partes, atque ita cum tràsuerfis processibus eorùdem cartilaginis, ac ligamenti interuentu cohærent, vt vix diuelli possint. quin etiam videre est iliorum ossa ad eò sacro ipsi cõnexus, vt connata quandoq; videantur. Nec mirum id cuiquam videri debet; quando huc oculis vidi os sacrum, cui sinistrum os ilij connatum erat deficiẽte dextro, ac illud ne ferro quidem cõuelli poterat: vnde firmior redditur sententia, neque ossa iliorum, neque sacrum moueri vllò pacto posse. Quinta, & vltima dorsii portio ex quatuor officulis constructa, ab ossis sacri extremitate veluti cauda quædam pendet: ideo caudam recentiores, siue os caudæ dixere. Græcè autem coccyx nūcupatur, quoniam cuculi avis rostro persimilis apparet. rubescit enim os istud præsertim in iunioribus, & ductu ad interna obliquo in mucronem tendit. Primum coccygis officulum, quod cæteris latius est, ac maius, supernè sinum habet, quò inam postremi sacri ossis partem media cartilagine excipit, atq; in eo vertebrarum inter se compagem imitatur ad aliquem fortè motũ, cùm tempus postulat, edendum. Quocirca verò simile admodum

Tres sinus in extremis lateribus trium ossium superiorum sacri.

Connexio iliorum cum sacro quavis.

Ossa iliorum & sacri neque mouentur, neque moveri possunt.

De coccyge.

Coccyx.

Cauda.

Os caudæ.

Coccyx os cuius ita dictum.

Descript. coccygis.

Coccyx aliquæ quadoque motum edit.

Parturiẽtes cruciantur cū coccyx flectitur.

dum videtur, os istud à sacro laxari, ac versus posteriora flecti, cùm mulieres fœtum emittunt: id quod nō sine aliquo patientium cruciatu cōtingit. Huic primo officulo dātur quatuor processus, duo è lateribus, ac totidem posteriores acuti & superiora spectantes. reliqua verò tria officula rotunda quodammodo sunt, ac sensim in acutum tendunt: vt rostri illius, quod referunt, mucronē constituunt. Hæc inter se adeò arctè compacta sunt, vt vnicum os esse videantur, nonnullis foraminibus peruia: fungosa tamen existunt, qualia sunt ossa pectoris.

Processus quatuor primi ossis coccygis figura trium reliquorum ossium coccygis.

Ossa coccygis sunt fungosa vt ossa pectoris.

De Thorace. CAP. XIX.

A VERTEBRARVM descriptione ad explicandam thoracis naturam aliorum exemplo aggredi decet: quando illæ duodecim, quæ inter ceruicem, ac lumbum locum habent, ad thoracis constitutionem necessariò cōcurrunt. etenim costæ præcipuæ thoracis partes, cū exactiorem illius figuram efficiant, maiorem firmitudinem, ac robur à vertebrais, quàm ab osse pectoris fortiuntur, quibus omnes gemino ferè nexu copulantur. Quamobrem si pectoris os thoracis partem censemus, multò certè magis fatendum est, vertebrais iam commemoratas ad thoracem pertinere. Non immeritò igitur ex vertebrais, costis, ac item ex osse pectoris integra thoracis constructio constat, quod descripturi, de costis, pectorisq; osse tantū agemus. Nam satis, supérque de vertebrais meminimus.

Quæ vertebrae concurrant ad constitutionem thoracis.

Thoraci maior à vertebrais quàm ab osse pectoris inest robur.

Thorax ex quibus constat.

Tractatio de vertebrais prolixa est.

*Cur membrum
princeps in tho-
race.
Pulmonum si-
tus, & usus.*

*Cur thorax mo-
do attollatur
modo compri-
matur.
Occurrit obie-
ctioni.*

*Cur thorax non
est totus osseus.
Cur nulla parte
osseus.
Cur ex costis*

Cæterum in thorace cor princeps membrum contineri nemo est qui nesciat, cui veluti calidissimo, & affiduo penè feruore æstuanti partem aliquam adesse oportuit eius refrigerandi gratia. Propterea in thorace geminos pulmones natura fabrefecit, vt hinc inde affideant ceu cor ipsum medium complexuri: quorum perenni motu, atque agitatione tãquam flabello ventiletur, vt ita dicam, & æstus ille ingens mitescat. cùm verò pulmones per aërem vicissim inspiratum, atque expiratum continenter moueri necesse fuerit: Thorax modò attolli, modò cõprimi debuit, prout respirationis beneficium postulabat. quãquam dixerit aliquis, thoracem cõmodissimè huic necessitati obtemperare potuisse, si musculis tantum, ac pelle abdominis more tegeretur. Verùm enimvero saluti pariter ac rutelæ tam nobilis, & principis membri consulendum fuit. parandumq; etiam, vnde musculi eiusmodi motui famulantes exoriri, aut quo inferi quàm appositissimè possent. Sapientissima ergo rerum cunctarum genitrix natura eam constructionem molita est costis tali figura, atque inarticulatione conflatis, vt leui momento contrahi, ac rursus dilatari possent: nec non etiam per commodam pulmonibus, & cordi sedem struerent. hinc facilè sibi quisque rationes comparare potest, quò satisfaciat sciscitantibus cur Thorax non totus osseus, aut nulla ex parte osseus: vel denique cur ex costis, ita

ita per interualla distinctis fuerit efformatus. Verùm costæ vigintiquatuor numerari solent: quando vtrunque latus duodecim admittit, qui tamen numerus non semper idem reperitur. in aliquibus enim aliquando tredecim, aliquando vndecim costæ insunt: multò tamen rariùs deesse videas, quàm superesse. Abundantem vna tantùm costula mulierem Sanctam nomine à me publico Pisarum Theatro dissectam, ac demum ad sceleti formam compositam apud se detinet familiaris meus Bartholomæus Stratenfis medicinæ Pisis publicè professor, quàm aliquando expositam memini cernentes idiotas penè iureiurando affirmare solitos illam ipsam costam esse, qua fœminæ viros superant: cum tamen idem sit numerus costarum in viris pariter & mulieribus. Quòd si quandoque aut in his, aut in illis vel deficiunt, vel superant: id nimia materiæ copia, vel eiusdem inopia certum est prouenire: quemadmodum cōtingit, cum natura aberrans plures in manu, paucioresve quinque digitis producit. Verùm quod de thoracis vertebris superiùs dictum fuit, idem quoque de costis affirmandum est. Cùm enim singulæ vertebræ geminas costas excipiant, & illæ, si modò variari numerum contingat, rariùs pauciores, quàm plures duodecim existant, ita rariùs imminuitur costarum numerus. quæ quidem varietas, æquè in maribus, ac fœminis apprehendi solet. Quamobrem non

*per interualla
distinctis super-
rioribus patet.
Costæ non sunt
semper 24.*

Costæ 13.

Costæ 11.

*Sancta habebat
viginti quin-
que costas.*

*Sceletus Bar-
tholomæi Stra-
tenfis.*

*Tot costæ sunt
in mulieribus
quot in viris.*

*Cur costæ quā-
doque deficiant
vel superent nu-
merum.*

*Costarum nume-
rus pro portione
responder verte-
bris.*

Aristoteles præcipuus naturæ filius.

Aristotelis in numero costarum error.

Vndecim costas vidit Patauij.

Quando primam Anatomiæ Patauij publice professus est.

Ioannes Antonius Leonicus præceptor.

Sceletum misit ad Ioannem Baptistam Picinardum.

Duodecim ut plurimum sunt costæ in Thorace utrinque.

Quot sint costæ veræ & unde dictæ.

Vniri per Arthrodiam.

Costa spuria cur dicantur.

possum satis mirari Aristotelem alioqui præcipuum naturæ filiū. scribere ausum esse octo costis homines constare, atque apud aliquas nationes septem solummodo costis donatos esse. Vndecim mihi semel tantum dinumerare licuit, cum primū Patauij Anatomicā administrationem publicè profiteri cœpi. Etenim cū Vesalius abesset, ac diutius in germania detineretur, ut opus suum de Humani corporis fabrica imprimendum curaret: me tum Venetiis primario Chirurgo, ac præceptori meo Ioāni Antonio Leonico, graui morbo laborāti, omni officio, ac potius pietate assistentē vniuersa Schola Patauina dignum iudicauit, quem in Vesaliij locum sufficeret, ac non contemnēdo præmio accersuit. In ea igitur dissectione cadauer vnū vndecim costis munitum fortè fortuna obtigit, cuius deinde ossa decocta, & æneis vinculis cōpacta, ad præstantem medicum Ioānem Baptistam Picinardum Cremonam misi. Verum enimvero ad ea, quæ ferè semper talia sunt, respiciētes dicimus duodecim utrinque; costas thoraci constituendo adesse oportere, quarum aliæ veræ sunt, ac legitimæ nominatæ, aliæ verò nothæ, ac spuria. septem superiores veræ ideo dictæ sunt, quoniam verè pectoris ossi media cartilagine per Arthrodiam vniuntur. Quinque verò aliæ sequentes nothæ sunt. quādoquidem cum osse pectoris non coniunguntur: nam suis cartilaginibus ad os pectoris non pertingūt, sed superiorum

superiorum verarum cartilaginibus cōmittuntur, ac eo pacto inter se iunctæ vniuntur, præter duodecimam, quæ omnino ab vndecima, sicq; à cæteris abscedit: neq; tamen proprio adminiculo destituitur. nam cum septo trāsverso colligatur, id quod interdum vndecimæ contingere solet: Costæ cum vertebris etiam duplici (vtri antea diximus) nexu coarticulantur, vt validius ibi inhæreant: tamen si nō omnes duplicem hunc articulum obtinent, quando postremæ duæ, vndecima scilicet ac duodecima vno tantum loco suis vertebris cōmittuntur. Desinunt omnes posteriore parte in processum quēdam capitatum, sed acutum potius, quàm rotundum, quod caput in vertebrarum corpus immittitur, quæ latera sinus quosdam habent, sed diuerso modo celatos: non enim admodum altè excauari sunt illi sinus trium inferiorum costarum inarticulationi subseruientes. Habent præterea nō longè à capite processum alterum: si quidē illæ vbi à capite progrediuntur: nō parum excauantur, eo præcipuè latere, quo protuberare rursus incipiunt, atque alterū hunc processum emittere, qui cum transuersis vertebrarum processibus validis vinculis alligatur. Quæ nihilominus vniendi ratio minimè omnibus est communis. nam vndecima, & duodecima hoc secundo articulo priuantur: id quod etiam in prima costa frequentius obseruatur. & quoniam huiusmodi processus, tam qui ad extre-

Costa duodecima vbi alligatur.

Costa 11. quandoque colligatur cum septo transverso.

Costa quomodo vertebris articuletur & cur.

Vertebra vndecima, & duodecima cū vertebris articulationis qualis.

Processus costarum posteriore parte.

Sinus in lateribus costarum.

Processus alteri.

Costa vndecima & duodecima peculiare.

Processus cum appendicibus.

H

mitates costarum prominent, quàm qui trans-
uerſis proceſſibus vertebrarum inhæret appen-
dicibus ſunt præmuniti. Vbi etiam cartilago
poſita eſt, excipiendæ erunt, quæ vnico articu-
lo committuntur: ſingulos enim appêdices hæ
tantùm habent. Conſtant coſtæ omnes partim

*Coſtarum ſub-
ſtantia.*

oſſea, partim cartilaginea ſubſtantia: nam to-
tus earum ductus à vertebris verſus anteriora
propè os pectoris oſſeus eſt, quà verò cum oſſe
pectoris legitimæ, aut cum aliarum cartilagi-
nibus nothæ coniungi debent: cartilaginem

*Cartilaginis in
coſtarum con-
iunctione uſus.*

multam producant, vt ne dura cum molliori-
bus immediatè cõponantur. Iam verò ſubſtan-
tia illa oſſea non uſquequaque eſt perſimilis,
aut æqualis: ſiquidem coſtarum extrema tene-
ra quodammodo ſunt, ac etiam fungoſa. me-
dia verò ipſarum regio durior eſt, ac intus me-
dulloſa. Porrò ab ea parte, quæ vertebris vici-
nior eſt, glaciiores exiſtunt, ac veluti teretes:

*Coſtarum ex-
trema.*

Media.

*Coſta latiores
pectus verſus.*

quantò autè magis ad pectus adducuntur, tan-
to quoque latiores fiunt. Prætereà pars ſupe-
rior craſſior eſt inferiore: vnde certam prope-
modum notam colligito, qua dexteras à ſiniſtris
ſecernas. hanc verò tenuitatem, ac latitudinem
in omnium ferè animalium coſtis deprehende-
re licet leone excepto. cuius quidem coſtæ

*Quo ſigno di-
ſtinguantur co-
ſta dextra à ſi-
niſtris.*

craſſiores, ac prorſus teretes viſuntur, quæ ni-
hilominus inſignem cavitatem habent, in qua
niſi medulla contineatur, inanem omnino eam
ipſam fore neceſſe eſt: quod eò dictum eſt, vt

*Leonis coſtæ
quales.*

obiter

obiter animaduertant operum naturæ studiosi, quàm verè dicat Aristoteles leonum ossa penitus esse solida, nec medullam intus continere: vt scilicet incredibile horum animalium robur hoc argumento probaret. Equidem dum Florentiæ cum Mazzolario Academia Pisanae moderatore ad visendos leones adducti essemus, quos florentissima illa ciuitas suis claustris, & publico loco, publico etiam sumptualit, idque in signum maiorum suorum, ac perpetui cuiusdam hominis ergò: in eum sermonem deuenimus, an verum id esset, quod Philosophus de hisce animalibus, ac præsertim de ipsorum ossibus tradidit: cùmque ille me dubium, ancipitemque cerneret, quid (inquit) obstat cur id oculis nostris nō exploremus: quādo hic demortuorū leonum sepulchra adsunt? itaque custodiæ præfectum rogauimus: vt per illum liceret ex leonum sepulchris ossa tantisper effodere, dum quod maximè cupiebamus intueremur. ille comiter non modò eruendi sed exportandi etiam quotquot volumus copiam fecit. quamobrem nostro illa arbitratu fregimus, ac medullosa conspicati sumus. quid quòd non modò grandiora ossa amplis cauitatibus prædita; sed minora etiam caua offendimus? Tales ergo leonum sunt costæ, quales antea diximus. cartilagines item in quas costæ ipsæ parte anteriore desinunt: diuersæ sunt. Et enim verarum cartilagines non adeò molles

Ossa leonis non sunt solida contra Aristot.

Mazzolarius præfectus academie Pisanae.

Florentia aluntur leones.

Florentie adsunt sepulchra leonum.

Leonis ossa maiora omnia infregit medullosaque reperit.

*Cur cartilagine
costarum que
cum osse pecto-
ris coniunguntur
sint duriores.*

*Cartilagine co-
starum notharum
quales & cur.*

*Cartilagine co-
starum verarum
in valde senibus
penè ossæ.*

*Cartilagine co-
starum compa-
rantur inter se.*

*Cur costæ ha-
beant tam lon-
gas cartilagine*

*Cartilagine co-
starum ligant
costas osse pe-
ctoris.
Intervallo co-
starum.*

cognoscuntur, quales sunt spuriarum: quod non sine consilio factum intelliges, si prius confideraueris illarum cartilagine duriores fore, quæ cum duriori substantia, nempe cum osse pectoris coniungendæ fuerint: inferiorum verò, quæ nothæ dicuntur, ideò molliores, quoniam cum cartilaginibus copulari debebant: id quod nobis res confirmat: cum in senio affectis corporibus intuemur superiores illas cartilagine, quæ cum pectoris osse cohærent, iam penè totas in ossium naturam abiisse. Ad hæc costarum sextæ, septimæ, octauæ, nonæ cartilagine cæteris sunt longiores: at spuriarum tenuiores, angustiores, & in mucronem tendentes. Postremæ tamen cartilago breuissima est, quemadmodum esse solet primæ, ac legitimæ: quantum in eo differunt, quod acuta illa est, & gracilis, hæc verò lata, & ampla: sicuti etiam ipsa reliquas omnes costas latitudine superat: quæ amplior etiam redditur, quò propius ad os pectoris accedit: fecus autem aliis contingit, nam earum cartilagine initio sunt, quàm in progressu ampliores: costis autem tam longæ cartilagine appositæ fuerunt, ut ex assiduo motu minus læderentur, ac vel dormientibus sursum attolli, itémque deprimi pro pulmonum naturali agitatione possent. Quæ quidem cartilagine cum sint veluti vincula, quibus pectoris ossi costæ alligantur: non immeritò costarum intervallo constituunt, quæ tamen inter se positione,

tione, ac situ variant: nam sex superiorum costarum cartilagines æquis à pectore spatiis dehiscunt, atque eo modo æqualia costarum intervalla efformant. Sextæ autem parte solummodò inferiore, qua septimam respicit, & septimæ, octauæ, ac nonæ varius est ductus, & earum cartilagines sic adhærent, vt continuæ fiât, nec quicquam spatij, quo separentur, relinquât.

Præterea costarum verarum cartilagines in tuberculum, ceu capitulum quoddam terminantur, quo pectoris ossi vbi sinus est committi, atque inarticulari debuerunt. Costarum figura

Quomodo vere costæ articulantur ossi pectoris.

Figura costarum.

semicircularis esse videtur, vt duplici veluti medio, hoc est continuò duodecim vertebrarum ductu, ac pectoris osse circularem formam thoraci suggerant, quæ cum validior est, & constantior, tum ad plura continenda accommodatior. primæ superiores, ac postremæ inferiores, cum breuiores sint mediis, hanc sphæricam thoracis non minimùm adiuuant: in quo illud

Vnde adueniat circularis figura thoraci. Cur thorax sphæricus.

obseruatu dignum est, quòd superiores curuæ magis, postremæ autem lentiores, ac minus gibbæ sunt. Iam verò tam superiores, quàm inferiores arctiores existunt: mediæ verò longiores, ac latiores: primam tamen excipito: quæ vtique omnium latissima est, ac breuissima. verum quia costæ interna sui regione membrana succinguntur, quæ Græcis *πλὺρα* dicitur: non decebat partem illam asperitatem vllam obtinere, quæ membranam hanc sensu non modi-

Costæ superiores sunt magis curuæ.

Mediæ costæ quibus sunt latiores & longiores.

Prima costæ latissima & breuissima est.

πλὺρα succingit costas. Interna pars co-

*Statum cur non
sit aspera.*

*Vena, arteria,
neruus quo sinu
costarum susci-
piatur.*

*Nature indu-
stria.*

*In empimaticis
ubi sit secandū.*

*Cur costæ sint
asperæ extrinse-
cæ ubi verte-
bræ iunguntur.*

co præditam lædere potuisset. Ea igitur parte
leuissimæ sunt, quamuis sinus ibi adsit, qui ad
imam earum regionem secundum longitudi-
nem iacet, ut susciperet venam, arteriam, &
neruum illac vnà repentes. hæc autem interna
cauitas costis omnibus æqualiter haud inest. ea
enim longius protenditur, ac profundior est in
mediis costis: in primis verò, ac extremis par-
uus inest sinus: quoniam admittere debuit va-
sa, quæ minora essent pro costarum paruitate.
quanquam iste sinus non ita conspicuus est in
duabus vltimis costis, atque etiam in prima, cu-
ius locum interdū maior subit costarum tenui-
tas, ut vasis ipsis celsisse quodammodo videat-
ur. Huiusmodi vasorum ductus maximè ani-
maduertendus est propter affectū, quem Græci
ἐμπύημα vocant: in quo si quando per musculo-
rum intercostalium incisionem pus exhaurien-
dum fuerit, sectio administranda est ad super-
nam costæ regionem, non autem sub ima eius
parte, ubi residet vasa ipsa, quæ facilè incidi
possent; nam maximum incommodum conse-
queretur. Cæterum costas extrinsecus parte
posteriore, qua vertebris alligantur, asperas es-
se, ac inæquales necesse fuit, ut inde commo-
dius prodeant ligamenta, quibus vertebrarum
corporibus, ac earundem transuersis processu-
bus alligantur: nec non ibidem tubercula emit-
tunt, quæ vertebrarum sinibus articulationis
gratia vniuntur, ac postquam à vertebrarum
processibus

processibus non procul recedunt, tuberculo alio donantur, qui musculo dorsalium longissimo est destinatus. eadem item costarum sede, qua distant ab iisdem vertebrarum processibus trium propè digitorum intervallo, asperitatem, ac propemodum extuberantiam habent, quod ibi aptius inferi posset musculus thoracem mouentium quintus. Illud addendum ab ea parte, vbi costarum radix est, atque illæ in vertebrarum corpora implantantur, vsque ad transuersorum processuum nexum costas superiora petere, inde verò deorsum flecti, ac tendere, atque ad pectus conuersæ cartilagini appropinquare, rursus sese attollere, & ita ad medium os pectoris, atque ad anteriora ferri. Sed hæc hæc hactenus de costis.

Inserio musculi dorsalii longissimi.

Inserio quinti musculi thoracem mouentis.

Qua parte costæ superiora petant, qua deorsum ferantur, cum qua rursus attollantur.

De Osse Pectoris. CAP. XX.

PECTORIS os, quod Græcis σέπρον, & σῆδος nuncupatur, quanquam σῆδος ea regio potius intelligitur, quam ipsum os vnà cum costarum cartilaginibus circumscribit, quam partem propriè pectus appellamus: in humanis latum est, ac breue, ex paucioribusque os constructum, quàm Galenus sensit: quando ille putauit tot in eo ossa esse oportere, quot essent legitimæ costæ, vt singulis esset, cui adhærescerent. Septem igitur illa sanxit: cum tamè plurimum sint quatuor, minimū verò tria: quod in simiis, & canibus falsum non est, in quibus verum & illud est, quod Aristoteles ait: cor mediam om-

σέπρον, id est, pectus.

σῆδος regio pectoris.

Figura pectoris in homine.

Gal. error de numero ossium pectoris.

Ossa pectoris plurimū quatuor, minimū tria.

Gal. sententia de ossibus pectoris verificatur in simiis & canibus.

Aristotelis opinio cor esse in

*medio pectoris
vera est de ca-
nibus & simiis.
Substantia os-
suum pectoris
qualis.*

*Ossa pectoris u-
niuntur per sym-
physim.*

*Ossa pectoris mo-
uentur ad mo-
tum costarum.*

*Sinus cedens a-
spera arteria.*

*Quibus sinibus
costarum iugu-
lorum capita
excipiuntur.*

*Cur asperum sit
superne os pe-
ctoris.*

*Sinus excipien-
tes cartilagine
costarum.*

*Cur cartilag. co-
starum in super-
ficie protube-
rent.*

*Figura cartila-
ginis qua est in
imo pectore.*

*Nomina cartila-
ginis imi pecto-
ris.*

nino pectoris regionem tenere, quasi rectam in medio positionem habeat. Sed de hoc infrà, ubi de corde agemus. Pectoris ossiū substantia minimè solida est, qualis est reliquorū, verūm molli, & fungosa: attamen ipsa ossa inuicem cartilaginis ope uniuntur per symphysim, cum nulum ne obscurum quidem motum edant: licet costarum elatione, & depressionem sequantur. huius pars superior cū cæteris amplior est, tum etiam crassior: ubi parte interna, quæ in medio residet, sinus exculpius est, ut cederet asperæ Arteriæ illac descendenti: eiusdem partis superioris latera sinibus pariter duobus abūdere oportuit, extrinsecus tamen celatis, quibus exciperent iugulorum capita, quæ cum iis articulantur. Pectoris os intus, extrâq; laue deprehenditur, præterquā supernè, ubi asperitas quædam existit, unde nascitur, detineturq; musculus longus, & validus tēdens ab huius ossis summitate ad mammillarem processum, in quem utrinque implantatur. habet præterea alios sinus ab utraque parte descendentes, quos subeunt costarum cartilagine modicè quidē illæ in superficie protuberantes, sicuti suprà dixim⁹. quod iccirco factum est, ut aptius, ac tenacius inhærerent. Ad imam eius partem extat cartilago quædam longa, & triangularis, nonnunquam bifida, aliquando etiam leuiter mucronata, quæ ideo plura obtinuit nomina, nā Græci Xiphoides dicta est, à Latinis autem clypealis, gladi-

diſſilis, enſiformis, & mucronata nominatur. A-
lij malum granatum appellant, propterea for-
taſſe quod vnius balauſtij formam referre vide-
tur. Hanc nonnulli credidere pro ventriculi o-
ris munimento ſtare, & illud ab extrinſecis tue-
ri, cum tamen os ventriculi ab ea regione mul-
tum diſtet; quod ad dorſum vergit, ac iuxta il-
lud prorſus ſitum eſt. Cum ergo mucronata hec
cartilago uſum hunc præſtare nequeat, dicerem
ſubditorum propugnaculum eſſe, ac præcipue
ſepti tranſuerſi, quod eo loco maximè nerveum
eſt, ſiue tendinoſum: cuius partis læſio ad cor
ipſum ibi pene ſubſtratum penetrare poſſeſt:
namque humani cordis inuolucrum, quod pe-
ricardion Græci vocant, diaphragmati adnexum
eſt. pectoris offis figura gladij, vel pugionis ima-
ginem retinet: iccirco non deſuere, ſicuti Ga-
lenus libro de Oſſibus teſtatur eſt, qui totum id
os gladiale nuncupauerint.

*Cur malum gra-
natum appelle-
tur cartilago
imi pectoris.*

*Cur Xiphoides
non poſſeſt tueri
os ventriculi.*

*Os ventriculi ſi-
tum eſt iuxta
dorſum.*

*Verus uſus Xi-
phoidis.*

*Læſio ſepti trās-
uerſi poſſeſt pe-
netrare ad cor.*

*περικαρδιον,
id eſt, inuolucro
cordis.*

*Pericardion eſt
annexum cum
ſepro trāsuerſo.
Gal. lib. 4. de oſſi-
bus.*

De ſcapulis. CAP. XXI.

ANTE QVAM ad ſcapularum enarrationē
aggrederemur, dicendum nobis eſſet de
cordis officulo. Cæterum quando in humanis
id minimè reperitur, nihil huius intereſſe nego-
tij arbitrati ſumus. cuius tamen ſi quis nimium
curioſus fuerit, illud in grādiolibus animalibus
quærere poterit, nempe bobus, equis, elephan-
tis, ac fortasſe etiam in ceruis ſenioribus, & ſi
quidam negant, atque, illud quod pro ceruini
cordis offe venale circumfertur, bubulum di-

*In corde homi-
nis non eſt os.*

*E numero ani-
malium in quorū
corde eſt os.*

*Os de corde bo-
vis pro ceruina
venditur.*

Gal. error.

*Cor simiarum
caret osse.*

*Simia quid ha-
beat in corde
loco ossiculi &
ubi.*

*ὁμοπλάται,
id est, scapulae.*

*Numerus scapu-
larum.*

*Situs.
Vsus.*

Forma.

*Cur cōcava in-
tro.*

Spina scap.

*Scapulae articu-
lantur cū ingu-
lis & humero.*

*Nexus scapula-
rum cum aliis
partibus.*

*Scapularum ne-
cessitas.*

cant. mirari profectò licet Gal. v 111. de Admini-
strat. Sectio. libr. & v 1. de Part. Vtilitatibus,
ac demum in fine libelli de ossibus mentionem
huius ossis fecisse, cùm nec in simiis quidem,
quas crebriùs secare solitus fuerat, os istud cer-
nas: cuius loco membranas duas prope cartila-
gineas offendes, quæ inter arteriæ magnæ, &
venæ arterialis radices instar firmamenti iacēt.
sed de his alibi. Cordis itaque osse dimisso, ad
scapularum explicationem deveniamus. Sca-
pulæ quas ὁμοπλάται Græci vocāt, geminæ sunt,
altera dextram, sinistram altera parte obsidet,
ambæque posteriùs in superiore regione sum-
mis costis adherent propugnaculi vicem geren-
tes, non secus ac si tergum aliquod hinc inde
porrigatur ad extraneos ictus propulsandos.
Proptereà scapulæ scutatam formam obtinue-
re: ac roboris maioris gratia interna parte, qua
costas respiciunt, concavæ sunt, externa verò
prominent, & spinam quandam veluti iugum
producūt, quod eminet, inque superiorem par-
tem assurgit ad earum validitatem augendam.
cum iugulis, atque humero aliorum ossium mo-
re articulantur: verùm ad thoracis, cervicisque
vertebras, ad os hyoïdes, ad occiput, ac tandem
ad costas musculorum, de quibus postea dice-
mus, interuentu adnectuntur. Ex quibus omni-
bus colligitur necessaria scapularum constru-
ctio, quæ non modò posteriorem partem mu-
niret, sed musculorum etiam tum ortum, tum
infer-

infectionem fusciperet, ac denique quod caput est, brachij articulationem exciperet, quæ apprimè infirma, imbecillisque futura erat, nisi scapularum nexum, compositionemque habuisset.

Brachij articulus absque scapulis infirmus esset.

Scapulæ triangularem figuram præ se ferunt, *Scap. figura.*

non tamen æquilateram: pars enim supera longè breuior est duabus hinc inde ad inferiora tendentibus, quæ pariter in angulum obtusum desinunt: ita quod ima hæc portio tantum spatij occupat, ut ego magis eam pro basi accipiendam

Quid sit basis in scapulis.

putem, quàm latus illud, quod ad spinam vergit. tribus processibus donatæ sunt, quorum vnus breuissimus est in caput latum, sinuatúmque desinens, excipiendo summo humero paratus. Propterea cum hic sinus longè minor sit, ac depressior, quàm altum, & rotundum humeri caput requirat: operæpretium fuit, ne humerus quocunque leui momento exiliret, huiusmodi sinum adaugeri. Neque enim magis scapulæ substantia poterat excauari. Ergo cartilago crassior ad internam sinus labiorum partem obducta, atque exporrecta magnam, & idoneam profunditatem constituit. Id verò sinuatum scapulæ caput sua ceruice non caruit, quamuis ea modica, & brevis appareat. Ab hoc processu non longè alter est corui in rostri, aut anchoræ persimilis, quem ideo ancyroides, aut coracoides appellant, per quem brachium à costis diducitur, ac distat. hic os humeri in sua sede continet, atque ad eius partis validitatem confert. in hunc tan-

Processus scapularum.

Quomodo natura angeat sinus scapulæ excipiendo humero dicatum.

caput sua ceruice non caruit, quamuis ea modica, & brevis appareat. Ab hoc processu non longè alter est corui in rostri, aut anchoræ persimilis, quem ideo ancyroides, aut coracoides appellant, per quem brachium à costis diducitur, ac distat. hic os humeri in sua sede continet, atque ad eius partis validitatem confert. in hunc tan-

Cervix capitis scapula.

Processus ancyroides sinus et vsus.

Processus acromion cur dicatur.

Hippocrates quid vocet Acromion.

Clavicula iungitur cum acromio.

Claviculis ceteris non habent acromion.

Opinio Galeni de osse inter acromion & iugula.

κατακλῆδα quid vocet Gal. Hippocr. lib. de Artic. Galeni excusatur.

Galenum inexcusabile reddit.

Ufus Acromij.

Scapularum inaequalitas in tenuitate & crassitie.

dem inferitur musculus, qui ad anteriora scapulam trahit, & qui cubitum flectit. Tertius processus ille est, quem iugi, seu spinæ speciem referre diximus: longior, ac prominentior: quocirca dictum fuit à Græcis ἀκρόμιον quasi humeri apex, & summitas. Atque ita ab Hippocrate superior hæc articuli sedes perpetuò nuncupatur. cùm hoc processu clavicula coniungi debuit: quamobrem illo ferè omnia animalia carere videas, quæ claviculis priuantur. Inter acromion & claviculam Galenus voluit quoddam os dari, idque in solis hominibus addens acromion à nonnullis & κατακλῆδα vocari, quod mihi adhuc non est compertum, nisi si quis Galenum Hippocratis auctoritate tueatur, qui lib. de Articulis idem sensisse videtur. quem tamen fortasse non ineptè dixerimus per tertium illud os appendicem quandam intellexisse, quæ ad Acromij extremitatem affidet, & in iunioribus facile deprehenditur. Quod & si detur, nescirem tamen cur Galenus asserere potuerit solos homines eo ipso osse abundare: cùm nihilominus in simiis reperiatur. Cæterùm, acromion scapulam validiorem reddit, & locum claviculæ constituit, cui commodè annectatur, nec minus etiam tutam, atque aptam musculis inferendis sedem parat. Scapulæ non vndique sunt æquales, nam toto eo ductu, qui ab ancyroïde processu versus spinam flectitur, ac descendit ac basim vsque tenuissimæ sunt, ac multo etiam in

medic

medio tenuiores . At in ipsis processibus, atque eo latere , quo brachium respiciunt : insignem crassitudinem ostendunt : vbi eorum substantia medullosa, fungosâque conspicitur . Neque etiam defunt foramina venarum, arteriarumque ingressui destinata , quæ ipsis scapulis nutrimẽtum deferant . Interna scapularum regio sinus transuersim obliquè tendentes habet, longo temporis progressu ad crebrum costarum motum, quibus adhærent, celatos . Extra tamen si gibbæ sunt, ac protuberant, non minimos tamen sinus obtinuerũt, quatenus mûsculos excipiunt, quâquam iis ipsis cedere illos omnino oportuit . Vbi animaduertendum est prudentissimę naturæ artificium . Etenim ne propter istos sinus scapula nimium tenues fieret : cernere est ab altera parte os succreuisse ad augendas , firmandasq; partes huiusmodi sinibus è regione subiectas . Iam verò in scapulis appendices quinque sunt . Appendices verò discernuntur . Tres enim ad latus internum iuxta spinæ deductũ, atq; ad basim adhærescũt, vnde mûsculorum quorundam origo trahitur . reliquæ duæ ligamenta suggerunt , quibus vincitur humerus accetabulo, clauicula acromio, nimirum acromion harum duarum appendicum alteram sibi vendicat, alteram acceptabulum . Præterea in summitate, nempe inter acromion, & supremam scapulæ partem concauitas non minima reperitur , facta vt mûsculus commodè cunctos circumactionis humeri motus

Scapula vbi fungosa & medullosa.

Foramina venarum & arteriarum. Interni sinus scapulae.

Naturæ artificium in sinibus externis scapularum.

Appendices quinque scapularum.

Appendicum scapulæ usus.

Cauitatis inter acromion & supremam scapulæ partem.

Foraminis orbicularis usus.

efficiat. In ea item regione foramen ferè orbiculare vasis cessurum reperitur.

De Claviculis. CAP. XXII.

Cur tractandū erat de iugulis post os pectoris.

κλειδες, id est claviculae.

Clavicula habent superiori pectori.

Alios sequitur in ordine tract. de claviculis.

Iugulorum de-script.

Cur dista claviculae.

Usus.

DIGNVM profectò nobis videbatur, vt ab eo capite, in quo de osse pectoris egimus, statim illa ossa explicaremus, quæ à Græcis κλειδες, à nostris autem claviculae, siue iugula dicuntur: propterea quòd illæ ad superiorem pectoris partem adhærent, & cum primo eius osse vtrinque coarticulantur: scapulæ verò nullum peculiare munus habet cum pectore, neque nisi mediantibus claviculis eidem vniuntur: verum quando id parum refert: neque rei naturam hic ordo tractationis immutat: ab aliorum instituto minimè recessimus. Scapularum itaq; præmissimus descriptionem, quam nunc iugulorum enarratio sequetur. A supremo pectoris osse singula hinc inde ossa discedunt flexuosa, & rotunda, quæ transuersim delata sensim supra summum humeri caput ad scapulæ processum ascēdunt, quem acromion vocari diximus. Hæc ossa clavicularum nomen obtinere: quoniam humerum cum scapula coarticulatum ita claudūt, vt ne ad thoracem, pectusue brachium delabi possit, atque adeò dehiscat, distetque: vt ad pectus manus admoueri, suasque innumeras propemodū actiones edere valeat. quod quàm vtile, atq; necessarium sit, vnicuiq; constare potest, si vel ab humano pectore claviculas demerit, vel bruta claviculis priuata accurate fuerit con-

con-

cōtemplatus. quo factū est, vt vulgares furculas
appellent ad egregium hoc ipsarum munus al-
ludentes, cū veluti fulcra quādam ab osse pe-

*Cur furcula di-
cantur clausi-
cula.*

ctoris deducendo, sustinendōque humero pa-
rata sint alterum eisdem iugulorum nomē La-
tinis inditum est: quia fortasse iugi, quod boum
collis alligatur, similitudinem referāt. Vnde iu-

*Iugula cur di-
cantur.*

gulari animal tunc dici solet, cū venæ, atque
arteriæ diffecantur, quæ sub his iugulis positæ
sunt. Claicularum substantia intus fistulosa,
fungosāque tenui crusta ossea obtegitur. ma-

Iugulari.

*Substantia cla-
icularum qua-
lis.*

ximè reliquorum ossium frangibilis est, earum
figura non multum differt à nostro / ita deli-

Claic. figura.

neato, bis enim clauiculæ curuantur, bis gibbæ,
bis etiam sime fiunt. nam ab eo ductu, qui à pe-
ctoris osse incipit, ad mediam vsque regionem
intrinsecus cauæ sunt, extrinsecus verò conue-
xæ tuberis in morem. At à media regione ad A-
cromion opposito se habent modo, vbi latiores
apparent, & capite sunt depressiore, quo cum
acromij summitate coniunguntur. Verum alte-
rum caput rotundum quodammodo existit, &
magis ea parte, quæ sterni sinu excipitur. ad v-
trunque caput appendices assident suis obdu-
ctæ cartilaginibus: adnotarēque oportebit alte-
ram superaddi cartilaginem illi capiti tantum,
quod in summo pectoris osse residet: quāquam
vterque articulus ad Arthrodiam sit referēdus.
Cū autem ex clauiculis muscoli partim exo-
riantur, partim ad eas terminētur: iccirco non-

*Claic. appen-
dices.*

*Articuli clauic-
ularum refe-
runtur ad Ar-
throdiam.*

nulla in eisdem tubercula, nonnullas lineas, atque asperitates cernimus inferiore præsertim parte, qua costas respiciunt, atque hæc omnia musculorum gratia. Quod vero parte anteriore

*Cur antè, quàm
retro promine-
ant magis clauicula.*

potius, quàm posteriore extrorsum promineat: summo consilio factum intelliges, si diligentius inspexeris ea regione subiecta esse non minimi momenti vasa: nempe arteriam insignem, ac venas cum axillarem, tum etiam cephalicam, quas comitatur nerui quinque ad manum progressuri, quibus omnibus incuruata clauiculæ pars nõ inconcinnè cedere, ac simul propugna-

*Clauicula tue-
tur arteriam,
venam axillare
cephalicam, &
quinque neruos*

culi vicem præbere videtur, clauiculæ suis foraminibus non caruere: vt illac penetrarét vascula nutrimentum transmittentia.

De Humero. C A P. XXIII.

*Manus quid sit
Hippoc.*

MA N V M Hippocrates totum id appellat, quod à scapula ad extremitatem vsque digitorum porrigitur: quod ex pluribus ossibus constat. primum inter scapulam, & cubitum re-

*Humeri situs.
Cubitus constat
ex vlna & ra-
dio.*

Brachiale.

Postbrachiale.

Summi digiti.

fidet, humerum omnes vocat: deinde cubitum constituentia vlna & radius, his succedit pars illa, quam proprie manum dicimus, quæ brachialis, postbrachialis ossibus, ac summis digitis constituitur. Verùm à summo humero ad extre-

*Brachium quid
vocetur.*

mam vsque manum totus ille ossium ductus humeri scilicet radij, atque vlnæ brachium nuncupatur. His hoc modo distinctis ad singulas partes explicandas accedamus. Ergo humerus illud os erit, quod à parte superiore cum scapula, inferiore

feriore cum radio, vlnaq; coniungitur. vnicum
 est, teres, longum, ac manus ossium maximum,
 non tamen omnium, femore excepto, maximū,
 vti Galenus scripsit: quandoquidem neque ma-
 gnitudine sacrum, neque latitudine iliorum of-
 sa, neque longitudine tibiam superet, à qua cæ-
 teris quoque dimensionibus facile vincitur: &
 quamuis teretem figuram ostendat, tamen fini-
 bus non est expers, quasdam planities, ac sum-
 mitates in longum producit, & inæqualis est
 ob musculorum nexum, vt alij inde ortum du-
 cant, alibi ibidē implantentur. Pars superior in
 caput magnum, rotundūque desinit, cui do-
 nata est appendix non exigua ex ea parte maxi-
 mē cartilaginea crusta oblita, quæ in scapulæ a-
 ceptabulum inferitur. quoniam verò caput id
 altum necessariò profundum sinum postulabat,
 quod in scapula fieri minimē poterat: ideo cir-
 ca scapulæ sinum natura addidit alteram carti-
 laginem, atque eminentem, quæ sinum ipsum
 maiorem efficit, & articulationem hanc in om-
 nem ferè motum proniorem reddit. supra id ca-
 put rotundum duo processus eminent, qui ob-
 longo, insignique sinu dirimuntur: ex his ante-
 rior posteriore minor est. amborū maxima por-
 tio in appendice continetur. illa verò inter ipsos
 interiecta cauitas musculo cedit, qui à scapula
 duplici principio fluens hanc iter habet deorsum
 ad cubitum flectendum delatus. inferior hume-
 ri pars capite haud rotundo sua appendice do-

*Humeri de-
script.*

Teres longior.

Galeni error.

*Sacrum os est
humero maius.*

*Ossa iliorū sunt
latiora humero.*

*Tibia est longior
humero.*

Sinus.

*Cur humerus
est inæqualis.*

*Humeri appen-
dix.*

*Cartilago angēs
sinum scapulæ
excipientem ca-
put humeri.*

Processus.

*In appendice
processus hu-
meri.*

*Caput inferius
humeri habet
appendicem.*

- Gale. & Vesalij error.* natur, quicquid sentiat tum Gal. tum etiã Vesalius, qui opinatus est hanc humeri partẽ appendice omnino priuatã esse: at mihi semper cõspicua fuit in natu minoribus. Cãterũ pars hæc inferior ampla est, ac in tria veluti capita exurgit, iisq; in æqualibus, ac distinctis, quæ ideo trochlearum formam effingunt, quod à lateribus eminent duobus sinibus leniter cõcauis apposita: tertio, quod est in medio, eosdem sinus diuidẽte: in quorum sinuum alterum incumbit vlna, & circa eundem flectitur, extenditũq; cubitus. qui motus vt commodiũs fieri possit: pars huius humeri capitis posterior ampliter excavata fuit: vt superior vlnæ processus ibi confidẽret: vt absoluta fieri posset cubiti extensio: sicuti cũ flectimus, ne quicquam impedimento esse possit. sinus quoque paratus in anteriore, atque interna eiusdem capitis sede, quo pertingit secundus vlnæ processus, dum cubitus ita contrahitur, vt extrema manus ferẽ humerum contingat. externo humeri capiti assidet sinus, qui positus est in superficie radij, cui inheret multa obductus cartilagine. at eius caput, cũ sit depressum, & expansas oras habeat: interna ora sinum alterum obsignat, circa quem & ipse agitur, ac demum vlnæ validitati confert: quando illi ita annectitur, vt sinum quendam subeat in interna secundi eius processus regione. At propria radij cum humero articulatio maximẽ spectat, vt manum obliquẽ ad latera deducere valeamus.
- Inferioris humeri descriptio.*
- Trochlearum forma.*
- Vlna & cubitus quomodo articulentur humero.*
- Vbi sit excavatum caput inferioris humeri & cur.*
- Extensio cubiti.*
- Flexio.*
- Sinus utilitas.*
- In magna cubiti contractione quo pertingat secundus vlnæ processus.*
- Alius sinus.*
- Vfus propriæ articulationis radij cũ humero.*

mus. cùm verò vnà cum brachio extenditur, aut flectitur: talis vtrique motus ab vna prouenit sequente radio. hanc humeri cum cubito coniunctionem nō bene Aristoteles nouisse videtur: quādo existimauit articulum illum, quo cubitus cum humero connectitur: contrā se habere in quadrupedibus, atque in humanis habere. Siquidem affirmauit homines antrorsum, quadrupeda retrorsum cubitum flectere. At nō rectè animaduertit, quem situm hæ partes in brutis teneant. non enim cubiti, atque humeri illa est articulatio, quam ipse putat: sed cubiti, ac brachialis compositio, de qua sequenti capite dicemus. Latet autem in brutis ipse humerus; quem si rectè consideres: non aliud tum articulationis, tum motus genus in brutis reperiēs, quàm in hominibus: aut statuendum erit eiusmodi animalia humero destituta esse: quod omnino falsum est. Hæc tria humeri capita sua cartilagine crustæ ritu munita sunt, quorū protuberantius est internum, ac externum maius quodammodo cernitur. præter hæc extant duo processus ad vtrunque latus, quorum internus longè maior est. His hærent principia musculorum tendentium ad extremam manum. quod autem humeri os tota sui longitudine modò gibbum, modò simum conspiciatur: talem formæ varietatem varius musculorum vsus postulat, sicut clariùs ostēdemus: vbi musculos manuum mouentes explicabimus. os idem intus ca-

Qui motus ab vna proficiscitur.

Aristotelis error.

Cubiti flexio diuersa in homine & brutis Aristor.

Cubiti & brachialis compositio est quā Aristoteles esse cubiti & humeri. Humerus in brutis latet.

Trium humeri capitum in interiore hum. descriptio.

Processus duo & eorum vsus.

Cur humerus in longitudine sua modò sit gibbus modò sinus.

*Humeri cavita-
res in medulla.
Foramina per
quæ venæ.*

*Cubitus quid
significet.*

*Structura cu-
biti qualis.*

*Cubitus habet
appendices. u-
trinque.*

*Superior appen-
dix cubiti brevis
fit ossea.*

*Gale. & Vesaliij
error.*

*Appendix infe-
rior cubiti &
radij diu durat*

*Ulna dicitur et-
iam cubitus.
Radius.*

*Ulna & radius
committuntur
inter se. & cum
aliis.*

*Ulna inferius cõ-
mittitur radio.
Superior ulna
qualis.*

*Galenij error in
processibus ul-
næ.*

Sigmoidis usus.

uum est, ac medulla referrum, quam pariunt ve-
næ per foramina in eo sita subeuntes.

De Cubito. CAPVT XXIIII.

CUBITI nomine totam illam partem intel-
ligimus, quæ inter humerum & brachia-
le ex duobus ossibus constituta est longis il-
lis quidem, sed humero minoribus. appendici-
bus vtrinque donantur: verùm parte superiore,
qua cum humero articulantur, appendices bre-
ui coalescunt, atque in ossium portiones trans-
mutantur. Tam hîc, quàm in ima humeri parte
Vesalius Galenum sequutus perperam putauit
appendicem non adnasci. parte autem inferiore
diutissimè in ambobus appendices seruan-
tur. horum os alterũ, quod est inferius: vlnam,
quod etiam cubiti nomine sæpenumero dona-
tur: alterum, quod superius existit, radius ap-
pellamus. hæc cùm inter se, tum maximè hu-
mero, ac brachiali iunguntur: quanquam vlna
parte inferiore radio tantum committitur, sicuti
mox dicemus. Superior ergo pars vlnę crassior
in duos processus oblōgos triangulares, sed ob-
tuso potius, quàm acuto angulo, tãetsi Galenus
acutos eos accipiens coronas appellauit, termi-
natur. Hi processus ita prominent, atq; attollũ-
tur: quoniam sectum est id spatij, quod in me-
dio residet, ac in semicirculi speciem excauatũ,
qui sinus protuberantibus hîsce processibus cõ-
clusus C Latinum refert, quod nō absimile est,
C Græco. Propterea Galenus Sigmoides nuncu-
pauit.

pauit. Factus autem fuit iste sinus, vt aptissimè
 processus ipsi sinum imi humeri complecti, &
 circa illum verti possint. Quamobrem cernere
 est in medio Sigmoidis lineam prominentem, *Linea in medio
Sigmoidis vsus.*
 quæ funiculi modo, vt in trochleis contingit,
 rimam insistit, ne huc illucue vlna dilabatur,
 vnde mutuus exoritur vtriufque partis ossium
 ingressus: ita quòd huiusmodi articulatio Gin-
 glymo iure tribui potest. ad priorè processum,
 qui posteriore minor, interna parte, quà radium
 respicit sinum offendimus, in quem incumbit
 radij caput: verùm cùm ab his processibus re-
 cesseris, ulna fit accliuus, ac sensim attenuatur:

*Humerus & ul-
na articulantur
Ginglymo.*

*Sinus excipiens
caput radij.*

vsque dum in caput desinat, quod ad internam
 partem magis aliquantulò propendet: vbi le-
 uem radij sinum subiens cum eodem articula-
 tur. Quòd autem Galenus senserit eiusmodi ca-
 put cum brachiali coniungi: id ego nullo vn-
 quam modo assequi potui. cùm videam nullam
 brachialis portionem ad infimum vlnæ caput
 adhærescere. Prætereà cùm ex hoc ipso capite
 extrinsecus producaturs processulus quidam re-
 nuis, oblongus, & acutus, quem ideo styloïdè
 Anatomici vocarunt. Hunc Galenus iudicauit
 in externum brachialis os infigi, atque ea ratio-
 ne conferre ad manum in obliquum agendam.

*Quomodo vlna
cum radio par-
te superiore ar-
ticuletur.*

Quod à veritate alienū esse omnino experimē-
 to cōprobaturs. Hic enim processus tantum ab-
 est, vt hūc vsū præstet, vt impedimento sit, ne
 manus ad eum modū moueri queat: sicuti opti-

Galenus error.

*Styloides proces-
sus non agit ma-
num in obli-
quum.*

Vesalius laudatur in explicatione usus styloidis.

Dictum Galen. in simia verificatum.

Cartilaginis crassæ, & mobilis utilitas.

Processus ulnæ utilitas.

Ulna exterioris qualis.

Sinus ex quibus musculi. De Radio.

ῥαχίς, id est, radius.

Radius situs.

Capitis superioris & inferioris in radio comparatio.

Caput superius cubiti articuletur cum humero, inferius cum brachiali.

Radius agit manum in pronum & supinum obliquè.

mè Vesalius probavit, ubi cubiti historiam recēset. neque non hic processus à quarto brachialis osse multum distat, licet Gal. octauum innuere videatur, quod in simia veritatē habet: at in homine tertium quoque brachialis os respicit. Interfideret tamen quædam crassa, mobilisque cartilago, quæ cum spatium id repleat, quod interpositum est, ulnā cum brachiali cōiungi innuere videtur, cum tamen minimè cōiungatur. Verum hic processus nō nihil roboris ipsi brachiali addit, ne prorsus in eam partem decidat: quando tantum ab ipso ulnæ capite dehiscit. Iam verò ulna parte exteriori levis est, & admodum teres, parte verò qua radio respondet, in tenuem asperamque lineam secundū suū ipsius longitudinem extenditur, & humiles quosdam sinus habet. ex quibus locis nascuntur musculi pollicis famulantes, necnon musculus ille, cuius beneficio indicem à pollice abducimus. Alterum sequitur os superius, quod Græcis *ῥαχίς* dicitur, nos radium vocamus, exteriorem ferè totam cubiti partem occupat, in capita crassiora desinit, sed superius minus est, ac rotundius inferius: inferius autem & maius est, & latius. quod non temerè factum intelligitur, si perpendatur, quomodo superius cum humero, inferius cum brachiali articuletur. Nam cum humerus ibi desinat in caput quodammodo rotundum: depressius, ac sinu præditū radij caput exegit, qui quoniam in pronum, atq; supinum obliquè manum

ageret

agere debuit: rotundum sui capitis sinum rotundo humeri capiti inhærere oportuit, quo circumagi commodè munusq; id obire possit. cui rei non parum deferuit sinus ille, quem diximus insculptum esse ad internam vlnæ prioris processus regionem, cui affidet interna radij capitis portio. Nec minùs fit, vt per hanc geminam articulationē leui momento cùm sequatur, tum etiam adiuuet cubiti flexionem, & extēSIONem.

Sinus ad internam regionem prioris processus vlnæ usus.

Id caput copiosa obductum est cartilagine ad motionis agilitatem augēdam. In cervicem descendit teretem, oblongamque, ad cuius extremitatem, quā vergit in vlnam, tuberculū emit, quo terminatur musculus primus flectendi cubiti auctor: necnō etiam recipit alterius portionem eodem munere fungentis, qui ferè totus in superiorem vlnæ partem implatur. Cæterum inferior pars radij (vt diximus) capite est maiore, depresso, ac lato, appendicis ope nō minimum aucto, quod vel in grandioribus conspicuum est: in superficie non modò deprimatur, sed etiam in amplum, ac geminum sinum excauatur, in quo insident, atque inarticulatur duo suprema brachialis ossa: quibus quoniam reliqua brachialis ossa arctissimo ceu vinculo vniuntur, meritò dicere possumus totū brachiale eiusynius articulationis opera cū ipso radio copulari: vnde manum ipsam modò sursum, modò deorsum inuertere licet, eamque itidem ad latera ducere. cū verò in pronum, ac supi-

Cartilaginis multa circa radium usus. Cervix. Tuberculum.

Appendix capitis inferioris radij vel in grandioribus videtur.

Sinus excipiens duo summa ossa brachialis.

Quomodo manum sursum & deorsum inuertamus.

Quomodo manum in primum ac superius oblique vertamus.

Quomodo radius adiuvatur flexione & extensione cubiti.

Ab ulna est precipuus motus cubiti.

Quomodo radius ferat operam ulnae in ducenda manu.

Radius supra suscipitur ab ulna, infra etiam suscipit.

Compositio ulnae & radii sub arthrodia.

Inferius caput radii cur planum, & in declivie cedat anteriorius.

Cur plures sint sinus in posteriore parte inferioris capitis radii.

Processus mammillaris in radio usus.

Radius extra qualis.

Linea in radio comparat linea in cubito.

Linea in radio, & cubito usus.

num oblique manum flectimus: id radij merito consequitur, quando is solus quiescente ulna movetur. At quemadmodum radius cubiti flexioni suppetias laturus ab ulnae sinu, cuius precipuus est cubiti motus, supernè suscipiebatur: ita etiam quasi mutuam ulnae operam requirens in ducenda manu, dum cubiti motum sequitur, eius inferioris capitis insertioni sinum ipsa quoque paravit. Quamobrem supra suscipitur ab ulna, infra verò ulnam suscipit, quā tamen compositionis speciem sub Arthrodia ponendam existimo. inferius radij caput parte anteriore planum penè redditum est, atq; in declivie tendit, ut ita sublatum esset, liberumque aditum preberet musculorum tendinibus, qui secundū, ac tertium digitorum articulum flectendi partes sibi vendicant: eodē modo posterior pars tendinibus cedit, musculorum ad exteriores articulos tensionis gratia trāscuntibus, propterea plures in ea sinus conspiciuntur. exterior eiusdem capitis portio pollicem spectans maxillarū, quēdam processum promit non aliam ob causam, quā ut ea parte brachialis luxationem difficillimam redderet. Ad hanc radius extra non secus atque ulna teres est. ac leuigatus: intus autem acuta acie, quae longo ductu extenditur ē regione alterius lineae, quam eidem persimilem in interna ulnae parte descripsimus. Ex harum linearum alterutra fluit membrana quādam in alteram lineam inferenda, qua ambo haec ossa, quae

quæ laxiùs à se inuicem dehiscunt, colliguntur, confirmanturque. quæ membrana simul etiam *Membrana.* interstitium quoddam exhibet, quo interiores cubiti muscoli ab exterioribus separantur. ambo hæc ossa cubitum constituentia caua intus *Ossa cubiti curuata.* sunt, ac medullosa, vt & leuiora sint, ac debito pabulo minus frustrentur.

De Brachiali.

CAP. XXV.

SUMMA manum alibi tres in partes diuisimus in brachiale, postbrachiale, ac digitos: *Summa manus diuisio.* qui & ipsi suis articulis constant. A prima igitur parte exordientes dicimus brachiale, quod Græci *κάρπος* appellant, totam eã ossium struem *κάρπος, id est brachiale quid. Brachialis ossis.* intelligi, quæ inter cubitum, & postbrachiale sita est, quæ octo ossibus constat: & ea duplici ordine iuncta duas veluti acies cõstituunt, quarum utraq; quatuor ossa capit. Prima ossium acies parte superiore radij capiti ita committitur, vt primum, secundumque ossiculum in sinum ipsius capitis inferatur: tertium autem paulum inhærere videtur: sed quartum nulli alteri ossi iungitur, præterquam tertio, cui soli pertinaciter annectitur. Secunda item acies parte posteriore cum postbrachiali articulatur, priore autem cum cæteris brachialis ossibus, quæ inter se cartilagineis ligamentis ita connectuntur, vt connata esse videantur. quæ ligamenta cū nō nulli detrahare minimè studuissent, hæc officula nō inuicem iuncta, sed cõnata prorsus credere. ossa hæc adeò varia sunt, vt nulla ex parte

Prima acies brachialis ex quatuor ossibus.

Secunda acies ossium brachialis.

Ligamenti cartilaginei in ossibus brachialis usus.

Cur aliqui crediderunt ossa brachialis esse connata.

Ossa brachialis non conveniunt inter se figura. conveniant, ac singula quæq; variam formam præ se ferant, vt, quanquam nõ faciliè inuenias quibus illa rebus rectè compares, non ideo tamen difficilè sit discernere, & quæ, qualiâque sint, diiudicare. cùm verò propriis nominibus singula careant, solo numero, atque ordine dignoscuntur: eâq; ratione perdiscitur, quomodo inuicem, ac etiam cum aliis ossibus componentur. Is ergo erit ordo istorum ossium. Primum brachialis os illud est, quod in priore acie constitutum ab interno latere versus pollicem nobis occurrit. Secundum, quod illi statim succedit. Tertium, quod cum secundo cohæret ad externum latus versus minimum digitum, aut cubitum vergēs. Quartum, quod omnium minimum vni tertio annectitur. Quintum, quod in posteriore acie iuxta pollicem primo affidet. Sextum præterea, septimum, atque octauum ita numerantur, vt ordine consequuntur. Iam verò non solum numero, ac figura, sed etiam magnitudinè differunt. Maxima omniũ sunt primum, ac septimum, quorum vtrum maius sit, vix discernere queas. His minus est secundum, quod tamen cæteris maius est: deinde sequitur octauum. Postea quintum, cui succedunt sextum, ac tertium, quartum minimum est omniũ, vti paulò antè diximus. Quod autem ad ipsorum vnionem attinet, sciendum est primum os, præterquam quòd cum radio articuletur (superius enim cum in rotundum protuberet, in illius capitis

Primum os brachialis.

Secundum os.

Tertium os.

Quartum os.

Quintum os brachialis.

Sextum os, septimum, & octauum.

Comparatur in magnitudine ossa brachialis inter se.

De vnione ossium brachialis.
Primum.

capitis sinum subintrat) inde sensim adhærere secundo, eiusque sinum subit, deinde cauo admodum sinu septimi tuber rotundum admittere, ac inferiore parte quinto, sextoq; cohærere. Cæterum secundum & ipsum supernè radij *Secundum.* sinum ingreditur, parte anteriore cum primo: inferiore autem, quâ cauum est, cū septimo, posteriore cum tertio connectitur, ac ita tertium *Tertium.* secundo iungitur. ac præterea inferiore latere octauum attingit, posteriore sed interno versus vnam quartum. quod quidem quartum alteri *Quartum.* ossi non committitur. Quintum superiore par- *Quintum.* te primo, posteriore sexto, ac prominenti secundi postbrachialis (vt interim quinque eius ossa constituamus) processui adhæret. At inferior eiusdem portio primum postbrachialis os, quod Galenus primum articulum pollicis facit, *Galen.* excipit. Sextum primo, quinto, ac septimo, quâ *Sextum.* illa respicit, nititur: inferiore autem tubere in angularem postbrachialis ossium sinum inseritur, ac subinde vergit ad tertium eiusdem postbrachialis, cuius primam, & lōgiùs productam portionem sustinet. Septimū omnium ceu me- *Septimum.* dium primum, secundum, sextum, atque octauum, terminos habet, eisdemque non pari ratione committitur, cum aliis simis, aliis gibbis lateribus existat. Verūm latere inferiore cū tertij, rum quarti, postbrachialis ossium portionem fulcit. Demum octauum, quod est altissimum: *Octauum.* reliquis lateribus secūdo, tertio, ac septimo co-

Epilogus.

*Brachialis ossa
obscurè mouen-
tur.*

*Brachiale mo-
uet manum ad
latera in prouū
& supinum re-
cta.*

*Articuli bra-
chialis cum ra-
dio secum, &
cū postbrachia-
li quales.
Totius brachia-
lis descriptio &
usus.*

*Ligamentum ex
processu octauī
ossis.*

*Brachiale exte-
rius quale &
cur tale.*

pulatur. at inferiore parte basim præstat quar-
to, & quinto postbrachialis ossibus, quibuscum
idem coarticulatur. Atque hi sunt veluti qui-
dam termini, quibus brachialis ossa discernun-
tur, ac etiam cum inter se, tum verò cum aliis
vniuntur. Brachialis ossa motu non carent, ta-
meti nullus iis adest musculus peculiaris eorū
motus auctor: & ob id obscurus censeretur, ac
sensus nostros omnino lateret. Totius verò bra-
chialis motus in agendo extremā manum, tum
ad latera, tum in prouū, atque supinum rectā
consumitur. Huic edendo motui præstò sunt
musculi, de quibus loco agetur suo. Quāobrem
dicimus Brachialis ossa cū radio per Diarthro-
sim secū inuicem, per Synarthrosim cum post-
brachialis ossib⁹, partim per Synarthrosim, par-
tim verò per Diarthrosim esse coniuncta. Cæte-
rūm brachiale parte interiore latum, ac profun-
dum sinum habet, quo excipit non paruos mu-
sculorum tendines in digitorum articulos infe-
rendos: ibique claudit, ac ne defluant quodā-
modo continet validum ligamentum, quod ex
processu longo octauī ossis producit, ac in la-
tiusculam quinti ossis portionem è regione illi
positam inseritur. Hic autem processus intror-
sum pendet, vt ad hoc veluti munus paratum
se se ostendat. At exterior brachialis pars tendi-
nibus quidem substrata est ad digitos extrinse-
cus adeuntibus, nihilominus gibba est, neque
cauitatem vllam insignem præ se fert, quando
illi

illi ipsi tendines cùm longè minores interioribus existant, minus quoque spatij occupare debuerūt, ac præterea decuit externam regionem in circularem formam diduci, internam verò in planum redigi. Veruntamen ab extrinseca brachialis regione prodeunt quatuor ligamenta, quæ dictos tendines vinciunt, ac in sua sede continent: de quibus alibi dicemus. Scire licet hæc officula, quamuis exigua sint, ac dura: non tamen solida prorsus existere. cauernulas enim intus habent medulla oppletas, inter quæ durissimum, ac penè solidum est, quod quarto loco numeratum fuit. cui addendum existimo, quod Gal. asseruit, nimirum officulum id sinu quodam esse præditum, in quem immitteretur processus ille styloides ab vlnæ capite productus: de quo superiore capite mentionem fecimus. Sed hoc in humanis locum minimè habet, in quibus neque officulum id vllò sinu donatur, quod propè sphæricum est, neque styloides ad illud pertingit. Vtrunque tamen in simia perbellè obseruatur.

De Postbrachiali.

CAP. XXVI.

PARTEM, quæ cum Brachiali sequitur, & ad digitos terminatur: nos cum cæteris Anatomicis postbrachiale dicemus, quam Græci μετακάρπιον vocant, quāquam nonnullis hac voce libuit manum vniuersam brachiali excepto intelligere. Postbrachiale autem ex Gal. ac Vesalij sententia quatuor ossibus constituitur. qui-

Quatuor ligamentorum à brachiali parte extrinseca vsus.

Ossa brachialis non sunt solida.

In simia verificatur quod Gal. dicit de sinu quarti officuli.

μετακάρπιον id est, postbrachiale quid.

Metacarpium quid aliquibus significet.

Postbrachialis ossa sunt quatuor Galen. & Vesal.

Primus articulus pollicis potest numerari cum ossibus postbrachialis.

Tractat de primo pollicis articulo hoc cap.

Primus articulus pollicis innigitur quinto ossi brachialis per arthrodiam sub diarthrosi.

Quomodo referri ad Arthrodiam sub Enarthrosi possit horum ossium articulationis.

Secundum os postbrachialis.

Tertium os postbrachialis.

Quartum os postbrachialis.

bus tamen si quis adnumeret primum pollicis articulum, non incongruum fuerit: quando & illud os statim brachiali succedit, ac non minus eidem committitur, quàm faciant reliqua postbrachialis ossa, licet laxior sit huius, quàm ipsorum articulatio. ex qua item euidentior motus editur. Verùm quicquid est, siue quinque ossa hæc, siue quatuor numerentur, nobis placet in horum explicatione tractare quoque de prima pollicis articulatione, ut ostēdamus illum cum quinto brachialis osse per diarthroseos speciem, quæ arthrodia dicitur, coarticulari: quanquam pro ratione ipsorum ossium, quæ parua sunt, huiusmodi articulatio ad enarthrosim referri posset. Nam quintum brachialis os ea parte sinum satis insignem habet, atque in angulum excauatū: in quem caput articuli quoquomodo oblongum, & versus anteriora protensum immittitur. Secundum postbrachialis os, quod Gal. primum est, in angularē sinum altum terminatur parte quidem superiore, qua excipit protuberantem sexti officuli brachialis partem: atque interim latus coniungit quinti ossis lateri, cui eo modo adhærescere videtur. Tertium in sinum definit, ac parte interna: quæ ad pollicem spectat, in processum veluti oblongum protenditur: cuius superficies affidet sexto brachialis ossi. quod reliquum est eius sinuati capitis, cum septimo coniungitur. At quartum capite est quadrato, quod duobus insidet ossibus.

nam

nam cùm septimi, tum etiam octaui partem occupat : quæ iunctæ planam sedem quodammodo huic plano capiti efformant : licet intrinsicus id aliquantulum decliue fiat. Vltimum si-

Vltimum os postbrachialis.

militer caput quadratum habet: paulum tamen ad exteriora tendit, atque ad extremam vltimi

brachialis ossis portionem adhærescit: atq; ad hunc modum postbrachialis ossa cum brachia-

Postbrachiale supra cum ossibus brachialis infra cum articulis digitorum iungitur.

lis ossibus componuntur. Verùm infrà cum digitorum articulis vno, ac eodem modo articu-

lantur. In caput enim rotundum omnia desinunt, quo leuiter excauatam subsequentiū articulorum superficiē laxa articulatione subeūt.

Ossa hæc quatuor primo pollicis excepto à capite priore intus, extrâque attenuantur ad me-

Descriptio quatuor ossium postbrachialis pollicis excepto.

diam vsque regionem: inde verò crassiora fiūt, ac interna præsentī regione angularem lineam

Linea angularis vsus.

constituunt, quæ per medium secundum longitudinem ipsorum ducitur, quæ facta est pro

musculorum ibi existentium ratione, quibus musculis parare etiam oportuit commodam sedem,

ne vola nimia mole ad comprehendendum minus idonea redderetur. Idcirco ossa

Cur ossa postbrachialis sint attenuata hinc inde interna parte.

hæc hinc inde attenuata sunt, & ita intervalla nō modica musculis occupāda præbuere: quorum musculorum enarrationem suo loco trademus.

Ad hæc postbrachialis ossa intus sima sunt, extrâ verò gibba, infrà supràque appendicibus

Figura ossium postbrachialis.

munijuntur: ex quibus ligamenta fluunt, quorum gratia ossa hæc inter se vtrinque neciūtur.

Appendicium ossium postbrachialis vsus.

Intus quoque cauitatem nō paruam, & medulla refertam habent.

De Digitis. CAP. XXVII.

SUPEREST vt de digitis iam dicamus: vt tandem absoluta ossium manus fabrica tradatur. Digitorum ossa quindecim illi numerabant, qui primum pollicis articulum à postbrachiali disiungūt singulis digitis terna internodia tribuentes: qui verò eundem inter postbrachialis ossa recēsent, sicuti nos fecimus, duobus tantum articulis pollicem donāt, atq; quatuordecim solummodo statuunt digitorū ossa: vt interim ungues missi fiant, quos in tractatum de cartilaginibus coniiciemus: atque etiam sesamina ossicula, quibus postremum caput dedicauimus. Ossa igitur digitos constituentia substantia dura sunt: vt innumeris functionibus, quibus manus parata esse debuit, prompta & absq; noxa vteretur. Non prorsus tamen solida sunt, quemadmodum Galeno placuit: cum non minus insignem cauitatem habeant, quàm diximus inesse in postbrachialis ossibus: quacumque simiarum quoque digitorum ossa minime destituuntur, & quam in leonibus ipsis adnotauimus. Galenus verò solam ipsorum paruitatem considerans solida esse certò putauit: neque articulum aliquem fregit, vt periculum faceret, an internus sinus adesset, in quo medulla seruaretur. Ex his alia sunt longiora, alia breuiora: quædam crassiora, quædam etiā tenuiora

Ossa digitorum quibus quindecim sint, & quibus quatuordecim.

De ungibus tractabitur libro de cartilaginibus.

De sesaminis hoc lib. cap. ultimo.

Digitorum substantia qualis, & cur talis.

Ossa digitorum non sunt solida contra Gal.

Ossa digitorum in simis & leonibus cauitatem habent.

Quid Gal. de paruitate in substantia ossium iudicada.

Differentia ossium digitorum.

nuiora conspiciuntur, pro digitorum, articulo-
rumque ratione : nam digitis crassioribus cras-
siora quoque ossa meritò obtigerunt, atq; etiam
quò lōgiores iidem, aut breuiores sunt, eò bre-
uioribus, longioribúsue ossibus donātur. Simi-
liter articuli primi maiores sunt secundis, secū-
di verò tertiis, tertij autem omniū minimi sunt.
Præterea ossa hæc duplici forma sunt prædita:
in quarum altera articuli omnes conueniunt,
alteram verò, & multum priori dissimilem, sibi
tamen communem articuli vltimi obtinēt. Er-
enim horū ossa cæteris sunt depressiora. Cūmq;
initio latiuscula sint, quò magis progrediuntur,
eò magis attenuantur, angustioraq; fiunt. do-
nec ceruicem superposito capitulo, in quod de-
sinunt, præparent. id autem capitulum longū,
ac rotundum vnà existit, verū primus pollicis
articulus, itémq; primus, & secundus aliorum
digitorum, initium ac finem crassius habent,
quasi duobus extremis capitibus cōstent, quo-
rum superius maius est inferiore. at in toto de-
ductu, qui à priore ad alterum fit caput, semper
tenuiora redduntur. Iam verò ossa exterius cur-
ua sunt, ac teretia, sed interna regione plana, &
quodammodo sima : neque id temerè factum,
siquidem interna veluti cauitate opus erat, cui
superstrati esse debuerunt tendines non exigui,
ac rotundi, qui & magnitudine, & rotundita-
te sua ciusmodi planitiem implēt, atque eo mo-
do teretem digitorum formam faciunt. alioqui

*Forma ossium
digitorum.*

*Ossa digitorum
desinunt in ca-
pitulum.*

*Cur ossa digito-
rum interna re-
gione sint pla-
na.*

*Cur digiti sint
teretes & pla-
ni interna re-
gione.*

K

nimia moles indidem extuberasset, illósque minus idoneos ad apprehendum reddidisset: præterquam quòd nò æquè commodè suis sedibus, tendines, eò porrecti adhæsisserent, sed in hanc, atque illam partem potiùs declinassent. siquidem gibba fuisset interna hæc digitorum regio. Secus autem in externa contingit: nã illuc membranæ ritu tendines subtilissimi producuntur. propterea curua, & teres esse debuit, vt digitorum quam præ se ferunt venustati consulere-tur. Interna item regione notabis lineas quas-dam vtrinque per longitudinem ductas, vnde ligamenta ortum habent, quæ iam commemo-ratos tendines complectuntur, vt firmiùs in sua sede maneât. Et hæc quo ad ossium digitorum figuram. Porro sic illa articulantur, vt alia sus-cipiant tantum. alia tum suscipiant, tum susci-piantur: vt obiter colligamus veram non esse Galeni sententiam, cùm voluit prioris ossis ca-put in subsequenti sinum semper inseri. Nam prima digitorum ossa supernè per enarthrosim cum postbrachiali iunguntur. etenim ipsorum capita sinuata sunt, & cartilagine incrustata, quibus rotunda postbrachialis ossium capita suc-cedunt. quo articulationis genere facilè præsta-tur, vt digiti in omnes partes moueri possint: necnon etiam circularem motum edere, quan-quam Vesalius minimè concedit. at leui opera quilibet experiri potest, si digitum circulari li-neâ circini more obducatur. Inferiore parte duo
paruula

*Cur ossa digito-
rum extra sint
curua & tere-
ria.*

*Ortus ligamen-
torum ex lineis
quæ sunt in in-
terna regione.*

*De articulatio-
ne digitorum.*

Gal. error.

*Ossa digitorum
iunguntur cum
postbrachiali
per Enarthro-
sim.*

*Articulationis
digitorum ratio.*

*Vesaliij error
confutatur.*

paruula capita vtrinq; prominēt angulari quodam sinu illa dirimente. Hunc sinum media sequentis ossis capitis portio protuberans subit: capita verò in illius sinus vtrique exculptos inferuntur. Quò fit, vt hæc internodia & suscipiantur, & suscipiant, cùm priora duntaxat susciperent. Illum ideo articulum ad enarthrosim retulimus, hunc verò ad ginglymum, quod articulationis genus in aliis pariter internodiis obseruabis, quæ omnia cartilagine sua infarciuntur. vt quouis momento prompta, & lubrica magis in edendo motu articulatio reddatur. Ad hæc digitorum ossa suis vtrique appendicibus munita sunt, exceptis vltimis, quorum pars inferior cùm articulatione non egeat, neq; eguit appendice: cuius tamen superficiem ungues ipsi obtegunt. horum ossium, simul etiam digitorum vsus, præterea cur ex tot, tamque variis articulis constructi fuerint: neque ex pluribus, paucioribusue, aut alius modi constare potuerint, longum esset recensere. quæ tamen si quis nosse velit, Galenum legat primo & secundo de Part. vsu, ad amussim hæc multa cum admiratione tractantem. Illud verò obiter scias eiusmodi ossa talem inter se structuræ portionem adepta esse: vt licet, alia breuiora, alia sint longiora: ad rectam tamen lineam, & æqualem digiti omnes perducuntur: cùm ad aliquod sphericum apprehendendum mutuam operam conferunt.

Quæ internodia per enarthrosim, & quæ per ginglymon articulantur.

Cur internodia sint cartilagine obducta.

Quæ ossa digitorum appendicem habeat, & quæ nō & cur.

Ungues quid faciant.

Gal. primò & secundo de Vsu Part. docet exacte constructionem & usum digitorum. Gal. laus.

Digitus licet inæquales coeunt tamen cum aliquod sphericum est apprehendendum.

De Ilium Osse.

CAP. XXVIII.

Idem os in pueris & iuuenibus triplex videtur, in aliis unum.

Os ilium quid vocetur.

Os pubis quid vocetur.

Os coxendicis quid vocetur. Vfus ilij, pubis, & coxendicis.

Basis ossium.

Tria ossa quæ cum sacro committuntur non moventur, sed alia circa ipsa.

OS illud, quod transuersis sacri ossis processibus committitur, etsi vnicum in adultis esse videatur, cum id nulla linea interfecer: perinde tamen censetur, ac si triplici ex osse constaret. Constare autem cernitur in pueris, & iuuenibus triplici linea cartilagine oppleta illa tunc distinguente. ea propter tres in partes diuidi solet, triaque diuersa nomina sortiri. nam suprema eius pars omnium latissima, quæ cum sacro coniungitur, ilium os ab omnibus appellatur: anterior, quæ & ipsa lata, minus tamen quam superior, ac vtrinque foramen amplum habet, pubis os vocatur. quæ verò media, & angustior quidem, sed crassior, & extrinsecus in magnū, ac profundum sinum excisa, coxendicis os dicitur. Duo autem sunt huiusmodi ossa, singula scilicet vtrinque: quæ quanquam sacro apposita sunt, dorsi tamen scapulæ vsui proportionem videntur respondere. Hæc enim femur non aliter, atque illæ humerum, excipiunt, nec non etiam variam musculorum originem, insertionemque. Verum sacro iuncta vniuersæ ossium compagi per necessariam illam basim suggerunt, de qua capite de sacro osse loquuti sumus. nā cum hæc perpetuò maneant, ac nullo vnquam motu sint prædita, circa ipsa reliqua omnia moveri iure optimo debuere. id quod faciliè attestari possumus, cum videamus superiorum partium, ac inferiorū motus sigillatim percurrentes omnes,

nes tãdem in hæc ossa veluti ad centrum quod-
dam terminari. Enimuero ilium ossa ita ipsi sa-
cro committuntur, atque adeò pertinaciter in-
hærent, vt connata prorsus esse videantur. &
nos adhuc ostendere sacri ossis compagem pos-
sumus, quam domi data opera diligenter in stu-
diosorum gratiam asseruamus: cui sinistrum i-
lium os vsque adeò connatum est, vt nulla ra-
tione diuelli possit. eadem quoq; inter se parte
antere vniantur, ac peluis imaginem elegã-
tissimè conformant, quæ vtero, vesicæ, ac inte-
stinis tutius continendis à natura parata est. At-
que hos potissimùm vsus ilium ossa præstant, a-
liis interim omisis, quos opportunius alibi re-
censebimus. Horum ossium figura varia est, si-
quidem parte posteriore lata sunt, duobusq; la-
tis sinibus insignita, in quos tamen curuari po-
tius, quàm excindi videntur: quando videre est
partes ab altero latere hisce sinibus oppositas
protuberare, ac gibbas fieri, vbi multæ asperita-
tes visuntur, extrinsecus præsertim musculorum
nexibus percõmodè seruientes Huius partis su-
prema regio semicirculari linea obducitur; quæ
secundum totam sui circûferentiam appendice
munitur; cuius sedes quoniam aliquantũ extra
prominet, ideo spina dicta fuit. ab hac præcipuè
ligamèta fluunt, & eorũ musculorum exortus,
qui nates constituunt, deorsumque in femur, ac
tibia, & etiã sursum ad thoracem, ac dorsum
feruntur. Quatenus autem cũ osse sacro copu-

*Ilium ita sacro
hæret, vt con-
natũ videatur.*

*Ossa ilium pel-
ui similia.
Iliorum vsus.*

Iliorum figura.

*Asperitatus
in Iliis vsus.*

*Superioris par-
tis illius descri-
ptio.*

*Spina in Iliis
quid & eius
vsus.*

Natura industria in communione iliorum cum sacro.

Cartilago glutinis modo.

Cur ad symphysim potius quàm ad Ginglymon redigenda sit compositio ilij cum sacro.

Coxendicis descriptio.

Cur crassissimum.

Vsus coxendicis acetabula.

Cartilago vestiens acetabulum.

Articulatio femoris cum coxendice proportionem respondet articulo humeri cum scapula.

natura mutuum ipsorum congressum excogitavit, ut is validior, ac pertinacior foret. Quamobrem transversus sacri processus sinibus partim amplius, ac profundis, partim etiam leuibus excisi sunt, inter quos extuberant partes. Similiter ilium ossa & sinus, & tubera præ se ferunt. Horum ergo sinus sacri tubera excipiunt: eminentes autem partes illius pariter sinus ingrediuntur, quam unionem intercedens levis cartilago glutinis modo continet quæ quanquam eodem fiat modo, quo solet, cum ossa ginglymo articulantur: cum tamen nullus ex ea motus proficiscatur, symphysi magis subiiciemus. & hæc est partis superioris descriptio. Quæ autem ab ea versus anteriora discedit, mediumque ossis spatium occupat, cui nomen os coxendicis inditum est, crassissima facta fuit, ut commodè sinus ille amplius, ac profundus fingeretur, in quem immittitur longum, ac rotundum femoris caput: ideo sinus iste acetabulum nuncupatur, qui tamen cum non adeò profundus esse potuerit, ut plenè femoris caput contineret: cartilaginem eo modo adiicere oportuit, quo adhibita est, ubi humerus cum scapula coniungendus fuit. sinus iste non solum partem coxendicis, verum & ilij, & pubis occupat. Nam præter eam cartilaginem, quæ crustæ ritu circumdatur tam femoris capiti, quàm acetabulo: exurgit ex labris ipsius sinus crassa quædam, & circularis cartilago, quæ acetabuli capacitatem auget, atque

ita

ira complectitur altum femoris caput, vt ne de
 sua sede egredi, luxariue tam facile possit. at-
 que vt huiusmodi capitis insertio firmitus in co-
 dem acetabulo resideat, è medio eius incrusta-
 tæ appendicis teres, ac validum ligamentum
 nascitur, quod in medio sinu figitur, sicque ar-
 ticationem hanc alioqui laxam maximopere
 colligat, continetque. Pars inferior, quæ ilium,
 coxendicisque os interfidet, ingenti sinu dona-
 tur, qui ad vtrunque latus patens, & peruius, ac
 infernè abruptus dehiscit: atque hic vtriusque
 ossis communis esse videtur, quem ideo para-
 tum animaduertimus, quòd illac pateat aditus
 pluribus, nec exiguis neruorum furculis à spi-
 nali medulla per sacri ossis foramina profuen-
 tibus: qui non inde procul in vnũ coeunt ner-
 uum omnium nostri corporis neruorum maxi-
 mum, qui per penitissimos femoris musculos
 delatus ad crus disseminatur, sicut alibi osten-
 demus. Ab hoc sinu cùm recesseris versus an-
 teriora, exurgit processus quidam acutus: vnde
 ligamentum: prodit in sacrum os inferendum,
 paratum vt claudat anum, atque neruum illum
 maximum, de quo paulò antè diximus. Præ-
 ter hunc processum iuxta coxendicis basim al-
 ter adest sinus, latus quidem, sed humilior,
 ac rimis quibusdam intersectus, cui inhærent
 tendines quatuor in suo ipsorum musculo, ran-
 quam in crumena recòditi: qui tandè in vnum
 coeunt in femur inferendũ. Inferior coxendicis

*Acetabuli de-
scriptio.*

*Cartilago circu-
laris augens a-
cetabulum &
cur.*

*Ligamenti in
acetabulo situs
& usus.*

*Sinus inter iliũ
& coxendicem.*

Sinus usus.

*Nervi maximi
ortus & iter.*

*Processus acu-
tus.*

*Sinus iuxta ba-
sim coxendicis
usus.*

*Tendines qua-
tuor contenti in
suo musculo,
tanquam in
crumena.*

Cur crassissima sit pars inferior coxendicis. portio crassissima est, quā basim propterea paulò antè nuncupauimus. Hæc uia ex omnibus coxendicis oſis partibus appendice donatur, unde tres muscoli tibiam flectentes enascuntur.

Cur basis coxendicis habeat appendicem. Superest nunc, ut anteriorem partem, quæ os pubis nominatur, absoluamus. Ergo pubis oſa supra, infraque tenuiora sunt cæteris. quò autem magis ad medium accedunt, eò magis attenuantur, usque dum in amplissimum foramen desinunt. supernè iunguntur: ac dextrum cum sinistro multæ cartilaginis interuentu coalescit. quem nexum adeò tenacem, ac solidum offendimus, ut difficillimum sit cultro, aut scapello abscindere. Propterea risu magis, quàm reprehensione dignam illorum sententiam iudicamus, qui proferre in vulgus non verentur, ossa hæc in partu laxari, atque dehisce- re, ut faciliùs exeat fœtus. Nulla enim ratione dimoueri possunt: tantùm abest ut laxiter aperiantur. verùm autem id est de coccygis ossè, sicuti supra suo loco dictum fuit. Illud enim certum est retrahi, ac eo modo parientibus non parum auxiliari: neq; de hac re ambigere quiscumque debet, quando utrunque facili experimè- to comprobare licet, si tactus adhibeatur. Por- rò scitu dignum est, ossa hæc in maribus nò ita ampliter produci, ut in mulieribus, in quibus latius hæc parent, & capaciora multò sunt, & quam diximus peluis similitudinem tenere.

Quomodo os dextrum pubis cum sinistro iungatur. Animaduertendùmque est hinc faciliè discerni posse

Ossa pubis in partu dehisce- re, ridiculum est dictu.

Os coccygis in partu retrahi- tur.

In osse pubis dif- ferunt mares a fœminis.

Quomodo di- stinguantur os- sa pubis fœmi- ne a maribus.

posse foeminarum ossa à virorum ossibus. Horum enim suprâ, infrâque strictiora, angustioraque sunt, illarum verò ampliora: vt faciliùs credatur ossa pubis minimè dilatarî, quando si aperiri possent, frustrâ ipsa natura differentiam hac constituisset, vt latiùs hæc, quàm illa parent. Cæterùm ab ea, quæ fit per cartilaginem coniunctione, quò magis deorsum tendunt, eò etiam magis, ac magis disiunguntur: vt vacuum ibi sedem subsistentibus testibus, ac peni relinquunt. Ex superiore parte, qua ossa pubis coniunguntur, quaque aspera sunt, ac gemino tuberculo abundant: exoriuntur tum recti abdominis musculi, tum etiam illi, qui ad femur, tibiâque deferuntur. Necnon illuc inferuntur abdominis musculi obliquè descendentes, inferiore verò, quæ munitur appendice, producuntur musculi penem sustinètes, cuius corpus statim sub ipsa ossium vnione affigitur. At foramē illud, quod in medio est amplissimum: leuitatis potiùs, quàm alius rationis gratia factum implent duo musculi internus, atque externus, qui deorsum tendunt, & in femur implantantur, eius circumagendi munere fungètes: inter quos media est membrana non levis, & foramen identidem obturans, & alterum musculum ab altero distinguens. Per huiusmodi foramen Anatomici imperiti putant seminaria vasa ad testes descendere: sed falluntur, quando illa musculum abdominis perforant, ac super hæc ossa ferunt.

Ossa pubis non dilatarî.

Cur ossa pubis deorsum disiunguntur.

Qui musculi ex superiore parte pubis oriuntur.

Pubis inferior pars appendicem habet.

Situs & origo musculorum sinuentium penem,

Foramē in medio ossium pubis cur factum. Membrana inter musculos circum agentes femur.

Error anatomicorum de vasa foraminis pubis.

*Ter vasorum
seminariorum.*

*Sinus vasorum
seminarium non
est in ossibus pu-
bris mulierum.*

*Substantia os-
sium quæ com-
mutatur cum
sacro qualis.*

*Foramina pro
nutrimentis de-
latione.*

tur, ubi sinus quidam obliquè declinis adest, per quem demittuntur simul tam deferentia, quàm præparantia vasa. qui sinus in mulieribus non reperitur: & hac potissimum differètia ossa mulierum à virorum distinguuntur. Atq; ad hunc modum se habent ossa, quæ cum sacro committuntur, quorum substantia non multum ab ipso sacro diuersa est. fungosa enim plurimum sunt, nec nimis dura, foraminibus crebris referta, per quæ nutrimentum allatura vasa perducuntur.

De Femore. CAP. XXIX.

*Homo & Si-
mia habet os fe-
moris maius a-
liis ossibus.*

*Femur est bre-
uius tibia in a-
liis animalibus
ab homine &*

Simia.

*Femur in ani-
malibus iuxta
clunes.*

*In animalibus
quod vulgo fe-
mor creditur
est tibia.*

*Aristotelis er-
ror, qui ponit
humerum loco
cubiti.*

*Aristotelis er-
ror existimari
aves carere fe-
more.*

*In avibus ubi
sit femur.*

*Cur in omnibus
fere quadrupe-
dibus femur est
breuius tibia.*

FEMORIS os tum humanum, tum etiam simiarum reliqua ossa omnia magnitudine superat. Cætera verò animantia femur ipsum brevius multò quàm tibia habent, in qua fortasse nonnulli decepti sunt, existimantes in brutis femur illud esse, quod extra primum articulum constituit, neque considerant id ipsum in animalibus iuxta clunes latitare. Ea verò pars quæ primò sese exerit, non femoris est os, sed tibia. In quo item errore versatus est Aristoteles, qui non contentus cubiti loco humerum ponere, sicuti suprà etiam capite de Humero diximus, propriam & femoris, & tibiae sedem ignorasse, palàm fassus est: quando asserere non dubitavit, aves femore destitutas esse, quod omnino falsum est. siquidem illæ femur habent, verum id delitescit, quemadmodum in omnibus ferè quadrupedibus, in quibus brevius esse oportuit, cum longius situs, in quo residet, minime

nimè patiatur. secus autem in simia, hominèq;
 contingit. Propterea os tibiæ & his duobus fe-
 moris, & cæteris ossibus longè maius existit, il-
 lud suprà cum osse coxendicis, ilij, pubis: infra
 verò cum tibia articulatur, cuius figura longa
 est, & teres, at non vsquequaque recta. nam me-
 dia propè regione curuatur, anteriore quidem
 gibbum, posteriore autem, ac exteriorè simum,
 supernè in caput crassum, rotundum, & cartila-
 gine incrustatum desinit, longiorem cervicem
 obtinens, quæ sursum altè protenditur ad inte-
 riora plurimum incumbens. Caput autem huic
 prapositum cervici ab orbiculari appendice fe-
 rè totum efformatur, & coxendicis acetabulum
 subit. quæ articulatio validissima esse debuit,
 propter immensum pondus, quod femori susti-
 nendum fuit. Iccirco natura non modò altio-
 rem insertionem effinxit, & cum profundo a-
 cetabulo cartilaginem composuit, ut ipsum ad-
 auctum, altiùsque redditum femoris caput faci-
 liùs susciperet: verumetiam teretem, ac robu-
 stam copulam parauit, quæ è sinu quodam non
 leui in medio penè capitis vertice, magis tamen
 versus interiora produxit: atque id in aceta-
 buli fundum immittendum curauit vinculi, ac
 firmamenti validioris gratia. Quæ cum ita ha-
 beant, eos refellere meritò possumus, qui huius
 articuli luxationem minus integram putantes,
 notham illam, mentitâmq; vocarunt: cum per-
 fecta, verâque sit, in qua sæpenumerò accidere

*Cur homo &
 Simia habeant
 femur maius
 tibia.*

*Femur cū qui-
 bus articuletur.
 Femoris figura.*

Cervix.

Caput.

*Cur articulus fe-
 moris cum co-
 xendice sit va-
 lidissimus.*

*Cartilago vestit
 profundum ace-
 tabuli coxendi-
 cis.*

*Ligamentum fe-
 moris cum ace-
 tabulo quale.*

*Luxatio articu-
 li femoris cum
 acetabulo tegri-
 tima est contra
 quosdam.*

Cur difficile restituarur luxatio articuli femoris.

Processus femoris in nuper natis videntur appendices.

Processuum femoris descriptio.

Γλαττοῦ quid. τροχαντήρες quid. Processuum femoris utilitas.


Processus femoris quomodo iungantur. Vnde femur teres.

Quid efficiat cap. interiora femoris.

solet, vt ligamentum illud laxius, & prolixius fiat, vnde restitutio difficilis admodum redditur. Ab ipsa ceruice statim os istud in portionem quandam latiusculam descendit, ex qua processus duo veluti nodi educuntur, qui in nuper natis appendicum naturam tenent, cum facile diuellatur. Temporis autem progressu ita cohærent, & cum partibus vnde prominent, confunduntur: vt ne signum quidem appendicum ostendant. Itaque femoris processus numerantur, qui ad posteriora magis vergunt: alter tamen altero superior est. Superior extrorsum spectat, & maior existit: inferior verò longè minor est, ac in interna sede potius. maiorem γλονῶν Græci dixerunt: ambos verò τροχαντήρας, quasi rotatores dixeris, cum videlicet rotando femori facti esse videantur. Etenim eorum musculorum inseriionem admittunt, quorum opera femur tum extrorsum flectitur, tum circumagitur. quanquam præterea octauo musculo tibiæ flectenti originem suppeditent. Parte posteriore linea quædam eminens ab externo ad internum ducta hos ipsos processus simul iungit: hinc femoris os teretem formam sumit. Cumque mediam regionem transierit, crassum magis efficitur, quò magis descendit: necnon etiam dilatatur, atque introrsum magis deprimatur, ac tandem in duo magna capita exit: aspera illa quidem extrinsecus, at in superficie leuia, leui quodammodo crusta peruncta, quæ magnæ appendi-

appendicis interuentu constituuntur. Non par-
 uus (inquit Galenus) sed ingens quidā, ac pro-
 fundus sinus, & asper, capita ista, parte postero-
 re nōn exiguo interuallo disiungit. parte item
 anteriore sinum leuiter depressum communem
 habent, cui innititur os quoddam orbiculare,
 quod Molam nominant, de quo suo loco dice-
 tur. Hæc capita à se prorsus inuicem differunt:
 nam interius crassius est, exterius autem latius,
 ac depressum magis, idque vt ne ambo cum ti-
 bia æqualiter inarticularentur, atque obliquus
 motus edi posset, cū tibia præsertim ad exte-
 riora flectenda veniret: cui motui destinatus
 est musculus sub poplite delitescens, qui ab ex-
 tero iam commemorato capite nascitur, ex-
 trinsecus scilicet versus posteriora, vbi pars que-
 dam inest aspera, & sinulis quibusdam impres-
 sa. Atque hæc diligenter intuearis Lector opti-
 me. nam huius musculi munus non satis recte
 perpendit Vesalius, cū minimè nosse posset,
 quomodo tibia in obliquum adduceretur. iam
 verò femur infra cum tibia per Ginglymum cō-
 ponitur. superius enim tibie caput duobus fini-
 bus refertum est, inter quos educitur tuber e-
 minens. Capita verò infimi femoris tibie fini-
 bus inhærent: at eiusdem femoris posterior si-
 nus mediam portionem tibie eminentiorē ex-
 cipit, vnde fluit ligamentum validum, quo ar-
 ctissimè femur cum tibia colligatur, non secus
 ac superiore articulo fiebat, vbi per Enarthro-

*Galen. de vitiis
in femore.*



*Vesalius decipi-
tur in musculo
flectente tibiam
ad exteriora.*

*Femur compo-
nitur cum tibia
infra per gingly-
mon.*

*Origo ligamēti
femoris cum ti-
bia infra.*

Femur copulatur coxædici per enarthrosim.

Cur ligamentū femoris supra infraque sit dignum annotatione.

De ligamentis priuatim ager.

Linea quæ est in posteriore femore delinatio.

Octauus musculus femoris est omnium maximus.

Quomodo recti stemus.

Asperitates ab insertione musculorum.

Femoris usus.

Cur cavitās femoris sit magna.
Vena.

sim femur coxendici committitur eo, quo supra diximus modo. Hoc autem ligamentum teres. quo femur supra infraque insignitur, articuli detinendi gratia, in aliis articulationibus minimè reperitur. Idcirco obseruatione dignum est. neque enim ob id hisce desunt communia cæteris ligamenta, quæ extrinsecus obducta partes coherentes inuestiunt, & vndique colligant: sed de his priuatim agemus. Præterea notanda est linea quædam insignis, multumque aspera, quæ in posteriore femoris regione prominet, nec procul ab interno rotatore incipit, ac per longitudinem eiusdem regionis deferretur: deinde ultra medium in duas partes scindi, & caput utrumque petere videtur, sed ad externum euidentius terminatur. Huic lineæ inferitur, ac tenaciter adhærescit octauus femoris musculus omnium nostri corporis maximus, cuius beneficio recti stamus. Aliæ nihilominus ibi adsunt asperitates, ac nonnullæ etiam impressiones, musculorum tantum occasione fabrefactæ, ut suo loco patebit, ubi musculi tam femur, quam tibiā mouentes describentur. femur & sistimus, cum recti stamus, & quæque versum agimus. nullum enim motionis genus illius cum coxendice articulatio excludit, quemadmodum in seipso quicunque experiri facile potest. Os id amplissimum sinum habet intus, quod leuius sit, & medullam multam pro nutrimento seruet. Huc scilicet pertingunt venæ per summam, imamque præ-

præsertim ipsius ossis partem plurimis locis perforatâ. De femore satis: nunc de tibia, fibulâq;

De Tibia. C A P. XXX.

QUEMADMODVM inter humerum, ac summam manû ossa duo descripsimus, quæ iuncta cubitum constituiebant: ita à femoris osse ad extremum pedem regio duplici osse constructa pertinet: quæ modò tibix, modò cruris nomine donatur. Alterum os, quod maius est, totius nomine tibiam nuncupamus: alterum verò longè gracilius quandoq; suram, quandoque fibulam vocamus. Tibiam Græci *κνήμην*, fibulam verò *περόνην* appellât. Tibia ea magnitudine prædita est, vt vel humerum superet, quem tamen Galenus omnium ossium maximum, excepto femore, credidit. Hæc infra, supràque appendicem habet. superior ipsius pars latior est, & crassior: duos sinus leuiter inque superficie sortita est, inter quos currit tuberculum quoddam prominens atque asperum. Hisce sinibus excipiuntur ima femoris capita, in quibus ne incommodiùs insiderent, cum præsertim depressores sint, quàm capitum altitudini cōueniat, Natura præter cartilagineam crustam vtrique sinui affixam, alteram apposuit mobilem: cuius figura lunam imitatur, & nostrum C similitudine refert, initid ac circa sinum oras crassior: quò verò introrsum magis centrum recipitur, eò tenuior semper fit, prius quidem desinēs, quàm centrū attingat. ita sinuū

Tibia & fibula proportionem respondent cubito & radio.

Tibia idē quod crur.

Cruris os maius tibia quoque dicitur.

Fibula est os gracilius cruris.

Idem sura & fibula κνήμη & περόνη.

Tibia est maior humero.

Humerus non est maior tibia contra Gal.

Femur reliqua ossa magnitudine excedit.

Tibia habet appendicē vtrinque.

Sinus.

Tuberculum.

Sinum usus.

Crusta cartilaginea.

Cartilaginis lunata figura & usus.

*Cartilago lant-
ra ligamēti vi-
cem gerit in ti-
bia.*

*Quomodo arti-
culo tibia cum
femore robur
datur.*

*Tibia deorsum
versus triangu-
lum imitatur.
Cur tibia tribus
præcipue parti-
bus incurvetur.*

*Quomodo fibu-
la tibia agglu-
tinetur.*

*Sinus vasa exci-
piens.*

*Musculorū ti-
bia extenden-
tium insertio.*

profunditatem maiorem relinquit: ad quam au-
gendā potissimū facta esse videtur: quanquā
quod lubrica est, lævis, mollis, & vinctuosa hu-
miditatis plena, ligamenti vice fungitur, & ar-
ticuli mobilitatem plurimū adiuuat. Accedit
etiam non nimium firmandi huius articuli ad-
iumentum. nam id tuber, quod è media tibiæ
superficie emergere, & alterum sinum ab altero
dirimere conspiciamus: in amplum sinum im-
mittitur, qui partem posteriorem vtriusque fe-
moris capitis intercipit, ibique valido ligamen-
to vincitur. quod ligamentum ex tuberis apice
prodit, & in medio sinu impensè admodū in-
figitur, atque ita articulus omni ex parte probè
munitus in sua sede cōtinetur. A superiore hac
parte deorsum procedens tibia sensim attenua-
tur longioribus lineis, ac sinibus variis distincta,
ita vt triangularem formam imiteretur: at obli-
què tendit, ac tribus præcipuè partibus incur-
uatur, perspicuè cedens musculis illac descen-
dentibus. Ibidem extrinsecus versus posteriora
iacet sinus quidam lævis, & cartilagine obdu-
ctus, cui adiacet internæ fibulæ capitis portio,
itaque supernè fibula tibiæ agglutinatur. Edu-
citur præterea è media posterioris partis summi-
tate sinus decliuus, quā transeunt vena, arteria,
& neruus, ac deorsum feruntur. verū antror-
sum non procul à summæ appendicis fine, ex-
tat eminentia quædam horrida musculorum in-
primis insertionē admittens tibiam extenden-
tium.

tium. Inde verò producta linea in mediâ regione acuta prominet, veluti cultri aciem effingēs, propterea quibusdam spina vocata est. Hinc tibiæ latus internum excarne deprehenditur, iccirco regio hæc crea dicta fuit contrario sensu, cum locus ille omni prorsus carne sit denudatus. alia autem tibiæ latera, maximèque posterius multa carne opplentur. Secunda item linea quæ fibulæ subest, illique è regione responder, ideo facta est, vt ex ea ligamentum producat, quo fibula cum tibia cōnectitur, ac interim anteriores musculi à posterioribus seiunguntur. Inferior tibiæ pars rursus crassescit, & in caput definit, quod superiore minus est, verum in superficie vnico, amplòque sinu excisum, qui sua cartilagine obducitur & tali insertionem suscipit. Huius capitis pars interna producit, ac in processum crassiusculū euadit, qui sinui iam commemorato prominet, ac talum sinui inhaerentem claudit: qui cum alterā in partem protrudi, & è sua sede dimoueri posset, alterū processum postulauit, quem tamen externæ tibiæ regio capere non potuit: quando in ea cælari debebat sinus oblongus sensim latefcens, & in duo supercilia desinens, quem subiret, cuique incumberet extrema fibulæ portio. Quod igitur tibia præstare non potuit, fibulam eam sedem occupantem præstare oportuit. quamobrem eius caput in acutum tendens, tantò declinius tibiæ osse descendit, quantum tibiæ caput

*Spina tibiæ
quid.
Circa quæ pars
tibiæ, & cur di
cta.*

*Vbi tibia multa
carne vestia-
tur.*

*Secunda linea
in tibia vsus.*

*Inferior tibia
describitur.*

*Vide naturæ ar-
tem miram.*

*Malleoli duo
qui internus &
qui externus.*

*Cur in luxatio-
ne malleolus in-
clinat magis ad
internum mal-
leolum, quàm
externum.
Interni malleo-
li figura & u-
sus.*

*Tali ceruix ti-
bia nequitur.
De fibula.
Finabula nō at-
tingit femur
suprà.*

*Arthrodia sub
Synarthrosi.*

*Asperitatum
processuum fi-
bule usus.*

superius fibulam excedit. Vnde inferius fibulæ caput non aliter, quàm processus quidam, alterum tali latus comprimit. Hæc autem duo tubercula malleoli dicuntur, quorum qui à tibia promittitur, internus: qui verò à fibula prouenit, externus vocatur. Ambo hinc inde talum tibie inarticulatum obsident, ut neutram in partem delabi possit, adeò ut si quando huiusmodi luxatio cōtingat, ad internum magis, quàm externum malleolū talus inclinet necesse sit: quoniam externus longiùs quàm internus producit. tibie processus, quem modò internum malleolum vocari diximus, parte posteriore sinum habet, unde ligamentum educitur, quo tali os tibie alligatur: cui etiam firmiùs nectendo non minimum adiumentum præbet sinus ille oblongus, asper, & transuersim ductus, què exigit anterior inferioris tibie appëdicis sedes. Etenim hinc ligamētum nascitur tali ceruicem ossi tibie nectens. Cæterum fibula tibie nō secus inhæret, ac radiū cubito adiungi diximus: parte tamen superiore femur nusquam attingit, verum sub tibie capite eo, quo suprà diximus, modo connectitur: infrà verò longum tibie sinum subit, vtriusque tamen partis structura per Arthrodiam fit, quæ sub Synarthrosi ponitur. Ambo fibulæ capita in processum acutū exeunt, quæ nonnullis asperitatibus prædita sunt, horū superius, quod est rotundius, musculorum tibiam mouentium insertioni deseruit: inferius autem

autem, quod depressius est, ac extrinsecus gibbum magis, musculos emittit extremo pedi famulantes. Verum quatenus bina hæc capita sinibus excipiantur, cartilagine obtenduntur. Fibula, etsi recta est, aut saltem modicè curua, plurimum tamen ab ipsa tibia dehiscit, parte præsertim superiore, quoniam ibi tibia in sinum flectitur. In eo autem interuallo ligamentum cernes, de quo supra meminimus, fibulam, tibiâque medio spatio complectens, ac præterea ligamentum id musculos distinguit, per quos spatium illud hinc inde repletur. quorum insertioni, ac nexui maximè inseruiunt inæqualitates fibulæ sinibus ac lineis comparatæ. huius muneris ergo hisce pariter fit, ut fibula æquè ac tibia angularem propemodum figurâ adipiscatur. Vsum horum ossium in se ipsis omnes, si experiri non pigeat, perdiscere possunt. Fibula verò in pronum, ac supinum non mouetur, quòd musculis huic obeundo muneri dicatis caret. Sed tam fibula, quàm tibia intus cavitatem habet medullam asseruantem, nec foraminibus deficit.

De Patella. CAP. XXXI.

Os quoddam genu præponitur, quod à femore, tibiâque separatum, utrique tamen communem veluti operam præstat, sicuti mox dicemus. Ideo separatim de hoc ipso osse agendum fuit post femoris ac tibiæ descriptionem, quando neque cum hoc, neque cum illo commisceri, neque etiam ante hoc, vel illud tra-

Vbi dehiscat fibula à tibia & cur.

Vsum tibiæ ac fibulæ. potest quilibet in se experiri.

Cur fibula in pronum & supinum non moueatur.

Fibula & tibia habent medullam in cavitatibus, habent & foramina.

Patella usus communis est femori & tibiæ.

Cur tractatur de patella separatim à capite de femore & tibiâ.

- Patellæ nominis explicatio.* Etari commodè potuit. Id autem est, quod Græci ἐπιγονήδα seu ἐπιγονάριον vocarunt : Latini autem patellam, genu molam, vel scutum, vel scutiforme os, vel genu rotulam nominarunt. os est, non cartilaginosum, sicuti nonnullis visum est, neque rursus adeò durum, vt solidum existimari debeat, vt alij existimarunt : at substantia est, qualis duræ cuiusdam appendicis, quæ tamen prona sit, vt nutrimentum per omnes sui partes suscipiat. Verùm intrò cartilagine lubrica inuoluitur, idq; magis parte, qua femur, ac tibiam respicit, cùm altera parte musculorum tendinibus inuestiatur. Patella hæc facta fuit, vt reget femoris, & tibię articulum, alioqui nimis patientem, ac proniorem, vt antrorsum procuberes facillimo luxationis genere. præstat item, vt in rectum angulum genu flecti possit mobile prætereà, nec pertinaciter adhærens esse debuit, vt ne difficilem articuli huius motum redderet, aut longum in genu decubitū præpediret. Suis tamen ligamentis cùm femoribus, tum etiam tibię necitur, quicquid alij dixerint, sibi persuadentes solis musculorum tendinibus contineri. nam ex appëdicibus femoris, & tibię ligamēta nascuntur, quibus manifestò molam vrinq; vinciri planè perspicimus, at cū femore solū articulatur eo modo, quē sibi Ginglymos vindicauit. Etenim anterior imi femoris pars in duo, vt diximus, capita desinens in medio sinum habet, in quem media protuberantior patellæ portio immi-
- Patella non est cartilaginosa neque solida.*
- Substantia patellæ qualis vere sit.*
- Vbi inuoluitur cartilagine lubrica patella.*
- Patellæ utilitas prima.*
- Cur patella sit mobilis.*
- Patella habet propria ligamēta contra commotionem.*
- Ortus propriorū ligamentorum patellæ unde.*
- Patella articulatur femori per Ginglymon.*

immittitur, quem vt magis impleat, commo-
diusque inhæreat, hinc inde & ipsa sinus natu-
ra dedit prouerberantibus femoris capitibus re-
spondentes. quamobrem femur patellam exci-
pit, & ab eadem pariter excipitur. Formam *patelle figura*
penè orbicularem nacta est: verùm in acutum *qualis.*
quodammodo definit, quatenus tibiæ affidet:
propterea scuti nomine donatur. in extremi-
tatibus tenuior, quò magis ad medium tendit, *vbi patella est*
eò crassior efficitur, vbi prorsus eminet, umbo- *similis umboni.*
nèmq; imitatur.

De Pedis ossibus, ac primùm de Talo.

CAPVT XXXII.

SUPEREST nunc vt extremi pedis ossa
describamus, quæ sex supra viginti sunt: vn-
de pes vno minus constat, quàm summa ma-
nus. Cæterùm in pede tres ordines similiter, ac
in manu constituere placet. idque clarioris do-
ctrinæ gratia: vt prima pars, quæ statim tibiæ,
fibulæque succedit, quamque tarsum nomina-
mus, brachiali respondeat, secunda verò, quam
pedium cū cæteris appellabimus, postbrachialis
ossibus. Tertia sit digitorum articulis destina-
ta. cū interim tamen eo solo inter se diffe-
rant, quòd septem nobis erunt tarfi ossa, bra-
chialis autem octo. quo fit, vt vno eo osse, quo
brachiale tarsum superat, manum pariter ex-
tremā extremo pedi præstare dicere possimus.
Quinque verò pedij ossa, quot etiam postbra-
chialis numerabūtur, quæ item supererūt vtro-
que.

Ossa pedis 26.

Manus ossium
numerus.

Tres ossiū pha-
langes in pede,
Comparantur
tres ordines os-
sium in pede cū
tribus ordinibus

ossiū in manu.

Tarsus quid.

Tarfi & bra-
chialis confor-
mitas.

Pedij & post-
brachialis con-
formitas.

Tarfi ossa septē.

Brachialis ossa
octo.

Pedij ossa
quinque.

Ossa postbra-
chialis quin-
que.

Ossa digitorum manus & pedis quatuordecim.
In ossibus Tarfi differt ab aliis anatomicis & quomodo.
Prima classis se preta ossi Tarfi in pede responder brachiali.

bique, in digitorum articulos quatuordecim distinguuntur. Neque video cur à tarfi ossibus tria illa priora seiungi debeant, sicuti ab aliis Anatomicis factum fuit fatentibus quatuor posteriora, quæ sola tarfi appellatione dignantur, ad brachiale tantum referri oportere, tribus primis absque relatione designatis. Per me itaque semper licebit cum hæc tria, tum etiam quatuor sequentia tarfi vocabulo complecti: ut cum à tibia, suraque recesserimus, descendentes protinus ad unam ossium compagem, veluti classem deveniamus, quam brachiali comparemus, quod quidem post cubitum, unamque nobis occurrat. Verum hæc tarfi ossa singula peculiari nomine non sunt donata. nam prima tria alij à tarso secernunt, & unum ex quatuor sequentibus proprium nomen obtinuerunt. at postrema tria adhuc sunt sine nomine. Primum igitur omnium talus, secundum calx, tertium scaphoides, quartum cyboïdes nominabitur. quæ supersunt tria, quæquæ innominata sunt, attamen numeri, situs, ac formæ ratione distinguuntur. Primum ergo talus erit, quem Græci ἀσφάλαιον, & ἄσπιον vocant: tibiam, fibulamque; illico subit, quippe cui illarum appendices incumbunt: quanquam tibie soli substratus esse videtur. Id os homini cum cæteris commune est animalibus, quæ multiformi, seu in digitos scisso pede incedunt: quicquid dixerit Aristoteles atque illum sequuti. à quorum sententia rei veritas omnino abhorret. Tali for-

Singula Tarfi ossa non habent nomen.

Talus.

Calx.

Scaphoides.

Cyboïdes.

Quomodo distinguantur tria ossa Tarfi carentia nomine.

Idem est ἀσφάλαιος & ἄσπιον & Talus.

Tali situs.

Talem habent homo & animalia pede multiformi.

Aristoteles dicitur in Tal.

li forma ea fuit, vt suprà emineat, vt orbicula- *Tali figura.*
 re tuber, ceu rotulæ partē imiteretur, quæ in me-
 dio sinum leuem possidet lateribus hinc inde
 prominentioribus, quâ scilicet cum tibiæ osse co-
 pulatur: sic enim tibiæ ossis appendicem, quæ *Cur appendix*
 admodum capite de tibiæ, suræque ossibus di- *tibiæ talum ex-*
 ctum fuit, natura insculpsit, vt excipiendo talo *cipiat.*
 percommodam sedem præberet, tutiorem ni- *Talus articula-*
 mirum articulationis speciem constituens, quæ *tur tibiæ per*
 ginglymos dicitur. Subseruit autem hic articu- *ginglymon.*
 li modus pedi flectendo, ac reflectendo, qui mo- *Ginglymi usus*
 tus ab ingrediente animali continenter fieri so- *in talo & tibiæ.*
 let. qui motus vt faciliior foret, minúsque mem-
 brum ex eo laboraret, aut ne ossa attritu multo
 randem deficerent, naturæ solertia pars vtra- *Cur os tali car-*
 que cùm tarsi, tum tali appendicis vberiore cru- *tilagine incru-*
 sta leuigauit. Tali latera vtrinque sunt decliua, *Cur tali latera*
 ac figura veluti plana, vt illis internus tibiæ pro- *sint decliua &*
 cessus ac fibulæ appendix malleolos ambos con- *plana.*
 stituentes adhærescerent. at externum latus *Quid cōstituat*
 longiùs descendit, magisq; est excauatum, quo *malleolos.*
 inferiùs procedentem fibulæ appendicem ex-
 cipiat, ad externum malleolum construendum, *Cur malleolus*
 qui propterea deorsum magis quàm internus *externus disse-*
 protenditur. Inferior tali pars sima est, ac sua *rat ab interno.*
 cartilagine obducta: tota calcis ossi inhæret, ita *Tali pars infe-*
 tamen, vt anterior eius portio semicircularem *rior qualis.*
 sinum habeat, cui inferitur media se offerens
 calcis regio. at posterior quodammodo promi-
 net, quâ scilicet ab interna, atq; posteriore calcis

*Per anteriorem
partē quid in-
telligendum.
Quid per poste-
riorem.*

*Curnatura ca-
uitatem magnā
in talo fixerit.*

*Vbi sint liga-
menta calcis &
tali.*

*Anterioris tali
partis figura &
usus.*

*Quomodo pes
obsuro motu
moueat.*

*Descriptio par-
tis prioris tali.*

*Cur tali os fit
sinuatum.*

*Tali ossis sub-
stantia qualis.*

portione suscipitur. nos anteriorem partē semper intelligimus, quæ à capite descendentibus primo se offert: posteriorem verò, quæ sequitur, remotiōrque est. sed inter illa duo spatia cauitas admodū profunda iacet, quam etiam augere videtur calcis sinus in ea parte cauitati huic è regione respondens. Hanc ipsam non aliorum factam fuisse coniicio, quàm vt mucosam quandam substantiam, ac pinguedinem simul contineat humectandis inungendisque hisce ossibus paratam, ne scilicet crebro motu exsicarentur: atque ita suo munere frustrarentur, præterquam quòd ligamenta ibi præstò sunt, calcem, ac talum arctissimè colligantia. Anterior eiusdem pars in cervicis formam producit, qua in caput rotundū, & sua crusta obiectū definit, quod ab osse scaphoide in amplum, rotundūmq; sinum cælato excipitur. Is articulus præstat, vt pedem obsuro quamlibet motu introrsum, extrorsūmq; moueatur, necnō etiā aliquo modo circūducatur. Demum parte priore talus decūbit, & in geminū quasi processulum supra calcem extenditur, quæ scilicet ad internam regionem vergit, atque in hunc modum se habet tali os: quod tamen adeò sinuatum conspicitur, vt non modò ligamentorū insertionē, ortūmve admittat, sed tendinū musculorum digitos mouētium deductui cedat. huius substantiam solidā nō inuenies: vt aliquis opinatus est, verum intus spōgiofa est, ac multis foraminibus

peruia.

peruia . secundum . quod sequitur calx, siue calcis os dicitur , alij calcaneum , vel pedis calcar appellant, Græcis πτερον vocatur : magnitudine ideo omnibus summi pedis ossibus antecellit, non multum à tali substantia dissidens , quam fungosius esse videtur : neque adeò duro cortice vndique munitum , supernè tali ossi ad eum , quem paulò suprà diximus, modum cōmittitur, cum scilicet media versus anteriora regio partim rotundo tubere turgat, partim verò ingentem sinum habeat, vt talum excipiat, & ab eodem per Ginglymon excipiat. at quæ prior est, in tergum tamen vergit : oblonga, rotundaque est , quodammodo caput in superficie habet, & in ea regione appendice munitur, ac tota portio à tibiæ rectitudine excedit: quod ideo factum fuisse existimo , ne pes cū tibia posteriora versus delaberetur, minúsque sic illa pedi, pes verò humi hæreret . inferiorè calcis partem , qua progredimur , latiusculam esse oportuit : vt tutius ibi pes consisteret : eandem præterea asperam, & transuerso processu abundantem , vt inde oriretur musculus flectendo quatuor pedis digitorum articulo deseruiens . vbi præterea ortum habet materia illa musculosa, ynde emergunt quatuor muscoli, qui lōgo tendine in internam quatuor digitorum regionem implantantur, & propterea eminentes hinc inde processus cavitatem quandam relinquunt, vt cōmodiùs in ea tam musculus, quàm muscu-

Error cuiusdā existimantis os tali esse solidū, Calce nomina. Calx est maius os in summo pede. Calcis substantia qualis.

Cur calx à tibiæ rectitudine excedat.

Cur inferior pars calcis sit latior.

Cur aspera, & processu transuerso.

Materia musculosa ex qua quatuor exeunt musculi.

Cur inter processus eminentes sit cavitata.

*Asperitas in ca-
pite calcis cur.*

*Articulationis
forma sub Gin-
glymo; ad Sy-
narthrosim re-
ferenda.*

Processus vsus.

*Cur internum
latus calcis sit
insigniter exca-
uiatum.*

losa illa substantia locum habeat: ne, dum pes humi validius incumbit, eiusmodi musculorum capita nimia compressione lædantur. Iam verò calx ea parte, quam in caput euadere dictum est, impressionem quādam habet leui, ac paululum elata asperitate donatam, quo melius in eā tendo omnium maximus, ac robustissimus infere-retur: qui à tribus musculis pedem mouentibus in vnum tandem coeuntibus conficitur. parte quā minimū digitum respicit, cum cyboide cō-iungitur: ita quidem, vt supernè, vbi leuiter ef-fertur, plano propemodū cyboidis sinui apte-tur. Infernè autem obliquo ceu sinu, atque ad interna vergente æquali ductu procedentē cy-boidis portionem excipiat. Quamobrem sub Ginglymo ad Synarthrosim referēda talem ar-ticuli formam rectius posueris: quā verò maxi-mum digitum spectat, (quam tamen regionem ad internum calcis latus concinnius referas) processum non modicum emittit, quo sinum in interno latere celatum adaugeat, ac propte-rea propugnaculo sit cū musculorum tendi-nibus, tum etiam venæ, arteriæ, ac neruo illac transeuntibus. Non enim ob alios vsus latus id tam insigniter excauiatū est, quā vt hisce va-sis, tendinibûsq; cederet, quibus omnibus tam confert processus iste, quā etiam præstat, vt talus ibi aptius cum calce cohæreat. externum denique calcis latus depressum est, asperum, & inæquale: cui prope partem posteriorem paruus adest

adeſt ſinus ſub exiguo proceſſu conditus, vbi cartilagineam cruſtam offendes, quā nimirum petit muſculi ſeptimi tendo, pedi extendendo ſubſeruiſſentis. Tertium tarſi os à Græcis *σκαφοειδές*, à noſtris autem nauiforme, ſiue nauiculare, ſiue cymbā referens nuncupatur: quoniam ſcapam, aut phaſelum imiterur. Id os in interna pedis parte poſitum eſt: anteriore ſui ſede ſinu eſt profundo, in quem oblongum, rotundūque tali caput inferitur, qui articulus ad Enarthroſim nihilominus obſcuram referri debet, quando ab eo non niſi obſcurus motus prouenit. poſterior pars priori quinti, ſexti, ac ſeptimi oſſium nomine carentium ſedi committitur ita quidem, vt non facilè ſit iudicare, ab illis ne oſſibus excipiat, an illa ipſa excipiat. Etenim hæ ſedes nō prorsus cōmonſtrant, ſinūſne, an tubercula ſint: tametſi leuiter demum protuberare videntur. externum eiufdem lateris amplum, rotundum, ſinuarūque eſt, quā præſertim cum quinto oſſe coniungitur. Vnde ſimul atque diſceditur, ſenſim in anguſtum redigitur, & in internū proceſſum finitur: veluti nauis roſtrum referens. ita internum lateris prominet, vt inſigne tuber conſtituat, cuius ope dextrum à ſiniſtro leui momento ſecernimus: inferiorēque ſinum, cui eminet, maiorem efficit, quā tendo ſexti muſculi pedē mouentis percōmodè reflectitur, multis aſperitatibus cū ſuperiore, tū etiā inferiore parte ſcatet,

Os Tarſi vel Nauiforme.

Situs nauiformis.

Articulatio nauiformis cum tali ad Enarthroſim. Poſterioris cymbæ deſcriptio.

Externi lateris cymba deſcriptio.

Reflexio tendinis ſexti muſculi pedē mouentis.

*Cyboides os
quadratum.*

*Cyboides non
est quadratum.
Cur cyboides di-
citur πολύ-
μορφον.
Os gradinosum.
Sicut cyboides.*

*Cur iuncturis
adfit cartilago.*

*Sinus viā prae-
bens tendini se-
ptimi musculi
pedis.*

vt idoneam ligamenti sedem præbeat, quibus ossa hæc inuicem connectantur. Quartum os, quod cæteri primùm tarfi faciunt, κυβοειδὲς Græcè, Latine autem cubiforme, seu cubum, tesseramue imitās, dicitur. & licet quadratum esse videatur, ita quòd tesseræ figuram referat, multiplici tamen forma insignitur: ideo πολύμορφον quasi multiforme nuncupatum est. Arabes gradinosum vocarunt. Id quidem ad extimū pedis latus iacet, & cum calcē parte anteriore eo articuli genere iungitur, vt non magis suscipere, quàm suscipi videatur: sicuti antea asseruimus, vbi de calce loquebamur. In posteriore autem illius parte duos similes sinus cernere est, quibus suscipit extrema duo pedij ossa, quibus fulciendis veluti basis paratum esse videtur. At internum latus cum externo septimi ossis coheret, vbi non secus atque aliis partibus, quæ cum cæteris ossibus copulantur, leui cartilagine incrustatum animaduertas: cū tamen alibi nulla cartilagine obducatur. solis siquidem iuncturis talis adest cartilago, ne nimis impacta sint ossa: ac motui quamuis obscuro resistent. extrema sedes bifida est, ac duos processus exerit sinu medio illos dirimente, qui ad inferiora obliquo ductu tendit, vt obsequatur tendini septimi musculi pedem mouentis, cui substratus est, ac viam præbeat. superior pars planior est, sed extrorsum accliuus fit, quando talis reliqua pedis forma futura est, vt scilicet in medio clatior,

in

in vtrunque latus, ac maximè in externum sensim declinet. Propterea videre est pedis ossa, præsertim postrema tarfi quatuor in orbicularem formam diducta, vt parte superiore conuexa sint: infernè autem cõcaua fornicem imitentur. Validior nempe constructio hæc futura erat, ac roboris plus habitura, quæ sufficeret tum figendo pedi, tum demum corporeæ moli sustinendæ.

Cur tarfi ossa postrema præsertim sint fornicis instar.

Ad hæc prominere huiusmodi ossa necesse fuit, vt infernæ cavitati relinquerent idoneam sedem, tutum iter exhibituræ tédinibus ac musculis sub inferiore regione positis. Verùm hæc obiter dixisse sufficiat, vt parere possit: quare in superficie protuberantem pedis formam, ac in ima parte simam, cauæue,

Cur prominens ossa tarfi.

non planam natura construxerit. Cæterùm ad tarfi ossa reuertamus, è quibus reliqua iam sunt tria, quæ adhuc nomine destituuntur. horum quintum è regione pollicis situm est, cuius figura talis esse videtur, & antè sinuata conspicitur, & cum posteriore naucularis portione prominente coniungitur: retrò verò primi pedij ossis, quod pollicem sustinet, sedes efficitur, quâ partem si per se spectes, difficile iudicatu sit, sinuatane sit, an promineat: quod quatuor hisce tarfi ossibus cõmune est, quatenus inuicem, aut cum pedij ossibus vniuntur. obscuri enim adeò in iis sunt sinus, vt planis seu superficiebus in modum glenes committi rectè dici possint. Attamen si consideres partem illam pedij ossis, quæ huic

Pedis forma in superficie protuberat in ima parte sima est.

Per Glenem committi.

quinto offi incumbit, vbi eam videris duplicem
 cauitatem præ se ferre, procul dubio iudicabis
 necessum esse, vt altera hæc pars in duo quam-
 libet exilia tubercula turgat: nisi geminas hinc
 inde sinuatas partes committi fateamur: quod
 mea quidem sententia perridiculum foret, quã-
 do vbique tum naturæ, tum etiam artis naturæ
 prorsus æmulæ ordo postulat, vt vel plana pla-
 nis, vel sima protuberantibus, nusquam verò
 caua cauis committantur. superior pars modi-
 ca est, & ad intimam sedem, quæ latissima vi-
 situr, descendit. hæc autē quoquomodo gibba
 est pro eius cauitatis ratione, quæ in externa re-
 gione cernitur: quã ad inferiora pertinet, cum
 interim latus id parte sui superiore internum
 sexti offis latus modico sinu contingat. verum
 inferior crassior existit, quo firmitus terræ inhæ-
 reat. Sextum os quadrilaterum apparet, si supe-
 riorem eius faciem intueamur: quæ utiq; plana
 est, & quadratis lateribus responderet. At si par-
 tem inferiorem, cum illa angustissima sit, & in
 aciem abeat: hoc ipsum os cunei tantum ima-
 ginem referre dicemus, quale item esse dixeris
 septimum, quod illi proximum est os, de quo
 mox dicemus. ac mehercule ambo hæc ossa sic
 inter alia, quæ circumstant, posita sunt, vt cu-
 neorum more ad ea veluti cōstipanda immissa
 fuisse videantur. Verum sexti huiusce offis pars
 anterior cum scaphoïde, posterior leuiter pro-
 minens cum secundo Pedij osse, intima cū ex-
 terno

*Plana planis,
 vel sima protu-
 berantibus com-
 mittuntur non
 caua cauis.*

*Cur quintum os
 innominatū in-
 fra sit crassius.
 Sexti offis tarsi
 in nominati de-
 scriptio figura.*

*Sexti & septi-
 mi offis tarsi u-
 tilitas.*

terno quinti tarfi ossis latere, ac demum externa cum intima septimi eiusdem sede copulatur. Quibus partibus sua nō deest cartilaginea crusta. Septimum mediū est inter sextum, ac quartum, quod cyboïdes nuncupauimus. quadrangulare id quoque videtur: sed longiusculū est. anteriore sui parte ad nauiforme declinat, eiūsq̃ tuberculum exiguo admodū sinu excipit, itaque illi committitur: parte verò posteriore tertium pedij os admittit: at suis lateribus latera tum sexti, tum quarti ossis attingit. atq; hæc de tarfi ossibus: quorum substantia dura quidē est, non omnino tamen solida, nec à foraminibus vacua recipiendi alimēti gratia constitutis.

Septimi ossis in-
nominati situs.

Ossū tarfi sub-
stantia qualis.

De pedio. CAP. XXXIII.

SECUNDA pedis pars, quàm Græci *πῆδιον* Idem est *πῆ-*
δίων, *planta*,
Sappellār, Latinis modò plāta, modò pecten, *pecten*, *vesti-*
modò pedis vestigium: ea est, quā postbrachia- *giūque pedis.*
li respondere diximus, quinque ossibus cōstans, *Planta respon-*
articulos digitorum imitātibus oblongis, ac te- *det postbrachi-*
retibus, quorum extrema capita mediam regio- *ali.*
nem subtiliorem relinquūt. Etenim initio cras- *Ossa planta*
siora, ac sinuata quā cū quatuor postremis tarfi *quor.*
ossibus eo quo dictum est modò componūtur: *Ossium planta*
inde verò quā cum primis digitorum articulis *figura.*
iunguntur: in rotundum caput non secus atque *Primū os plan-*
postbrachialis ossa, eminent. Ex his ossibus pri- *ta describitur.*
mum maximū est, verū aliis longitudine cedit. siquidem omnium breuissimum est, cuius pars inferior, quæ sub capite est anteriore, in tuber-

*Tuberculi in
primo osse plan-
te usui.
Secundi ossis
plantæ descri-
ptio et usus.*

*Tendonis octavi
musculi pedis
inferio.*

*Situs musculo-
rum qui flectunt
primum articu-
lum digitorum.
Ossa plantæ ha-
bent appendi-
cem.*

*Ossa plantæ cur-
sunt foraminu-
lenta.*

culum prominet, quo duo sesamina ossicula ibi
affidentia disiungit. At secundum os, quod su-
stinendo indicis est efformatum, omnium lon-
gissimum, quantum illud quoque esse videtur,
quod minimo subest: eius enim longitudinem
adaugēt prominentior in externum pedis latus
producitur, in quem octavi musculi pedē mo-
uentis tendo inditur. Cæterum omnia parte
antere tarsī ossibus vniuntur, atque etiam si-
bi inuicem inhaerent, sensim deinde dehiscunt,
& à se mutuo abscedunt, tenuioraque fiunt, ut
in medio interualla cōstituant, in quibus mus-
culi sunt primos digitorum articulos flectentes.
Tam anteriore, quàm posteriore parte appen-
dicem obtinere cartilaginea crusta obtectam,
verum appendix posteriori parti adnata rotun-
dum illud, de quo diximus, caput effingit, quod
in sinum primorum articulorum profundum,
atque orbiculare immittitur. caua intus sunt, ac
medullosa, & habent foraminula, per quæ cum
venulæ, tum arteriolæ ad ea nutrienda, fouen-
dæque subintrant.

De Digitis. CAP. XXXIII.

*Digitus est ter-
tia pars pedis.
Ossium digito-
rum numerus.*

*Pollex habet
duos articulos
in manu pe-
dique.*

TERTIAM pedis partem explent digitorū
articuli pedion subsequētes. Hæc ossa qua-
tuordecim numero sunt. nam singulis digitis
terni sunt articuli, præter pollicem, cui duo tã-
tùm obtrigere, id quod in manu quoque, obser-
uauimus. Qui enim maximi digiti primus arti-
culus esse deberet, utrobique pari passu incedere
videtur,

videtur, in postbrachialis. videlicet ac pedis ossibus: adeò vt meritò in eorum numero collocetur. licet in manu id genus os à cæteris postbrachialis ossibus differre faciliè deprehèdatur, cùm in eo motus quodàmmodo manifestus fiat. In pede autem os istud non alio motu mouetur, ac reliqua pedij ossa. Iccirco rectiùs id ipsum inter illa connumeratur, atque ita duo tantùm articuli pedis maximo assignantur.

Quemadmodum ergo digitorum pedis ossa cum iis, quæ in manu sunt, numero conueniunt: ita quoque parum ab eisdem discrepant substantia, structura, ac situ, præterquam quòd prima internodia parte sui anteriore sinu constant profundiore, in quem inferuntur prominentiora ossium pedij capita: quod articulationis genus Enarthrosim dicimus. Cæterùm in mutuis ipsorum articulationibus Ginglymon semper obseruabis. Hæc itidè internodia breuiora sunt, quàm in ipsa manu, supernè gibba, infernè verò sima, vt musculorum secundum, ac tertium digitorum articulum flectentium tendines turissimè admittant, nec appendice vtrunque ipsorum caput destituitur: vbi Cartilago etiam obducitur firmiorem; lubricamque magis articulationem reddens (summam extremorum articulorū partem excipio) vbi neque appendicem, neque Cartilagineam crustam inuenias: quandoquidem nulli alteri ossi ibidem coarticulatur. medulla & ipsa in-

Collatio ossium digitorum pedis cum ossibus digitorum manus.

Vbi ossa digitorum pedis articulantur per Enarthrosim cum ossibus plantæ.

Enarthrosis quid.

Mutua articulationis ossium pedij & digitorum fit per Ginglymon.

Tendines musculorum flectentium secundum & tertium articulum digitorum.

Appendix.

Cartilaginis in articulatione utilitas.

Utr summæ digitorum articuli careant appendice & cartilagine.

Ossium digitorum cavitates medullam habet.

tus referta sunt, neque inani cavitare prædita.

De sesaminis. CAP. XXXV.

*Sesam. osium
figura & situs.*

*Osium sesami-
nis usus primus*

*Sesam. usus se-
cundus.*

Mola in genu

usus.

*Sesam. usus ter-
tius.*

*Sesam. usus
quartus.*

*Cur sesamina
sint dicta.*

*Differētia duo-
rum sesam. ab
aliis.*

*Sesam. osium
substantia qua-
lis.*

*Medulosus suc-
cus continetur
in sesaminis.*

DANTVR ossicula quædam orbicularia, depressaque sub infimis digitorum nō modò pedis, verumetiam manus articulis inter ipsa internodia iacentia. Quæ quanquam non aliorum à natura fabricata esse videatur, quàm vt infarciant vacuum illud, quod iisdem articulis reliquum est: alios tamen usus longè maiores præstant: quippe quæ non secus propugnaculo sint articulis, quàm soleat genu moleam partem munire, qua cum femore tibia articulatur: & apprehendendis rebus firmitatem non modicam, & in pede humi æqualiter aptando commodum maximum afferant. Præterea facta sunt, vt articuli in ipsa flexione in acutum angulum non dirigantur. Hæc ossicula, quòd parua admodum sunt: nō formæ tantum ratione veteres sesami semini compararunt: unde Græcis σισαμοειδῆ, Latinis verò sesamina ossicula, vel sesami figuram præ se ferentia, dicta sunt. Excipi ab aliis iure possunt gemina illa, quæ sub interiore primi pedis ossis parte, qua cum primo articulo pollicis articulatur, reperiuntur. siquidem maiora sunt, & Cartilagine quadam incrustata, quatenus videlicet articulo inhærēt, cum cætera multò maiora sint. omnia substantia sunt penè solidiore, quæ tamen intus fungosa est, ac poris scatet, vbi succus quidam medulosus pro nutrimento seruetur. Nu-

merus

merus ossiculorum incertus est, in nonnullis viginti, in aliis quindecim, in quibusdam decem, in aliis plus minúsue. Hic obiter dictum illud velim, horum ossiculorum causa nonnunquam euenire, vt luxati præsertim primi digitorum articuli minus commodè reponantur. Nisi enim quis difficultatis rationem optimè nouerit, nusquam plenam restorationem molietur. Atque hæc de ossibus, quibus explicandis tum

Non est certus numerus ossium sesaminorum.

Cur luxatio in pede sit quandoque repositus difficilis.

Breuitati & perspicuitati studet.

breuitati, tum etiam perspicuitati studimus: vt quoad eius fieri potuit, discientium vtilitati consuleremus, eandem operam in cæteris, quæ sequuntur, præstaturi.

M ij

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS.

DE RE ANATOMICA.

Liber secundus.

DE CARTILAGINIBVS.

*Ordo tractan-
dorum.**Cartilaginis de-
scriptio.**Cur cartilagini
sentiendum non
fuit.**Cartilaginu v-
sus multiplex.*

EQUENS hic Liber Car-
tilaginum naturā expli-
cabit, ligamentorūque
fabricam, ac postremò
sceleti componēdi ratio-
nem. A Cartilaginis igi-
tur, quod ea primò no-
bis proposita sit, descri-
ptione exordiamur. Cartilago substantia quæ-
dam est media inter ossa, & ligamenta. Nam
ossibus tantò mollior existit, quantò ligamen-
tis durior: albedine tamen cum vtrisque maxi-
moperè conuenit ac sensus penitus est expers.
Etenim neruos sentiendi authores nullibi co-
gnoscit, quod summa cum ratione factum esse
fatebitur, qui Cartilaginum vtilitatem callebit.
Nam Cartilagine sentire minimè decuit, siue
operiendi, ac sustinendi munere fungantur: si-
ue propugnaculorum vices gerant: siue præ-
stent, vt ne ossa inuicem atterantur: siue effi-
ciant, vt eadem simul annexa firmiùs cohæreāt
sua

siue sinus augeant: siue articulorum motus faciliores reddant. Iam verò easdem sic natura cōposuit, vt nullo vsquam modo frangi possint vbiq; sua mollitie cedentes: neq; adeò resistunt sicuti ossa, nec impetu aliquo decidunt, aut extenduntur attractæ, vt ligamenta plærung; faciunt: verùm in sese redeunt semper, neque sedem suam, vel formam facilè commutant.

Natura in cartilag. compositione admirabili.

De Palpebrarum Cartilaginibus.

C A P V T I.

PRIMVM locum inter Cartilagines illæ sibi vendicât, quæ oculorum palpebris cōtigere: binæ quidē vtrinq; suprâ, infrâq;, at superiores maiores longè sunt homini, atq; iis animâtibus quibus palpebræ superiores mouëtur inferioribus immotis. Quibus verò contrâ, vt aubus penè omnibus, inferiores superioribus maiores existunt. Cæterùm has Cartilagines inuestiunt intus membranula, foris autem cutis, licet in palpebrarum extremitatibus tantùm sita sint, quas validiores efficiunt, vt arctiùs conniueant, ita propugnaculi vicem oculis præbent. cui rei non minimum adferunt adiumentum pili in vtraque Cartilagine nō secus, ac in duriore solo infixi, vt ne molliùs iaceant, aut languidiùs pendeat, sed stent erecti ad ipsam oculorum aciem dirigendam.

Cux membrana & cute inuestiantur palpebrarum cartilagines.

Pilorum in cartilaginibus palpebrarum vsus.

De Aurium Cartilaginibus. C A P. II.

His proximæ geminæ illæ sunt, quæ vtrâq; aurem constituunt, audirus foramini sic

Vsus.

*Cur crassiores
superne.*

*Vbi duriores, &
cur.
Os rēporum ubi
sit asperum, &
cur.*

*Figura carti-
lag. aurium qua-
lis & cur talis.*

*Cur aures osseæ
non sint.*

*Cur aures sint
cartilagineæ.*

*Cur aurium cu-
ris sit pertinax.*

appositæ, vt ipsarum ope, atque opera longiùs id extendi, ac latius quodammodo patere videatur ad sonos promptùs percipiendos. Crassiores supernè Cartilaginee hæ factę fuerunt, ac præsertim iuxta foramen, vnde ortum habent, vbi duriores quoq; sentiuntur ob temporis offis, vnde prodeunt, vicinitatem. Nimirum id os ad meatus auditorij circumferētiam asperum redditur, vt Cartilaginee educat, ea ratione accommodatiùs: vbi etiā ita affixę sunt, vt nullo momento, neque deorsum labi, neq; fursum propelli possint. Intus, extrāque partibus constantum simis, tum etiam gibbis, vt prominentes partes externæ internis cauitatibus respondeant. Suprà rotundę sunt, infrà verò in pinnam desinunt: quæ licet ab ipsis Cartilaginum finibus dependeat, Cartilagineis tamen omnino est expers, cùm neutiquam eius ipsius indigeat. In promptu nemini esse non potest, cur non osseas aures natura efformauerit. quoniam si subtilitatem respexisset ex osse illas fabricatura, fractu faciles, & paulò momento defecturas nouerat. at si crassas, & solidas, quales esse debuerant, nimis profectò capiti onerosas. Rectissimè ergo ex Cartilaginea substantia leui, atq; ob sui molitiem ab externis ictibus minus lædenda construxit. Quibus præterea non tam munimenti, quàm decoris gratia pertinacè cutim aduoluit.

De Nasi Cartilaginibus.

C A P V T I I I.

Extrema

EXTREMA nasi portio Cartilaginea facta est magna naturæ prouidentia, vt facillimè claudi, malorum odorum ascensus prohiberi, ac rursum aperiri dilatarique possit aëris attrahendi causa. Præterea hæc narium substantiæ ratio, vt de auribus dicebamus, cōfert, vt vix lædatur ab extrinsecis, quibus sæpe occurfat: presensa enim cedit frangi omnino nescia. Quæ utilitates adeò necessariae sublatae forent, si narium fabrica vniuersa ex osse constaret. Quamobrem optimè huic parti, sicuti cæteris sapientissimus rerum opifex consuluit, dum imas nasi partes Cartilagineas cōdidit superioribus osseis annexens, vt inferioribus superiores veluti basis, ac firmamentum forent, quādo hæ ab illis pendere debebant. In tres ergo Cartilagineas nasi extremitas distincta est. quarum duæ latera constituent, quas pinnas, seu alas vocarūt, quāsque tertia Cartilago interfecat, vnde nasi foramina duo conficiuntur. Hæc media osseo nasi septo finitima respondet. Pinnae autem ipsæ solæ sunt quæ mouentur, cum propriis donatae sint musculis extrorsum illas ipsas trahentibus, vt dilatentur: sed introrsum nullo peculiari musculo adducuntur. Tamen si Ves. internos quosdā musculos somniauit, qui mihi nusquā reperti sunt. Cæterum labiorum beneficio clauduntur, quemadmodum loco suo vberius ostenderetur.

*Cur extremus
nasis sit carti-
lagineus.*

*Cur totus nasis
non est osseus.*

*Cur superiori na-
si pars sit ossea.*

*Tres nasi extre-
mi Cartilagi-
nes.*

*Cur solæ pinnae
in naso mouean-
tur.*

Vesalij error.

*Quomodo pin-
nae narium clau-
duntur.*

De Maxilla inferioris Cartilaginibus.

C A P V T I I I I.

M iij

Situs. **P**RIORE libro, ubi de Maxilla inferiore lo-
quuti sumus, duarum Cartilaginum obiter
meminimus, quas inter superiores eiusdem ma-
xillæ processus, ac temporum ossa haud dubiè
Vsus. reperies. mobiles quidem illæ sunt, nec alia de
causa fabricatæ, quàm ut frequentem maxillæ
motum tâquam in lubrico ponerent. Vix enim
verisimile sit articulum illum quamlibet laxum
sufficere posse: quin etiam inter edendum, lo-
quendum, atq; oscitandum ossa hæc attereren-
tur, aut saltem labore nimio fatigata ab ipso tâ-
dem motu defisteret: nisi Cartilagines istæ mo-
biles adessent, quarum beneficio, quando cūque
opus foret, maxilla promptius moueretur nul-
lum ferè quietis, aut cessationis tēpus requirens.

De Asperæ Arteriæ Cartilaginibus.

C A P V T V.

*Trachea & la-
rynx antiquis
ex cartilag.
constat.*

TRACHEAM Arteriam, atque eius caput
laryngem ex Cartilaginibus, nō ex ossibus
constructam esse cū veteres, tum recentiores
Anatomici existimauerunt. quorum authori-
tati subscribere nō grauaretur, nisi rei natura mul-
tò aliter haberet. Neque mirum videri debet,
tot celebres viros hallucinatos esse in substātia
laryngis. facilis enim est error, si brutorum, ut
bouis, & huiusmodi aliorū laryngem intueare,
qualem Vesalius publicè semper secare, atque
ostentare consuevit. Verū si humanam inspe-
xeris, præsertim in consistente ætate, procul du-
bio ossicula omnia, ex quibus conficitur, agnos-
ces

*In brutis sub-
stantia laryngis
cartilaginea est.*

*Homini in con-
sistente ætate
constituti larynx
ex ossibus consti-
tuitur.*

sces epiglottide excepta, quæ fistulam regit. *Epiglottis quid sit.*

Ea verò linguæ formam referens lingua nūcupari latinè solet. Græcam vocem magis amāribus Epiglottis dicitur. Quā Cartilagineam esse oportuit, vt sine vlla noxa continuum motum

Cur Epiglottis sit cartilaginea.

admitteret, qui expirando, inspirandoque continenter editur, præterquam quòd moueri quoque illam necesse est, dum aliquid deglutimus, dūmque loquimur, vbi modò attollitur, modò deprimitur, ac præterea in vomitu ad contraria reuellit: quos motus facillimè cōsequitur cartilagine in quamlibet partem cedente. At reliquas laryngis partes, quoniam ossëam naturam, vt antea diximus, sapiunt, nos inter ossa connumerauimus proprio de illis capite. Quod autē

Cur de laryngis partibus plerisque loquatur in libro de ossibus.

laryngem sequitur, asperæ arteriæ tractu finitur, idque totum cartilagineum est, & crebris anulis distinguitur. qui tamen anuli non ex continua cartilagine constant: siquidem parte posteriore vertebrae versus, vbi œsophagus, siue gulæ canalis iuxta extenditur, intersecti sunt, membranula tamen eos illic copulante. Nō enim abrupti esse poterant: at nihilominus ipsi œsophago cedere illos operæpretium erat, ne deglutendis cibis, cartilaginis compressiōne pateretur.

Anulorum tracheæ substantia qualis.

Hanc membranulam si detrahas, protinus anuli diuulsi apparebunt, ac formam C nostri elementi præ se ferent. Iam verò simul iunguntur vestiente membrana, quam in acutissimo Anginæ affectu præscindere fortasse non ab re foret.

Anulorum figura detrahta membrana qualis.

In Angina quandoque se-

*canda mēbrana
inuēstiens an-
ulos tracheæ.
Asperæ arteriæ
progressus.*

Hic asperæ arteriæ ductus sub iugulis desinit, ubi duos in ramos scinditur, qui rursus in alios duos, itēque ij in alios, ac demū omnes per pulmonum substantiam disperguntur aërem inspiratum, ac expiratum deferentes.

De spinæ dorsi Cartilaginibus.

CAP. VI.

DORSI spina vertebrarū serie producitur, quarum corpora suprà, infrāque cartilaginibus crāssis committuntur. primam tamen vertebra excipito, quę corpore caret, nec vlla cartilagine donatur. Præstant autem huiusmodi cartilagines, vt laxior quodāmodo sit corporū vertebrarū inuicē facta articulatio, quo facilius antrorsum, retrorsum, & in utrūque latus flecti possint. Hæ vertebrarum corporibus latitudine respondent illorum superficiem æquantes. Ideo quemadmodum illa in descēsu magis agentur, ita quoque cartilagines maiores, crassiorēsque fiunt, vt grauiore ossium mole depressæ nō deficerent. Sub osse sacro, ubi Coccyx affigitur, cartilago similiter assidet ac prætereà inter primum, ac secundum eiusdem os interposita est, multa quidem illa, & præcipuē in mulieribus: quoniam dum pariunt, cauda ipsa versus posteriora trahitur, cū tamen in viris nunquā à sua sede dimoueat.

De Cartilagine quæ in superiore pectoris parte posita est. CAP. VII.

Situs.

SVMMVM sternum vtrinq; cartilaginem habet,

*Prima vertebra
dorsi cartilagi-
ne caret.*

*Cartilaginum
vertebr. usus.*

*Cartilag. ver-
tebr. figura.*

*Cartilago sub
sacro.*

*Cartilago inter
ossa coccygis.*

*Cur cartilago in
ter primum &
secundū os coc-
cygis in mulie-
ribus multa.*

habet, quatenus iugulorum annexum admit-
tit, quæ mobilis est vsus eisdem præstans, qua-
les in maxilla inferiore non abfimilem cartila-
ginem præstare diximus: quanquam non tam
pròpti, nec tã crebri sint hîc, quàm illic motus:
in magnis tamen vociferationibus, necnon in
deglutiendis cibis plurimùm inspirationi, atq;
expirationi conducit, dum pectus modò con-
trahitur, modò assurgit: ac demum totius bra-
chij motum expeditiorem efficit.

*Vsus cartilag.
mobilis in sum-
mitate sterni
multiplex.*

De Cartilagine medio pectore posita.

CAP. VIII.

INTER primum, & secundum os pectoris
cartilago quædam sita est, quæ mollis existit,
ac ligamèti vicem tenet, & idoneam motui ma-
gis superiorem partem reddit.

*Cur medij pe-
ctoris cartilago
mollis.*

De Costarum Cartilaginibus.

CAP. IX.

COSTIS quoque adnascuntur cartilagines
veluti appèdices quædam, quatenus solùm
partem anteriorem respiciunt, tam veris, quæ
pectoris ossi committuntur, quàm nothis costis
donatæ. In quib⁹ illud animaduertere est, quòd
breuioribus costis, breuioribus quoque cartilagi-
nes contigere: longioribus autem longiores.
Huc adde quòd superioribus rotundæ cartila-
gines, inferioribus verò non acutæ prominent.
Idque, vt costæ faciliùs pulmonis motum sub-
sequantur. Nam thorax semper attollitur, ac de-
primitur. qui motus etsi naturalis est, non adeò

*Costarum ve-
ræ, tum spuria
cartilaginem
habent.*

*Costis breuiori-
bus breuioribus
sunt cartilagi-
nes & è conuer-
so.*

*Cur varia sit fi-
gura cartilagi-
num costarum.*

*Cartilaginum
in thorace uti-
litates.*

*Thoracis motus
voluntarius est.*

*Costarum natu-
ra vsus.*

ramen liber esset, si vniuersa costarum substantia ossæa fuisset: nec præterea voluntarios thoracis motus, quales in emittenda voce contingunt, diu natura sustineret, nisi cartilaginum opera haud laboriosam pectoris dilatatione subministraret. Costæ autem nothæ amplius præstant, quòd turgescenti ex repletione ventriculo cedunt. quod munus haud est exiguum, cum ipsa compressio noxæ plurimum afferre possit.

De Scutiformi Cartilagine.

CAP. X.

*Imi pectoris car-
tilaginis figura.*

*Imi pectoris car-
tilaginis nomen
clatura.*

*Vsus mucrona-
ta cartilaginis
vulgo.*

*Vsus verus car-
tilaginis mucro-
nate.*

*Cur vulnus acce-
ptum in cartila-
gine mucronata
sit lethale.*

*Cartilago mu-
cronata non de-
cidit ut mulier-
culæ existimur.*

PECTORIS os, quod alio nomine sternon appellare cum aliis solemus, in ima sui parte cartilaginem habet triangulari forma: licet quâdoque quadrangularis, nonnunquâ bifida conspiciatur. Hanc nonnulli gladiolum, alij Scutiformem, seu scutalem cartilaginem, alij mucronatam vocant, Arabas sequentes malum granatum dixerunt. Græci $\pi\phi\phi\alpha\tilde{\nu}$ appellarunt. Hæc non ideo facta est, sicuti vulgo creditur, ut ventriculi os veluti propugnaculum tueatur: cum in sinistro latere ab hac cartilagine longè absit. Ceterum cordi præsidet, & septum transversum munit, quippe cui eius tēdo subnectitur. Quocirca lethale vulnus est, quod huic parti infligitur: quoniam natura cartilaginem hanc, tanquam scutum aliquod opposuit. Ea verò ira cōnata est imo pectori, ut non nisi summa vi diuelli possit. Quamobrem deridendi sunt, qui putant hanc nonnunquam decidere solere,

De

De Cartilagine Scapulæ, Coxendicis, ac Tibiæ
sinibus apposita. CAP. XI.

IN Scapulæ capite sinus est, cui Cartilago mobilis obducitur illius augēdi gratia. siquidem tanta esse non poterat in ea parte scapulæ moles, neque adeò profundo sinu, qui alto humeri capiti excipiendo sufficeret. Natura ergo hanc incrementi rationem excogitauit, ut altior profunditas illa fieret: ac miro artificio cōsultuit, ut ex cartilaginis mobilitate agilior esset articulatio: atq; etiam ex sinus altitudine difficilior humeri luxatio redderetur. Quæ licet rarò accidat, tamen non sine magno labore reparatur. Talem Cartilaginem offendas in coxendicis cauitate, cui oblongum, rotundumque femoris caput inseritur. Ea verò nusquam mobilis est, sed eam ob causam tantum parata, ut dicti sinus supercilia altius produceret, itaq; profunditas illa maior fieret: quando non tam altè coxendicis os ibi excuari poterat, quantum femoris capitis longitudo postulabat. Iam verò ab inferioribus femoris capitibus ad supremam tibiæ regionem binæ Cartilagines inueniuntur, altera interior, exterior altera, semicirculares, & introrsum perfractæ ad tuberculum illud desinentes, quod è media tibiæ superficie assurgit, ubi pariter annectuntur. factæ sunt, ut sinus in summa tibia hinc inde exculptos adaugerent, quò aptius imi femoris capita illis insererentur, nec tamen articuli motus impediretur.

Cartilaginis mobilis in sinu capitis scapulæ utilitates plures.

Humerus rarò luxatur.

Humeri luxatio difficile restituitur.

Cartilago in acetabulo coxendicis non est mobilis.

Vsus cartilaginis in sinu coxendicis.

Cartilagines due in inferioribus capitibus femoris.

Vsus earum.

De Cartilagine iuxta brachiale posita.

CAPVT XII.

Situs. **V**ERVM ad Brachiale veniamus, de quo post omoplatæ Cartilaginem statim dicendum fuerat. Iuxta stylum, qui ab extremo cubiti capite progignitur, quémq; falso Galenus voluit cum quarto Brachialis osse coarticulari, sicuti capite suo probauimus: apposita est Cartilago, quæ locum illum, alioqui vacuum implet, tum verò cauet, ne manus extrema, dum ad latus deducitur, in acutum illum processum impingat, atque eo modo non minimùm lædatur.

De Cartilagine sita inter pubis ossa.

CAP. XIII.

Cartilaginis inter ossa pubis substantia. & figura.

Vsus.

Ossa pubis aperiri in partu falsum est.

INTER pubis ossa tibi occurrit cartilago insignis pertinaciter inhærens, quæ parte superiore lata, & crassa in descensu paulatim immittitur, ac demum in acutum definit ibi enata, ut ossa hæc non secus, ac tenacissimū glutinum committeret, atque adeò connexa inuicem redderet, ut connata rectiùs, quàm coniuncta existimentur. Vnde superiore libro illorum opinionem reprobauimus, quos asserere minimè puduit in emittèdo fœtu ossa hæc reserari. quādoquidē dimoueri nullo modo posse nouimus: cum sæpe non modico labore nostro cultro diuidenda curauerimus.

De Articulorum Cartilaginibus. CAP. XIII.

DANTVR præterea articulis quibuscq; cartilagines, siue motus ex iis obscurus prodeat,

deat, seu manifestus. Cartilaginibus autem incrustata ossa ibi esse debuerunt læuibus, ac lubricis, ut faciliore motu cierentur, neque tamen ex mutua confractione attererentur. propterea videre est mucū superadditum, quo veluti pinguedine quadam articuli ipsi inungerentur, quemadmodum locis multis est superiore libro repetitum.

Cur ossa in articulis cartilagine incrustentur.

Cur in articulo- rum cartilagi- nibus adsit mu- cus quidam.

De Unguibus. CAP. XV.

QUANQUAM mediam quādam naturam inter ossa, & Cartilagines unguibus inesse nonnulli verè iudicarunt, quia neque ea duritie sunt, qualem in ossibus experimur, neque molles ita, ut Cartilagines, à quibus prætereà colore plurimū diffident: nihilominus hos cartilaginū tractationi adiunximus, cum ad ipsarum naturam propiū accedere videantur. Earum enim ritu mollissimam digitorum superficiem tuentur, ne ab extrinsecus occurrentibus lædantur: ac ideo firmamentum nō modicum ob sui duritiem præbent, apprehendendisque durioribus rebus vsui sunt pernecessario, cum interim flecti, & cedere parati sint, ut ne frangantur. Ungues tum à cute, tum à tendinibus musculorum extendentibus originem trahunt, quanquam tendines sub unguibus vsque ad digitorum extremitates deferantur. hīc enim postmodum dilatantur. Quamobrem perspicuum est, cur sub unguibus tam exquisitus sensus delitescat. quod ego primus obseruaui, &

Unguium natura qualis.

Unguium color diuersus à colore cartilaginū. Cur de unguibus agat post cartilagines. Unguium vsus.

Unguium origo.

Cur sub unguibus sit sensus exquisitus.

192 REAL. COLVMBI CREM.
excellentissimo Medico Alexandro de Ciuitate,
rei anatomicæ studiosissimo lubens ostendi.

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA.

Liber Tertius.

DE LIGAMENTIS.

Nomen.

Substantia.



LIGAMENTVM (vt à
nominibus interpreta-
tione exordiamur) à Græ-
cis σύνδεσμος, id est vin-
culum, appellatur. Sub-
stantia cōstat, dura qui-
dē, sed quæ tactui cedit,
& albicat. quæ durities

Situs in uniuersum.

Vsus.

Nominis interpretatio.

Cur ligamenta sensu careant.

minor etiam in eo est, q̃ in Cartilagine. ab osse
incipit, & in os desinit, præter quædā, vt priua-
tim magis suo loco explicabitur. Factū est igitur
ligamentū, vt mēbra nostra colliget, propterea-
que id nomē sortitum est. Dissoluti nanq; absq;
eo essemus, neque moueremur. Sed vt ad liga-
menti substātiā redeamus, licet neruea videat-
ur esse, est tamen sensus omnis expers, instar os-
sis & cartilaginis. qua in re miris laudibus extol-
lenda est naturæ prouidentia: nam si præditi
essent

essent sensu Syndesmi, cùm ossa mouerentur, non possemus nō laborare. Præterea genita sunt etiam ob musculorum productionem ligamenta, quemadmodum, adnotauimus, cùm de appendicum usu tractabamus. Nutriuntur autem tenui medulla: propterea inter ossa & appendicem natura collocauit ligamēta, vt suum ita ad sese commodiùs attraherent alimentum. Sed quamuis idem penè sit ligamentorum omnium situs, vt dixi in aliis, tamen plurimùm inter se differunt. nam ex iis alia crassa sunt, alia tenuia, alia magna, nonnulla parua, alia lata, angusta alia, quædam teretia, quædam verò minimè, & alia differentias diuersas sortita sunt, sicuti tunc expressiùs dicetur, cùm particularis eorum fiet distinctio. Quod vt ordine fiat, à capitis ligamentis initium faciemus. Est enim pars princeps caput, quidquid hæc de re sentiant philosophi.

Vsus alius ligamentorum.

Ligamentorum nutrimentum.

Ligamentorum differentia.

Caput est pars reliquarū princeps, quidquid dicant philosophantes.

De Capitis Ligamentis.

C A P. I.

A C A P I T I S igitur ossibus, maxillæq; superioris inter suturas, atque harmonias ligamenta exoriri videbis, tenuia quidem, sed lata: quæ præterquàm quòd hæc ossa vnà valido nexu vinciunt, ob eorum etiam musculorum originem facta sunt, quæ ab hisce partibus ortum ducūt, vt musculi tum faciei, tum inferioris maxillæ & oculares, quos omnes à suturis, aut harmoniis exoriri videbis.

Situs.

Vsu.

N

De Ligamentis caput cum duabus primis vertebris neſtentibus. CAP. II.

Articulatio capitis cum vertebra nobiliſſima eſt.

Cur ligamenta capitis cum vertebra primis valiſſima ſint

Capitis luxatio lethalis eſt.

In ſuſpenſis laqueo caput non laxatur.

Secunda vertebra facilius frangitur quàm luxetur.

Ioan. Fräciſcus Manfredus. Origo ligamenti huius.

Cur occipitium

CV M articulatio capitis cum vertebra nobilior, magis excellens maiorisq; momenti exiſtat, quàm reliquæ ſint articulationes, quid mirum ſi natura humano generi mater diuino ſpiritu afflata maiorem curam, diligentiamque in hac vna quàm in reliquis adhibuerit? Nā cū tanta moles, quanta caput eſſe cernitis, tam exiguis vertebrarū oſſibus connectenda foret, præter processus atq; in oſſibus cavitates ligamenta mediata eſt, eaque validiora quàm cætera omnia noſtri corporis. Cū enim articulatio hæc luxationem nullo pacto patiatur, eſt nanque capitis luxatio lethalis, curauit eiufmodi eſſe ligamenta quæ partes hæc adeò arctè fidelitèrque continerent, vt difficillima horum ſit luxatio. Licet vulgo exiſtiment in iis qui ſuſpendeduntur longamque literam ſuſpenſi efficiunt, caput luxari. quam ſententiam ego proſectò inanè eſſe falſamque deprehendi, neque ſemel duntaxat, ſed ſæpiùs Patavij, Piſis, Romæque. Tantū etenim eſſe huius ligamenti robur animaduerti, vt frangi faciliùs quàm luxari ſecūda vertebra poſſit, neque ſecūda ſolū, ſed prima quoque. quæ Ioannes Fräciſcus Manfredius excellens Medicus, anatomes ſtudioſus & familiaris meus non poteſt ſatis mirari. A baſi itaque occipitis ligamentum exoritur, quod vt meliùs aleretur ſtabiliùsque exiſteret, natura occipitium in pueris

ris multifidum genuit, ut huic stabilimentū esset
 maius. orbiculare est hoc vinculū, & deorsum
 descendens inter primam, secundamque verte-
 bram, non figitur, ut nonnulli sunt opinari, sed
 utrique circūquaque validissimè adhæreret, ita
 ut vel in mortuis ipsis difficillimè diuelli queat.
 adhæreret autem dictis ossibus antè retròque &
 ad latera. Præter descriptum à nobis hætenus
 ligamentum, adest aliud quoque validum satis,
 quod denti secundæ vertebræ validè adnectitur.
 præter hoc adest & tertium quod ab interiore
 primæ vertebræ parte, exortum secundæ dentem
 continet (dictū est autem in tractatu de ossibus
 de hoc dente) est teres, sed admirabili arte late-
 ra ipsius constructa sunt, ne dens cum caput ni-
 mis inclinandum est, spinalem medullam lēde-
 ret, quæ illac transit. Atque hoc se habent pacto
 ea ligamenta, quæ capitis motibus deseruiunt.
 Et quoniam nimis prolixi essemus, si de singulis
 vniuscuiusque articuli ligamenti priuatim tra-
 ctandi prouinciam susciperemus, propterea o-
 mnia capite vno comprehendemus, eaque præ-
 fertim quæ in re alia non discrepant inter sese,
 nisi quod hæc maiora sint, illa minora. idcirco
 maxillam inferiorem silentio præteribimus, de
 cuius ligamenti post capitis ligamenta tractan-
 dum foret. De aliis igitur agam quæ aliquo pa-
 cto differunt. Et quoniam scribit Gal. libro de
 Ossibus, vertebra medio proprio ligamēto nō
 coniungi, sed à tertia duntaxat tunica, quæ spi-

*fit in pueris
multifidum.*

Figura.

*Error quorundam
de situ.*

*Locus verus li-
gamenti huius.*

*Ligamentum
denti secundæ
vertebræ.*

*Ligamentum
tertium.*

*Vsus tertij liga-
menti.*

*Cur de singulis
ligamenti non
agis.*

Galeni error.

nalem medullam inuestit (quam tunicam mediam inquit inter vertebrae ferri, easque connectere) scito dictum hoc profectò tanto scriptore indignum esse. quo enim pacto illi verisimile videri poterat, vertebrae ossa non parua à tam exigua membranula, quæ est in vertebrarum foramine, qua spinalis medulla transit, contineri posse? Vfus autem verus membranulæ illius est, ne spinalis medulla ossibus immediatè occurreret, à quibus lædi faciliè potuit. ex qua re maximum incommodum non sequi non poterat. Sciendum itaque est vertebrae omnes (primas duas excipio) infra supraque appendicibus præditas esse, quemadmodum suo loco dictum est, è quibus valida exoriuntur ligamenta vertebrae inter sese colligantia, cartilaginemque inter vertebrae mediam detinent. Valida verò fuere satis, propterea quòd onus ingens vertebrae gestandum fuerat, & magnis validisque motibus resistendum. horum autem ligamentorum hic est deductus: ab inferiore scilicet secundæ vertebræ parte, ad coccygis usque extremum, circa cuius corpus sunt sita. ab eius transversis processibus alia insuper prodeunt ob musculorum & costarum compagem, à posteriori quoque alia emergunt, cum ut vertebrae nectant, una, tum ob nonnullorum musculorum exortum.

De Hyoidis ac linguae Ligamentis. CAP. III.

INTER ossa hyoides constituentia ligamenta transeunt ob linguae constructionem, à duobusque

Vfus verus membranulae quæ est in vertebrarum foramine.

Omnes vertebrae habent appendices primis duabus exceptis.

Ex appendicibus vertebrarum oriuntur ligamenta.

Cur ligamenta vertebrarum sint valida.

Deductus ligamentorum vertebrarum.

Vfus ligamentorum à transversis processibus.

búsque processibus maioribus duo proficiſcuntur, quibus ſummę linguę articulatur: Duo præterea alij à ſtyloïdibus exeunt, in duósq; minores hyoïdis processus immittuntur, idq; inſtar duarum catenarũ ſuſpenſum detineant quẽadmodũ Mahumetti arcam ferreã à magnetis vi attractam in aëre aiunt ſuſpendi. A deſt inſuper ſub lingua ligamentum, quod multis adhæret locis ad dentes vſque anteriores. hoc linguam attolli non ſinit, non ſinit labra exire, impedimentoque eſt ne loqui poſſimus, hoc eſt dearticulatas voces efferre, propterea hoc ſecamus, vt hæc impedimenta tollantur.

Duo ligamenta ſumma lingua.

Duo ligamenta os hyoides ſuſpenſum detinentia.

Mahumetti arca.

Ligamentum ſub lingua.

Cur in pueris ligamentum ſub lingua ſecetur ab obſetricibus

De Ligamento brachialis. CAP. IIII.

QVONIAM brachiale ligamētum ab alijs articulis diuerſum obtinuit, propterea de hoc ſeparatim agemus. Ligamentum igitur brachiali deſeruiens, oritur ab appendice inferiore cubiti radiique, cuius munus eſſe videtur, inſtar aliorum articularũ proſequi ad poſtbrachiale. ſed quia octo brachialis oſſa in duos diſtincta ſunt ordines, illi inter ea ingrediendum fuit, ne in motu è ſitu ſuo elaberentur. Prudens igitur natura ligamentum parauit validũ ſatis, quod hæc oſſicula ſubit, itaq; colligar, vt propriis motibus edendis idonea eſſe poſſint, ſed in appendicem oſſis poſtbrachialis tandem implanatur, deſeruitq; brachialis articulationi. In hac eadẽ regione alia adſunt ligamēta articulandis oſſibus minimẽ deſeruiencia, ſed illis duntaxat

Ortus.

Inſertio.

Ligamenta tendinum digitorum & extremitatis manus.

tendinibus continendis, qui cùm digitis tum extremæ manui famulantur: idq; ne dum mouentur hâc illac temerè ferrètur. In interno itaque brachiali ligamentum validum cernes, idq; transversum, quod tendines continet quarti, quinti, sextiq; musculorum digitos flectèrium.

Ligamenta tendinum musculorum extendentium unum videntur, sed sunt sex.

In externa verò sex ligamenta cernere est, tendines item extendentium musculorum continentia. Illudque maximè animaduertendū est, hæc quæ dixi ligamenta primo occurſu vnum videri. Verùm si tendines persequi accuratè nō grauaberis occurrent tibi sex ligamenta transversa à dictis duabus appendicibus ortum ducentia. Sed posteaquam ad hunc locum deuenimus, operæpretium facturus videor, si de iis ligamentis tractauero, quæ tendines continent per longitudinem digitorum. Animaduertendum itaque est ab internis ossibus digitorū à lateribus, iuxta eorum longitudinem adesse ligamenta, ad extremitatem tendinum vsque pertinentia, quæ hoc in loco prudenter natura collocavit, ne in flexione tendines extra ipsorum sedem attollerentur. propterea Galenus libro de vsu Partium aiebat ope tēdinum quinti musculi tertium internodium flectèrium primū quoque flecti, at rei veritatem lib. de Administrad. Sect. agnouit.

De ligamentis continentibus tendines per longitudinem digitorum.

Galenus erravit libro de vsu Part. sed errore agnoscit libro de Administrad. Sect.

De Ligamentis femoris, tibiæque. CAP. V.

IN articulo femoris cum osse coxendicis ilij, ac pubis, præter membraneum quidem vinculum,

culum, sed crassum, quod articulis omnibus commune est, ligamentum videbis teres ac longiusculum, quod cum à profundo acetabulo ortum ducat, in superius femoris caput insertum deperditur, idq; roboris ergo, quod dum hæc pars laxatur sæpenumerò disrumpitur: & quamvis os in locum pristinum redeat, luxatus tamen semper claudicat. hoc enim ligamentum impedimento est quominus ossa illa cohæreant. Inter capita item inferiora femoris, summamque tibiā in interiore parte genu adest ligamentum crassum, quod & ab eorum appendicibus exoritur, & in ea definit, constructum est autem ut has partes contineat. cum etenim his duobus articulis nullus in corpore maior existat, quid mirum si natura prudens hoc loco eiusmodi apposuit ligamenta, qualia nusquam apposuerat, præterquam inter caput & duas primas vertebra. cum ab hoc tertio ligamento discesseris ad est aliud, quod genu articulationē ferè circuit, sed hinc atque hinc genu rotulam ambit, à qua duntaxat detinetur. Imperiti complures opinantur id genus ligamenti teretis inter caput humeri, scapulamq; reperiri, sed mirè falluntur, quæ admodum qui sensu pollet experiri facile poterit.

*Cur quandoque
ager claudicat
licet luxatio co-
xendicis sit resti-
tuta.*

*Ligamentum
ambiens rotulā
genu.
Inter caput hu-
meri & scapulā
nullū adest ve-
res ligamentum.*

De Ligamento quod inter sacrum os & coxendicis situm est. C A P. VI.

QV A nates cernis, inter os sacrum, & coxendicis ligamentum adest, quod tantum non est teres. id autem oritur ab extremo osse

Origo.

N iiij

Vsus.

sacri,transuersumque desinit in acutam coxendixis partem, colligat hæc ossa, propterea que factum est vt colligata detineat, licet alter vsus adduci possit, vt scilicet maiori neruo qui in homine reperitur aditus pateat.

De Ligamentis transuersis in pede. CAP. VII.

*Sex ligamenta
extremi pedis
proportione re-
spondent liga-
mentis brachia-
lis exterioris.*

Vsus.

*Vsus ligamento-
rum qua pedis
digitis subsunt.*

IN extremi pedis articulo, inter ipsum tibiám, que & fibulam, præter id vinculû, quod iuncturis omnibus cômune est, sex alia conspiciuntur, qualia in exteriore brachiali cernebas. Vsus horum est, vt eos tendines contineat, qui extremo inseruiunt pedi, digitisque. qui nisi hîc tendines adessent, à suo situ nullo negotio dimouerentur. subsunt quoque pedis digitis ligamenta, quemadmodum digitis manus. Construxit autem ipsa natura, vt in officio continerét tendines illos, qui digitos flectunt, secundû inquam, tertiumque, internodium.

De Ligamento reliquorum articulorum.

CAPVT VIII.

*Quid commune sit omnibus
ligamentis.*

*Enumeratio
partium com-
plurium qua liga-
mentis prædita
sunt.*

ARTICVLIS omnibus ligamentum commune est. id verò ab osse vno ortum ducit: ab appendice nimirum, & in aliam desinit. Hæc verò in orbem amplectuntur, nec desunt alia laxiora, angustiora alia, iuxta ossium magnitudinem paruitatemque. Ideo hoc loci de omnibus ligamentis actum existimato, quæcunque thoracem vinciunt, scapulas, iugulæque, necnè inferiore maxillam, humerum, cubitû, digitos, fibulâ, tarsum, ossa pedij. quod si de ligamentis

ilij

ilij pubisq; interrogas, hæc ab aliis præterquam in motu non differre, respondebo.

De Ligamenti cubito, tibiæ, ac pubi appositis.

CAPVT IX.

INTER cubitum, radiûmque, inter tibiã, ac fibulã iuxta eorum longitudinẽ membranofum ligamentũ cernere est, quod inter horum ossium interualla firum est, cuius vtilitas est nõ modò vt vniat, ac vinciat, sed vt interiores musculos ab exterioribus distinguat. eodem se habent pacto vincula, quæ sunt in pubis foramine, nonum musculum à decimo diuidentia.

Ligamentum membranofum, vñus.

Ligamenti pubis vtilitas.

De Ligamento hepatis. CAP. X.

HEPAR duobus præcipuis ligamenti continetur, quorum alterũ dexteram, alterũ leuam partem respicit. Ex quibus sinistrũ dextero crassius admodum est. hæc septo transuerso hepatis adnectũt, ne deorsum sua mole ac pondere procumberet. Horum igitur ligamentorũ dexterum suspensorium vocitant, at sinistrum nullo peculiari nomine insignitur.

Duorum ligamentorum iecoris vñus.

Mediaſtinum, pericardium, pleura, peritonæum sunt membranae potius quàm ligamenta, iecoris ligamenta nõ sunt prorsus sensu destituta,

Locus admoneret vt de mediaſtino, pericardio, pleura, necnõ peritonæo, verba facerẽ. nam hæc quoq; sunt ligamenta: sed de his in tractatu de membranis sermonem reiicimus: quoniã si res ad viuũ secaretur, membranae sunt potiùs, quàm ligamenta, cũ hæc sensu aliquo sint prædita, quo vera ligamenta omnino carẽt, cũ à iecoris ligamẽtis disceſſeris. hæc enim sola inter ligamenta, non sunt prorsus sensus expertia.

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber quartus.

DE SCELETO,

Sceletus.



Sceletus descriptio.

AMPRIMUM omniū quid Sceleti nomine significetur, explicandum est. Sceletos igitur Græcis hominibus nihil aliud significat, quàm ossiū excicatorum cadauer, cuius inspectio non modò nostris, sed priscis etiam temporibus in usu extitit, quemadmodum ex Gal. primo de Administrandis Sectionibus colligere possumus, vbi historiam recitat, quo pacto ipse discendi cupiditate inflammatus, se in Alexandriam contulit, quo loco medici aderant, qui hanc humani corporis ossium compagem se docere profitebantur. Atque ibi duos sceletos suis oculis vidit, quorū alter suspensus pendebat a iubaribus expositus, quæ carnem, quibus ossa vestiuntur, vniuersam deuorauerāt ossibus relictis, quæ suis inuicem ligamentis detinebantur: alter verò in sepulchro iacebat, qui à Nili fluctibus vehabatur, tandēq;
ad

ad ripam fluminis appulit, vbi constitit, erantq;
 illius ligamenta exiccata. Sed profectò (pace
 Galeni dixerim) neuter horum ossium discipli-
 næ accommodari poterat. Nam in his duobus
 sceletis articuli omnes ossium ligamentorum
 velamine delitescere cogebantur: at absque ar-
 ticationum ossium exacta cognitione, imper-
 fecta est sceleti cognitio, & historia. quî enim
 scias, nunquid vlla adsit cavitas, tuber vllum:
 atque hæc omnia altiùs ne, an in superficie sita,
 fuscipiant ne an fuscipiantur: atq; alia id genus
 complura, quæ in ossium explicatione maximû
 docenti, discentiq; afferunt adiuumentum:
 quemadmodum ingenuè fassus est excellens
 Franciscus Frigimelica, cui ars medica multum
 debet. Is Patauij hominis sceletum suis cum li-
 gamentis calce detinebat, idq; in illius floren-
 rentissimæ Academiæ gratiâ, cui semper pro-
 desse studuit. Sed in sceleto propriis ligamen-
 tis iuncto non posse omnia disci doceriq; opti-
 mus vir cognouit. Sceletos itaque constare de-
 bet ex ossibus, quæ prius coquere, hoc est elixa-
 re maxima cura debes, quicunque sceleton do-
 mi parare studes: cura inquam magna in ossi-
 bus elixandis adhibenda est, ne processus, car-
 tilaginésq; in earum extremitatibus incrustante
 aliqua in parte lædantur. Cadauer autem, ex
 cuius ossibus sceletos construendus est, esto iu-
 uenis non obesus, statura pusilla potiùs, quàm
 procera. nam visu pulchrior euadet. hoc ca-

*Quomodo sce-
 letos parari de-
 beat.*

*Ex qua statura
 parandus scele-
 tos.*

*Observatio in
expoliando scilicet,*

Cranij scitio.

*Cartilagine pectoris ossi relin-
quenda.*

dauer, quale descripsimus, excoriandū primū est, deinde caro adimenda omnis, quoad ei fieri poterit, visceraque omnia interna abiicienda. Illud autem obseruandum est, vt dum fabricam hanc humani corporis expolias, aure diligēter adimas, seruésq; item nasi dimidium extremum illud scilicet narium, quod cartilaginofum existit: item palpebras, os hyoïdes dictum, laryngem vnā cum frustulo asperæ arteriæ. Postquam hæc omnia accuratè effeceris cranium secandum est, supercilia versus, idque propterea, quod cauitas in fronte latitās huiusmodi sectione detegetur. Cerebrum postmodum vnā cum membranis à cranio ita separandum est, vt interna caluariæ pars munda prorsus, atque sordium expers relinquatur. Deinde secundam vertebra à tertia omni industria separato. Deinde maxillam inferiorem adimito ea tamen lege, ne cartilaginem illam mobilem quæ inter caput, maxillamque inferiorem sita est, vel tantillum labefactes: hanc chartis seruato. Deinde costarum Cartilagine sensim: costis ipsis seiungito. Sinito tamen dictas cartilagine ossi pectoris adhærentes, neque vllō pacto diuellito. Extremas item costas, cū Cartilagine nō iungantur sterno, aliis adimes quoque Cartilagine suas, ac in papyro itidem ponas. Summa quoque diligentia adhibenda est, ne dum has vnā cum sterno eximis, duas mobiles Cartilagine lædas, quæ inter iugula, sternumque

númque sunt fixæ, quemadmodum de mobili Cartilagine, inter caput, maxillámque inferiorem paulò antè dicebamus. Illud autè de ster-
no cum Cartilaginibus meminisse oportet, hæc *Cartilagines nō sunt coquendæ*
in cacabum nō immitti. non enim coquuntur, sed soli exposita exiccantur, itaque seruantur.
larynx item, & hyoïdes os, & aures, & nares, & palpebræ eodem modo seruanda sunt separ-
atim. neque enim vllum ex his coquitur. Post-
quam hæc omnia absolueris, costas à corpore
vertebrarum paulatim diuelle, necnon ab eorū
transuersis processibus. quòd si in ossium scien-
tia parum versatus fueris, sinistras costas vnà
vincies, atq; à dextris semouebis. Dextras item
à sinistris separatas colligabis, ne misceantur,
idque ordine facies, vt primo primam, secun-
dam deinde, & tertiam successiue. Ablatis co-
stis, incipe eas Cartilagines amouere, quæ inter
vertebram, & vertebram sunt: idque gladio fa-
cito, cuius acies tenuis sit, & dictum, ac factum
incidat. Incisio verò ad corpus vertebrarum
perreptet. Caue tamen, ne ad illud ita acce-
das, vt appendices lædas, quæ non admodum
duræ existunt: itaque progredere vsque ad os-
sis sacri summum, easque Cartilagines chartis *Cartilagines fi-
lo excipiente
vel in chartis
seruanda.*
imponere, idque ordine facito, vel eas acu perfo-
ratas filo excipias. idem dictum puta de Carti-
lagine, quæ inter sacrum & coccygem sita est,
& inter ossa pubis. Quò verò ad dorsum per-
tinet, vniuersum in tres partes diuidito, & se-

*Appendices nō
lædenda.*

*Cartilagines fi-
lo excipiente
vel in chartis
seruanda.*

paratim colligito, vt in lebetē meliùs aptentur. His peractis, diligenter inspicere poteris, nunquid in acromio tertiū illud os adsit, quod Galenus in hominibus dūtaxat inueniri asseuerat, & scapulā ab humero separabis. Præterea circa scapulæ cōcauum, vbi cum humero articulatur, Cartilaginē illam tolles, quæ ibi à natura de industria apposita fuit, vt sinus ille profundior euaderet. Postmodum separabis humerum à cubito, rursus à cubito extremam manū. quod dum agis, animaduerte, obsecro, an styloïdes processus quartum os brachialis ingredia-
 tur (quemadmodum Galenus scriptū reliquit) necne, suspice quoq; supra styloïdem. nam mobilem ibi quoque Cartilaginē inuenies, quam chartis recludes, vt suprā. De aliis id genus sæpiùs admonuimus. Deinde femur à coxendice diuelles, & hoc etiam loco circa acetabulum mobilis tibi occurrēt Cartilago instar illius, quā circa scapulam obseruaueras. seiunges etiam à tibia femur. neq; hīc defunt duæ Cartilagines eæque mobiles à natura effictæ, atque efformatæ in eundem vsum, vt scilicet tibię cavitates amplificarent, atque attollerent, à quibus capita inferiora femoris suscipienda erāt. illud quoque meminisse oportet, patellam adhærentem relinquendam esse, ne sinistra, dextræque confundantur. Pōst deinde extremum pedem à tibia distinguito, & Cartilagines vel chartis recludito, vel filo, vt lubet, excipito. Idem agendum

*An quartum
 os brachialis u-
 niatur cum sty-
 loide.*

dum est, vt suprà attigi, de auribus, naribus, palpebris, hyoïde, larynge, & cartilaginibus omnibus, quas ademeris, & de sternone, quod nullo pacto aqua abluendum est. Reliqua in cacabū indes, ibique aliquandiu finito, vt molliora reddantur, & quod reliquum est carnis adhærens maceretur. bene abluto bis, tēque, & tunc rebello paruo perforabis caput superius, inferiusque tum humeri, tum cubiti, tum radij, tum femoris, tum tibiæ, tum fibulæ, ferrūmq; huic rei aptum per foramina dicta in horū ossium cauitatem immittes: idque, vt medulla vniuersa exeat, quæ rerenta ossa denigrat, deformioraque reddit, quod bonus Vesalius non animaduertit. neque enim omnia animaduertere magnus potuit anatomicus. Idem effcito in ossibus postbrachialis, digitorūque: idem in ossibus pedij, & iugulorū sternon versus, alio minori terebello hæc ossa terebrans in capite altero duntaxat. idque vt ex albis ossibus sceletos constet: neq; hisce foraminibus perexiguus sceletos turpitudinem accessuram esse verendū est. præ sui enim exiguitate conspicua non sunt: quod si conspiciantur ossibus omnibus simul iunctis alba cera, aut glutine ex caseo confecto, quo fabri lignarij vtuntur, dicta foramina diligenter obturato. Postquam ossa hæc, vt dixi, iterum laueris, in promptu habeas vas amplum æneum, quale pro familiæ lineis pannis è sordibus abstergendis domi habet matronæ. sit verò

*Ossa à medulla
rerenta deni-
grantur.*

Vesalijs inscitia.

*Qui ossa candi-
diora fiant.*

*Ossa elixanda
ut carne demu-
dantur.*

aqua feruenti plenum, in quā ossa (vt diximus) denudata, & distincta immerges. Hoc etenim pacto candidiora euadunt. Illud præterea diligens sceleti faber obseruare nullo negotio poterit, vt manus, pedesque linteis prius inuolutos in aquam immergat, ne articuli extremi, aut sesamina ossa pereant, confundanturue. tandiu verò bulliant, donec ab ossibus caro sponte decidat. nolim tamen carnem ab ossibus tam facile abscedere, vt appendices relaxentur. nam magnum tibi negotium crearet, appendices ita dissolutas suis ossibus denuò apponere. quod facilius eueniet, si adolescentuli cadauer supra dicto modo coquas. Separantur enim in hisce facilius ab ossibus appendices. Post hanc ossium elixationem partem caluariæ superiorē primo eximes, ne futuræ relaxentur. itaq; curam adhibe ne squamosæ futuræ separentur, neue pars superior temporalium ossium deperdatur, cum ab aqua eximenda ducis, lineos pannos paratos habeas crassiori filo textos, eosq; rudes adhuc, neque attritos vetustate, quibus ossa prædicta abstergas: deinde caput, costas exime, iugulæque, postea brachia, & crura, item manus, pedes, inferiorēque maxillam, postremò dorsum cum ossibus ilium. quæ ossa singula tibi per manus tradita tela exiccabis. Illud præterea ne obliuiscaris, quæso, vt dum ossa coquis, subinde spumam, & pinguedinem incitantem tollas: quæ tamen non sunt abiiciendæ, sed in vase condendæ.

*Pinguedo seruā-
da nec ossibus
velinquenda.*

cōdendæ. vbi verò coagulata videris pinguedinem, quæ spumæ subest, exime ab aqua, & serua. est enim pluribus in rebus hæc pinguedo perutilis. Exēpta ossa ab olla ænea, magna & summa diligentia mundāda sunt, cultro fabrefacto paruulo, cuius sit acies acerrima. Cauendūmq; est (vt suprā etiam attigimus) ne in cartilagine articulis incrustatas offendas. nam si has attigeris, hoc est, incideris, mox articuli fatiscunt, & dissoluuntur, hoc pacto, ne fœteant ossa. Fœterent autem, si aliquid carniū ossibus adhærens relinqueretur, in quibus denudādis accuratus admodum sis oportet. In separatione capitis à vertebris, quod nō ita facilè existimato, ob valida ligamenta, propterea sensim, atque oculatè progreditor, ne trāsuersum ligamentum in prima vertebra positum lædas: quod ligamentum dentem secundæ vertebræ cōtinet. Vertebrae ea, qua diximus, diligentia nudatas ordine ponito, funéque excipito, & in tabellæ vento, solique exposita tandiu detineto, donec exiccentur: id verò biduo fiet, plus minus, sed caue ne imbribus aspergantur. Brachiale cū exossas, id est ossa eius separare, & cartilaginibus exuere in animo habes, prius considera, quā difficilis sit tot ossium tam diuersa specie repositio. Quare si diffidis, satius est, minúsque absurdum, si relicto ligamēto, quo brachialis ossa continentur, illa in superficie deregas, vt ex pluribus ossibus constare liquidò constet: sed pe-

Ossa ne fœteant.

detentim hoc agito, ne hic ossium nexus, cuius colligationem reformidas, si nimis penetras, corruat. Eadem, vel paulò minor diligentia in tarso adhibenda est, dum hæc ossa sole, ventòq; exiccantur. quoniam temporis iactura maximi ab oprimo quoq; facienda est. Poteris interim gladiolo, qui nouaculam secando imitetur, aures, nares, palpebrásque excoriare, hyoïdis os, laryngem, sternon, atq; alias cartilagine à mēbranis liberare, & ligamentis: idque præsertim, vt sceleri fœtor inhibeat. Caueto etiam, ne dentes omnes decidât: immò verò da operam, ne vel vnus quidem decidat quod si exciderint, da operam vt in suum quisq; alueolum redeat, in promptúque habeas gluten ex recenti caseo, ex oui albumine, gypsoque recenti confectum, iráque struito, ne amplius labant. idem efficere poteris, si appendix aliqua è suis ossibus diuulsa concidisset. Non desunt, qui in ossibus cadaueris excoquendis pro sceleri fabrica calcem, cinerémque adhibeant, vt candidiora fiant, quod mihi non valde probatur. Vidi enim ossa nigrescere potius, quàm albefieri huiusmodi rebus. Neque illud aspernandum est, ossa dū coquuntur, nisi aqua continenter submersa detineantur, fumo infici solere. Dum hæc aguntur, ferrum corporis mole altius palmi dimidio (vt nunc Romæ loquuntur) fieri curabis, quòdque deorsum tres in partes diuisum sit, & eas perforatas, ascendátque crassiusculum

Gluten.

*Ossa ex calce,
aut cinere densa
data nigrescunt.*

*Instrumentum
in ossibus præpa-
randis commo-
dum.*

fiusculum ad ossis sacri inferiora. quod reliquū est ferri, tenuius esse debet, quo flecti possit, ut tibi ex usu erit. huius ferri basis erit tabella tragona, in cuius centro alia sit eminentior figura orbiculari, colore atra. ita enim elegatior esse videbitur sceleti situs, qui hisce tabulis clavis affixus detinebitur, cuius sceleti ossa ut elegantius connectas, tria ænei fili genera adsint, quæ per tenuius, & crassius inter se differant. quod æneum filum coquendum est, ut flexibilius reddatur, neque in connectendis ossibus tam facile disrumpatur. Forcipes quoque binæ parandæ sunt, quarum vna sit teres, ut filum illud æneum foraminibus immissum torqueas: alia verò incidat quod reliquum est. Acus item variæ ex optimo ferro parandæ sunt, ligneo manubrio exceptæ, quæ & perforare, & secare possint: hisce ossa, ut lubebit, perforato. Præterea animaduertendum est, si digitos rectos esse volueris, perforandos esse rectâ, ut à latere ad latus foramen penetret. quod si obliquus illorum situs tibi magis arrideat, obliquè perforato, ita ut infra magis distet ab ossis capite, quàm supra. Item qua forma voles, digitorum situm immutabis. A pedibus igitur initio sumpto, quatuor sesamina apponito, illis crura superpone: deinde femora. animaduertendum tamen est, inter tibiam, femurq; posterius perforandum esse inter duo capita inferiora femoris: necnon eminentiore parte capitis tibix, ubi

Quibus ossa connectenda.

Ferrum in os sacrum imponenda.

Crurium in scelerio flexio vitanda.

aderat ligamentum . Item ibi baculum appones, vt hoc fulcro præter æneum filum solidior sit connexus . Deinde os sacrum , coccygem, & lata ossa connectito , cartilaginésque apponito in genu circa acetabulum coxendicis inter ossa pubis , inter os sacrum, & coccygem. Antea verò quàm femur suo loces loco , imponendum ferrum est in os sacrum , suâque ossa coniuncta . quod si faciliùs efficere volueris , ossis sacri tertium , quartumue posteriùs perforato: fit verò foramen adeò patens , vt ferro excipièdo sat esse possit , quod postmodum foramen illud ingreditur , per quod spinalis medulla descendebat . Sistendum est autem, fulciendûmque , ne infra crurium altitudinem flectatur . nam crura flecterentur , quod turpe esset visu . Postquam stat ferrum , vt decet , crura , & pedes fige vario situ , ne suo loco labantur , atque exeant , fies autem voti compos , si sub calce, & pollicem perforaueris , & paruo clauo , æneóq; filo has partes ligneæ , quam suprà diximus, tabellæ affixeris. His optimè dispositis patellâ genu apponito . deinde quinque lumborum vertebrae cum suis Cartilaginibus sacro offi appone. Supra has tres extremas thoracis vertebrae, quibus suas costas necte , hoc est, earum corpori : quanquam decima ad transuersum processum accedit . deinde reliquas nouem transuersis vertebrarum processibus prius perforatis , vt costæ faciliùs aptentur , illisq; elegantius ad moueantur,

moueantur, quas prius anteriore in parte perforato, vbi cum Cartilaginibus vniuntur. Posterius autem non perforato antea, quàm meriariis, quàm singulæ perforandæ sint. sed prius vertebrae harum costarum in ferrum indito, ut dictis vertebrae superpositæ sint, & ex his à prima initio sumpto, æneum, quod diximus filum bis tæue circa eas, transuersosque processus vertito. Caue tamen ne hunc nexum arcus prius quàm sternon suo loco imposueris. Illud equidem nolim obliuiscaris, sceleti elegantiam, & venustatem in thoracis concinna figura, sitam esse, quam sphericam esse oportet. Id ut fiat facilius, inter sternon, ac vertebrarum corpus lignum impone, quo retrocedere, atque introrsum inclinare prohibeatur. Præterea animaduertendum est, nonnunquam Cartilagines nimis exiccatas esse: propterea minus cedere, quàm sit opus artifice sceleton componenti. quod si fiat, illas in tepidam aquam paulisper finito, tunc enim cedent. Deinde collum, caputque impone. sint verò ossa capitis, quod transuersim sectum fuerat, ut quæ in ipso continebantur auferri possent, vinculis excepta, ne corruant, in vertice, in futura recta, & labdalem versus. in sincipite autem foramen adsit, è quo exire ferrum possit. thorace, ut oportet, exiccato, adde iugula, scapulas, brachia, manusque: ita erit Dei ope sceletos absolutus. sed stude, ut iugulis, scapulæ, maxillæque inferiori

Venustas sceleti in quo consistat.

Ossa capitis in sceletro vinculis excipienda sunt.

suæ Cartilagines apponantur : item styloïdi inter ipsum , & brachiale. Pulchrior etiam videbitur sceletos si ex brachiis alter extendatur, flectatur alter: quod si mauis, scipionem manu gerat: vt lubet effcito, quem tabulę clauis affigito. Sceleti collo hæc suspendito , vt per thoracem pendeant , torquis instar, larynga , os hyoïdes, aures , nares , vngues , quas optimè perpolies, palpebras , ossa sesamina dicta , ossa , quæ sunt in naribus spongiosa , quæ dum internam nasi partem emundas , facîle decident. Tu verò caue , ne illa imprudens tanquam nullius pretij proiicias , vt Vesalio contigisse opinor , qui illa propterea non cognouit. Illud præterea memoria teneas, dum caluariam curas, qua aures sunt sitæ , id tanta industria , & diligentia effcito, vt ne officula auditus organo deseruiencia lædas , quæ pulcherrima visu sunt, & scitu digna. Ex his duo prima nullo negotio eximes , tertium verò non sine negotio : propterea caluaria sæpius manu concutienda est , vt eximi facilius possint . hæc vnà cum aliis, quæ paulò antè memorauimus, sceleti collo suspendes, ne quid desit eorum , quæ scire operæpretium est . quod si puelli sceleton parare cupias , caue diutius ossa coquas . nam ossium appendices facillimè relaxantur. Idem de similibus iuuenibus admonitum puta. Si sceleton non modò non fœtere cupis, sed bene olere, priusquam caluariam fericis ligulis vincias , cura, vt illa vincula muscum, & ambram

Vesalij infirmitas.

Sceletos puellis ossa non diu coquenda sunt.

Sceletos ut bene oleat.

bram optimè redoleant, aut re huiusmodi bene olente, vt magis libuerit. Filo æneo crassiori humerum scapulæ admouebis, cubitum humero, radio extremam manum, femur acetabulo, tibiam femori, tibiæ extremum pedem. Costas autem, vertebrásque mediocri æneo filo, vt digitos, & postbrachiale tenuiori. Deo verò Optimo Maximo sit honor, & gloria.

Modus in connectendo ossibus sceleti.

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber Quintus,

DE MUSCULIS.

Quid sit Musculus, ac de Musculorum differentiis.

CAPVT I.



MUSCULVS instrumentum est voluntarij motus, *Musculi descript.*

absque quo nihil in nobis est, quod voluntariè moueri possit. cōstructus autem est ex fibrosa carne, neruis, ligamentis, venis, arteriisque, & membra-

Quæ musculū constituent & quem usum ei quodque horū præfer.

na. carne quidem, vt qua corpus ipsius cōster, & moles: neruo, vt is virtutem motiuam defer-

O iiij

*Musculus unde
dicatur secun-
dum aliquorū
opinionem.*

*Varia musculo-
rum forma.*

*Musculos in tē-
dines desinere,
sed non omnes.*

rer, quæ à cerebro emanat : ligamento, vt sit va-
lidus, neq; in mouendo imbecillus : vena, vt ali-
possit : arteria, ne vitali calore destitueretur ;
membranæ verò munus hoc est, vt omnia hæc
cōplectens detineat, musculúm q; à musculo di-
stinguat. Musculum sunt qui à mure dictū pu-
tent, quòd musculi quidam muris figuram præ-
se ferant. nam illis caput tenue existit, venter
latus, cauda oblonga, angustaq; . nō desunt, qui
musculum lacertum vocent : quoniam lacerto
ipsi similis figura videatur. Alij pisci similē ma-
gis musculum autumant : propterea pisciculum
vocant. Sed profectò has formas in omnibus
musculis non comperies. nam aliqui lati admo-
dum sunt, alij trilateri, alij quadrilateri, alij orbi-
culares : sunt aliqui crassi, alij verò tenues, atque
exiles : breues alij, alij prolixi : aliis vnū dūtaxat
fibrarū genus cōtigit, aliis duo, tria aliis, & non-
nulli musculi omnibus fibrarū generibus mixtis
præditi sunt, quibus videtur intertexti. Musculi
in tendines, hoc est, chordas desinunt : sed non
omnes. multos nanq; tendine carētes videbis :
contrà quibusdam musculis tendo adest in ex-
ortu, quibusdā in medio : quamuis Galenus de
quarto duntaxat, maxillā inferiorem aperiente,
mentionem faciat, vbi illius tendinis occasione
capta miris laudibus naturam ipsam effert. sed
meminisse poterat bonus Galenus quarti quoq;
musculi, à quo hyoïdes deorsum trahitur, qu-
tendinem in media sui parte à natura benignè
suscipit.

fascipit, neque illi, quem tantopere Galenus extollit, ob hoc quicquam inuidet. Sed priusquam à musculorū tendinibus discedamus: nonnulli sunt, quibus vnicus inest tendo, aliquibus duo, trēsue, aut quatuor, quibusdam complures, vt longissimus dorsi musculus, necnon thoracis quintus: quidē longum, teretēque tendinem obtinent, alij teretem quidem, sed breuem: alijs tendo adest, tum oblongus, tum latus, alijs latus, & decurtatus: ita vt faciliē perspicias figurā musculorum, tendinūque ipsorum non vnica esse, sed multiplicē & variā, quemadmodum in vniuscuiusque musculi peculiari historia facilius quoque, & apertiūs discēs. Ortum ducūt ab ossibus musculi, atque in ossa desinunt, sed non omnes. nam aliquos cernere est non ab ossibus, sed à cartilaginibus exorientes. alij à mēbranis exoriuntur, & in membranas quoque finem habent. alij post exortū descendunt, ascendunt alij. quorundam situs transuersus est, quorundam verò obliquus. At exortus musculorū neque in omnibus eodem se habēt pacto. nam aliquorum oblongus, aliquorum autem brevis: his crassus, illis pertenuis: nonnullis carneus, alijs tendineus, licet non desint, quibus ex carne tendini mixta videatur origo. Ex musculorum tendinibus nōnulli perforati sunt, alij minimē, alij vnico foramine, alij pluribus donantur. Sed locus admonet, vt antequam ab hoc sermone discedo, doceam quid tēdinem, seu tendonem

Musculorū ortus, & terminatio.

Quid sit tendo. dicunt, chordámve, vt Arabes Anatomici. Tēdo igitur in musculo pars alba est, dura, densaq; & pellucida, quæ cū primū detecta est, visu pulcherrima est, ac spectatores in sui admirationem trahit. A neruo autem distat tendo, etsi magno quoque sensu præditum esse tendinem experientia facilè pateat, cū ipso laeso sæua accidentia consequantur. Si tendinem seces corpus solidum attrectabis, neruo verò cæso contrà seres habet. nam licet albicet neruus, tamen neq; adeò durus est, quemadmodum tendo, & rotundior est, neque adeò perlucet. quòd si incidatur, corpus multis funiculis intertextum, villòque circundatum videre videberis. Adnotandum insuper est musculos organa esse motus voluntarij, qui neruorum ope illis demandatur. Hæc etenim vis neruis à cerebro demàdatur, etsi Aristoteli secus videatur esse. Idcirco musculo cuique quamuis minimo neruus obtigit: immò & nerui quandoque. Cū ad musculū neruum ferri dico, non itelligo prope musculos neruos ferri, aut per illorum medium rectà præterire: sed per musculorum substantiam aio neruos disseminari: quanuis Vesalius parum in hoc Anatomicus sensui, rationique aduersetur, inquiens musculos complures carere neruo, & inter reliquos quadratū musculū prope brachiale, qui radium in pronum ducit. Ego verò huic quoque musculo inesse neruū asseuero adeò perspicuum, vt quiuis alter: neque difficilis est inuentu.

Differentia inter tendinē, & neruum.

Musculos esse instrumenta motus voluntarij. Musculos à neruis suscipere motum.

Neruos in musculorū substantia disseminari.

Vesalij error de neruorū in musculos distributione.

ru: idem de eo musculo dictum puta, qui latum tendinem efficit, deque aliis, quos Vesalius excipit. quod dum efficit, naturam irridere maluit, quam suam in hoc non obscuram negligentiam patefacere.

De Faciei Musculis. CAP. II.

FACIEM cum dicimus, eam corporis partem intelligimus, quæ capillos, mentumque interiacet, moueturque voluntario motu, maxilla inferiore immota. neque enim superiorem maxillam moueri nisi crocodilinam, teste Aristotele inuenies: licet ego psitaci utranque maxillam motu præditam esse primus obseruauerim. quin *Quæ pars facies appelleretur.* facies ipsa hominis mouetur quidem ad inferioris maxillæ motum, sed non primario, verum secundario motu. *Primus animaduerit superiorem psitaci maxillam moueri.*

De Musculis frontis. CAPVT III.

MUSCVLI igitur (ut ad rem redeamus) qui huic deferuiunt parti complures sunt. primi duo sunt, atque hi in fronte siti. exortus horum in superiore parte existit: in inferiore vero parte terminatur in communi sutura, quæ dirimit ossa capitis ab ossibus maxillæ superioris: quamuis nerui huic parti subiiciantur. Horum musculorum fibræ rectè neutiquam sunt, quæ admodum Vesalius asserit, sed obliquæ à summo scilicet naso tempora versus: eorumque motus est, ut supercilia attollantur, quanuis neque Galenus ille, de re medica rätopere meritis, neque Vesalius nostris temporibus magni vir no- *Musculi frontis.* *Vesalii error.* *Vesalii commendatio, eiusdem inscitia.*

minis in dissectione corporum, neq; alius ex his qui ante me scripsere agnouerint. Quòd si maiorem diligentiam adhibuissent, inuenire facile poterant. Hi duo musculi & vniuersam frõtem, & temporalium musculorum tantam partem occupant, quantum ipsi obliquè ascēdunt, præterquam media fronte, vbi nos curim contrahimus, corrugamúsque quoties vehementer commouemur, aut admiramur: adedò vt in multis sese supercilia mutuo contingant. Quæ cutis frontis contractio, si vnus hic esset duntaxat musculus, fieri nullo modo posset. hæc res, vt viros alios omittam minus notos, in fronte amplissimi Cardinalis Ardingelij, quem honori causa nomino, perspicuè videri poterat. cui ci sinister musculus ex his conuulsus esset ob vulnus, dimidiam frontem mouebat: reliqua motus expers relicta erat, sed mitto hoc, sensum ipsum si tu quoque consules, hoc haud dubiè nullo negotio comperies. nam si vniuersam fronticutem detraxeris, in media fronte nullum videbis musculum, nisi in summo naso, vbi dexter musculus cum sinistro ita coniungitur, vt vnus hoc loco musculus esse videatur, & vbi canosiores, quàm vsquam inueniuntur. & quò magis ascendunt hi musculi, eò tenuiores euadūt superciliáq; sursum trahuntur non ab his duntaxat, sed etiá duorum musculorum præsidio quos deinceps describemus, hætenus (vt opinor) anatomicis ignotos.

Duos esse frontis musculos & non tantum vnum.

Cardinalis Ardingelius, dimidiam frontem mouebat.

De duobus Musculis Nasi.

CAPVT IIII.

POST hos bini occurrūt nasum dilatantes, *Nasi musculi in uenti.*
 adhuc à nemine cogniti. nam etsi Galenus, alique de duobus musculis nasum dilatantibus meminerint, eos tamen cum labij superioris musculis confundere. Præter hos Vesalius duos descripsit nasum claudētes, quos interiore in parte esse vult, imaginationēque duntaxat intutus est. quo enim pacto oculis cernas, quod nusquā est? latas itaque nares reddētes musculi illi duo, *Nasi musculorū exortus, progressus, forma, & terminatio.*
 à supradicta oriuntur futura, estque exortus eorum acutus carnosusque, cum musculorū frontis fine permixtus, deorsumque tendentes latiores redduntur, & supra nasi ossa deferuntur, inque eius pinnis terminum habent, triangulusque penè efficitur, cuius duo sint latera oblonga, breue tertium, hi pinnae sursum trahunt, fibrasque rectas habent, itaque dilatant: illi verò, quos alij anatomici descripsere, portio sunt eorum musculorum, qui in superiore labro positi sunt, ut mox dicam. Clauditur nasus à musculis dicto labio opem ferentibus, non autem à propriis. *Quibus musculis nasus claudatur.*
 Nam quoties aliquid nobis per nares attrahendum est, superius labium cōstringere cogimur.

De Musculis latis in collo positis.

CAP. V.

DVO præterea alij sequuntur penè quadrati musculi in collo siti, quos Galenus lib. de Vsu Par. deque Anatom. Sect. se inuenisse exul-

Musculi lati in collo duo.

rat: qui labiis ancillantur, ea deorsum obliquè trahentes. Horum substantia membrana carnosissima est, à iugulorum regione, posteriorèque colli parte initium sumunt, eorúmque fibræ obliquè ascendunt, atq; eò tandem pertingunt, vbi cum superiore labro inferius iungitur. Quare cum hi lati muscoli faciei deseruiant, etsi in collo collocentur, tamen inter faciei musculos connumerandi sunt, qui cum mento plurimùm cohererent. atque in hoc oris apertioni videntur auxilium ferre.

De quatuor Musculis labiorum.

CAP. VI.

Quatuor labiorum muscoli.

QUATUOR labris famulatur muscoli, quatuor numero sunt, duo in superiore, totidem in inferiore. Superioribus quadruplex origo est. nam ab extrema sutura ossis iugalis exoriuntur, & ab ea, quæ primum os maxillæ superioris separat à tertio: reliqui duo ab osse malæ proficiuntur, omnesque obliquè versum labrum incedunt, quos inter vnus est, qui narium pinnae adhærescit, & propterea hunc musculum illum esse dicebant, qui nasum dilataret. Ego verò prædictorum labri musculorum portionem voco. Tamè ne pertinax esse videar, quod semper abhorui, si cui separare hunc libeat, & peculiaris muscoli loco esse ducere, id sibi per me liceat. quo concesso, quatuor erunt nasi muscoli, qui omnes ipsum dilatabunt. Reliqui duo labrum inferius constituentes, ab ea menti parte oriuntur,

Musculus ab aliquibus impetrè nasi appellatus.

Quatuor nasi muscoli.

tur, vbi quædam est in osse asperitas conspicua. Horum autem quatuor muscutorum fibræ variæ sunt, atque inter se commiscuntur, & implicantur. idcirco varios motus edunt, vt rectè Galenus adnotauit, & plerunque cum cute ipsa cõfunduntur. tamen si tibi musculosum corpus neque pingue, secandum obrigerit, atque diligenter excories, & eleganter, & perspicuè satis conspici poterunt. Accedunt dictis musculis alij duo buccarum, quos quidam oblitus est describere in magno quodâ volumine, de humani corporis dissectione. inter vtranque maxillam siti sunt, à gingiuísq; nascuntur, & in gingiuas desinunt. Quare vnde lubuerit initium sumas licet, vel suprà, vel infrà. nihil enim interest, satis tenues, & circuli in modum sunt, fibris variis intersecti, variisq; ob id muneribus funguntur. Sunt enim manui instar, quæ cibum nunc huc, nunc illuc propellant: neque sunt inter loquendũ inutiles, cùm exsufflare, vel inflare buccas volumus, hisque musculis tibiae, tubæque canenti non mediocris est utilitas.

Ex varietate fibrarum variatur motus.

Musculi buccarum duo.

Musculorum buccarum exortus, & finis confunduntur.

Musculorum buccarum multiplex usus.

De Musculus supercilium trahentibus.

CAP. VII.

BINI adhuc in lucem reuocandi sunt musculi, ab aliis negligentia præteriti, quos in capitulis posteriore parte licet animaduvertere, qui à lambdoïde futura supra māmillares processus oriuntur. triangulares sunt, & in carnosam membranam desinunt, quæ frontis etiam muscu-

Musculi supercilium trahentes à nullo adhuc cogniti.

*Musculorum su-
percilium tra-
hentium utili-
tas.*

los excipit, eorūque vtilitas non contemnen-
da hæc est, vt frontem, cutēque capitis poste-
riora versus abducant, vt ego millies non sine
voluptate contēplatus sum in capite præcellen-
tis viri præceptoris mei Ioannis Antonij Plati,
quē Lonigum nūc vocant. is enim cutem capi-
tis vniuersam validè mouet. Sed quid ego in a-
liis exēplar persequar cū domestica, vel inter-
na potiùs exēpla non desint? Ego quoq; is sum,
in quo cutē capitis manifestè moueri nullo ne-
gotio cernere posses, quippe qui caluus admo-
dum sim, absq; vlla cutis ariditate, sed mollitie
adeò laxa, vt nuper nati infantis cutē præferat.

De Palpebrarum Musculus. CAP. VIII.

*Musculi palpe-
brarum qui nu-
mero sunt sex.*

NON dubito, quin nostra de Musculis pal-
pebrarū historia grata omnibus futura sit,
cū illa, quæ hætenus ab aliis tractata sunt, pa-
rum sint cum re ipsa consentanea. Ego verò de-
di operam, quantum in me fuit, vt quàm verif-
simè describerentur. Musculi igitur palpebra-
rum sex numero sunt, tres nempe vtrinq;, quo-
rum duo extra orbitam oculorum, reliqui intrò
iuxta musculos oculorum sint siti, & propterea
omnes, qui ante me scripsere anatomici decepti
sunt, arbitantes hos nō palpebræ, sed oculis in-
feruire. Primi igitur orbiculares, fibras haben-
tes circulares quoque nascuntur in magno can-
tho, in futura communi capiti, & maxillæ supe-
riori, acuto principio, & sursum versus frontem
dilatantur, quo loco cum musculis frontis com-
miscuntur.

*Anatomicorū
error in palpe-
brarū musculus.*

miscentur. Postea versus aurem tendentes, quò magis prope minimum canthum accedunt, eò magis amplificantur, & deorsum circa orbitam reflectuntur, vt tãdem acuto fine iuxta initium terminentur. facti sunt, vt palpebras claudant, *Musculi oculos claudentes.* & validè astringant: vtq̃ue oculos ab externis iniuriis tueantur. Hos Vesalius diuisit in quatuor: sed vbi ipse carnem detraxit, carnosiores sunt, quàm in reliquo deductu. Secundi erunt duo musculi recti, lati, carnosi in superiore regione oculorũ, in interna orbita exorti ex nervo visorio, vt reliqui oculorũ musculi. Hi musculi latiusculo fine in supremã palpebram terminantur. facti sunt, vt trahant palpebram sursum, & oculum aperiant. Tertij musculi sunt tereti figura, & tenues, ex eodem loco nati, qui obliquè versus magnum canthũ in palpebra tereti ferè tendine finiuntur. in nonnullis quandoque portio huius tendinis in corneam inferitur. In his adiuuare videtur motũ oculi sursum: attamen geniti sunt ob hunc vsum præcipuè, vt palpebrã trahant, & oculos aperiãt, qui vsus, & situs cùm in brutis quoque idem sit, nō possum non mirari, quo pacto Galenus, Vesalius, ceterique Anatomici hos quatuor musculos palpebre deseruiantes, inter musculos oculorum numerarint, decepti fortè, quòd in orbita eorum siti sunt. *Musculi palpebram trahentes.* *Gal. Vesa. ceterorumque anatomicorum casus.*

De Oculorum Musculis. CAP. IX.

EGO hīc diligentem lectorem postulo. nam *Oculorum Musculi.*

*Oculorū motus
arbitrarij.*

*Qui propriè o-
culorū muscoli
connumerandi.*

*Quo pacto ocu-
lorum muscoli
se habeant ad
motus.*

*Qui circularis
motus fiat.*

*Quintus mu-
sculus oculi nūc
primū inuen-
tus.*

de parte nostri corporis nobilissima agendum est, cuius cognitio & necessaria nobis est, & per-
iucunda. Oculi igitur arbitrario motu cientur
nunc sursum, nunc deorsum, nunc dextrorsum,
nunc sinistrorsum, nunc in orbem. Galenus Ve-
saliusque, & Anatomici alij, qui omnes bellui-
num oculū describere, oculorū musculos qua-
tuordecim describere, ut septem in vnoquoq;
oculo collocarent. Ego verò decem musculos
in oculis pono, quinque scilicet in utroque. qua-
tuor enim illi eodem in loco positi muscoli, qui
aperiendæ palpebræ conducunt, nequaquam
sunt inter oculi musculos adnumerandi. Qua-
tuor habes deinde oblongos musculos, qui ver-
sus radicem visorij nerui emergunt, rectasq; ha-
bent fibras, & in nervosas tenuitates desinunt,
& membranæ corneæ in orbem adnectuntur a-
liam membranam constituentes, quæ ad iridem
non pertingit. Positi sunt instar quatuor angu-
lorum, quorum duo suprà sunt, alij infrà. hi vel
sursum, vel deorsum, vel à dextris, vel à sinistris
trahunt, cum scilicet quilibet ex his seorsum o-
peratur, vel duo simul. at si omnes vnà subse-
quenti motu operentur, motus efficitur circularis,
quod nouum dictum vobis nullo pacto vi-
deri debet, cum idem fiat à quatuor musculis
brachiali seruientibus. Præterea facti etiam sunt,
ut sistant oculum, quādo scilicet vno, & eodem
tempore operantur. Quintus oculi musculus,
quem ego primus inueni, atque è rei natura de-
scribam,

scribam, ita habet. Situs est sub aliis quatuor oculi musculis, & inter hunc, atque illos pinguedo intercedit: situ transuerso locatur, & oculi medietatem complectitur: oritur à cornea membrana, atq; in eandem desinit, adeò vt qui finis eius sit, quíue exortus, non ita facíle inuenias. Hunc ego musculum admirabilem iudico. nam ab oculo incipit, atque in eundem desinit, propterea difficile dictu est, quis sit huius quinti musculi proprius motus. Si à nervis musculorū initia proficiscerentur, dicere auderem eius originem verè in medio esse. ibi enim ramus à secundo neruorum cerebri coniugio ingreditur insignis, crassusque fatis, si cum musculo cōferatur, quem neruum fateor me quandoque suspicatu fuisse huius musculi tendinem esse. Hunc neruum si attrahas, oculus sursum vertitur, & circūagitur, quamuis musculus subsit. fortè hic fuit vsus huius musculi admirabilis, vt eius auxilio cælum, diuinæque maiestatis fabricam intreremur, ad quod nati sumus. ad quod peragendum non paruo est hic neruus adiumento. Hic idem musculus, quem describimus, à latere (sed siue latus, siue finē, siue initium dicas nihil nunc refert) tendine latiusculo præditus est, quo adharescit corneæ. Equidem magnum aliquem naturæ arcanorum perscrutatoremi mihi nunc dari exoptarem, à quo huiusce pulcherrimi musculi vtilitatem edoceret: mihi nunc sat erit musculum inuenisse, & descripsisse. de humanis

Quinti musculi motus coniecturalis cognitio.

*Gal. & Ves. bel-
mini, nō humani
oculis anatomen
assequutos esse.*

nunc loquor. Vesalius enim & Galenus oculi musculos belluinos, non humanos descripsisse scire poterit, quicumque eorum historias cum ipsa conferre non grauabitur. Inter hos, & alie quatuor pinguedinem licet cernere, quemadmodum inter hunc, & visorium neruum: ^{nullo} illum musculum in hominis oculo modo reperias, quem Galenus, Vesalius, atque alij descripsere, qui ab his nunc primo nunc septimo locum connumeratur, & in tres, pluresque musculos diuidi potest: quem tamen, ut ipsi eleganter descripsere, in boue, equo, veruece, & aliis quadrupedibus facile inuenias. hic musculus in brutis inuentus iuxta ipsos oculum sistit, quo munere in homine illi quatuor primi tunc funguntur, cum omnes eodem tempore agere desistunt quietique permanent.

De Musculis Aurium. CAP. X.

Aurium Musculi.

Ego musculos aures mouentes non describo. nam raro, imò quàm rarissimè inueniuntur: in quodam tamen ego musculum offendi qui à buccis nascitur, & in auris pinnam definit, eamque mouet voluntariè versus anteriora quandoque etiam alium vidi musculum in posteriori parte à māmillari processu proficiscentem: sed hi duo vltimi, in brutis semper conspiciuntur, in homine perrarè.

*Aurium musculi
in homine raro
dari.*

De Musculis Maxillæ inferioris. CAP. XI.

*Maxilla inferioris
musculi.*

INFERIOR maxilla hominis ob faciei rotunditatem breuissima facta est, cui tres voluntarij

luntarij motus contingere. aperitur enim, clauditur, & in circulum agitur, Musculi ipsius quatuor vtrinque sunt. Prior ex his temporalis musculus nuncupatur, validus, robustus, nobilisque admodum, propterea quod cerebro proximus est, & varios habet nervos insertos. atque idcirco diuinus Hippocrates in libro de Vulneribus Cap. dextro tempore, inquit, vulnerato, sinistrum conuelliur. quare natura non iniuria tanta vsa est in hoc musculo diligentia. Oritur igitur à primo maxillæ superioris osse à cuneali, à fronte, à sincipite, & ab osse temporum lapidoide dicto, partemque capitis lateralem occupat vsque ad posteriorem auris partem, & superiorē etiam, per tres digiti apices. Initium eius latum est, & semicircularē; & licet initium, vt dixi, latum sit, tamen in acutum desinit, in validumque tendinē, qui in acutum illum maxillæ inferioris processum immittitur, quem coronon appellant, qui tendo altiusculè satis, & intrinsecus incipit. Alius etiam est membranofus tendo, qui musculum parte exteriorē liuidum reddit, deferiturque sub osse iugali. huius officium vnum duntaxat est, claudere scilicet maxillam inferiorem: neq; triplex est, vt somniauit quidam, qui Galenum (pace illius dixerim) hisce in locis parum intellexit. Fibræ eius eiusmodi sunt à circumferentia ad centrum progredientes, quæ chirurgis acuratè sunt animaduertendæ, dum vulnera dilatant, & abscessus hanc partem infe-

*Tres motus voluntarij inferioris maxillæ.
Temporalis musculus.*

Coronon processus.

Cautio in temporum chirurgia.

Musculus in ore latitans.

stantes secant, ne fibras transversim incidant, nam si ita fieret, usus ipsarum cessaret, quo amoto vita deficeret: & quoniam claudendi motus, resque duras effringendi robore eger, natura sagax præter temporalem, alium effinxit musculum in ore latitantem. (ita enim Galenus appellat, & rectè) qui validus est satis, & ab ea cavitate exoritur, quæ posita est in alis cunealis ossis, & terminum habet in interiore maxillæ inferioris parte, ubi asperitas est eius fibræ rectæ sunt, tendinemque satis validum habet, qui eodem officio fungitur, quo temporalis, & crassus, bre-

Musculus masticatores & mandibularis dictus.

visq; existit. Tertius musculus is est, quem masticatorem, siue mandibularium nominant, qui maxillam inferiorem in circulum agit. nascitur à iugali, & à primo maxillæ superioris osse, non autem à quarta, & tertia vertebra colli, quemadmodum voluit Galenus. originem habet tendinosam, carnosamque, terminum verò in inferiore maxilla penè triangularem. adhæret insuper acuto ipsius processui, ubi cum temporali coniunctus videtur esse. Quamobrem excusari

Galenus error.

non potest magnus Galenus, qui in nonnullis locis scriptum reliquit, temporalem musculum tendinem habere in medio sui utrinque partem carneam. fibras habet diuersas, atq; ob id maxillam mouet antè, retrò, in latera, & in orbem,

Musculus quartus os aperiens.

crassusque est satis. Quartus musculus os, & maxillam aperit, & est admodum elegans, cum duos carnosos ventres sortitus sit, initium minimum & finem.

& finem: nam media eius pars tendinosa est. Ortum ducit carnosum à styloïde processu, defertur sub maxilla, & sub aure: rotundæ, oblongæque simul figuræ particeps existit, neque est admodum crassus: carnea substantia in medium mentum definit, vbi asperitas quædam interior cernitur. Hunc natura adeo crassum non constituit, ut illos quibus claudendi partes delegavit. Maxillæ enim cum suapte natura penè gravis sit, duobus illis musculis, quos superius utrinque sitos dixi, relaxatis deorsum inclinatur, propterea exiguus musculo cõtenta fuit. at mediam partem tendinis instar effingit, ut ne maius spatium occuparet. Locus enim angustus admodum erat, in quo multa erant organa collocanda.

De Musculis ossis Hyoïdis, cuius ossis, & eius musculorum descriptio in nonnullis, qui scripserunt, desideratur. CAP. XII.

OS hyoïdes ab octo musculis mouetur, à quatuor scilicet utrinque qui primus occurrit, carnosus est, tenuis, rectus, qui ab interna summitate ossis, quod sternon dicitur, exoritur. Iter eius est super asperam arteriam, & laryngem, & in inferiore parte dicti ossis absque tendine terminatur, fibras rectas habet, & deorsum recta trahit. Secundus in ordine à mento exit, atque in hyoïdis partem superiorem finit, expertus est tendinis, sed carnosus totus fibris rectis recta sursum ducit, motumque oppositum facit

Musculi ossis hyoïdis.

Primus hyoïdis musculus.

Secundus Musculus hyoïdis.

*Tertius hyoïdis
musculus.*

*Quartus hyoï-
di musculus.*

Galenus error.

*Musculi lin-
guæ.*

Linguæ usus.

illi, quem proximè memoravi Tertius muscu-
lus subtilis est, & parvus, qui à styloïde processu
oritur, & in laterales partes hyoïdis definit. situ
est obliquo. partes huic demandatę sunt sursum
attrahendi. Quartus verò musculus à parte su-
periore scapulę ortum ducit, & obliquè sub se-
ptimo capitis musculo sursum ascendit: subtilis
quidem est, & longus, tamen neque prolixior
est, neque gracilior musculis aliis, vt Leonardo
Fuchsio visum est. Terminatur in partibus hyoï-
dis lateralibus. tendo illi in medio obtrigit, quę-
admodum quarto inferioris maxillę musculo:
licet Gal. in x i. de Vsu Part. asserat illum ten-
dinem in medio habuisse, prætereà neminem,
atque hanc ob rem naturam adèò admirabatur,
& extollebat, quę in eo musculo rarū quiddam
effecerit, quod aliis denegarit. Hoc equidē non
negauerim, huius, quem nunc describimus, mu-
sculi tendinem adèò longum nō esse. Vsus eius
est, vt hyoïdem deorsum obliquè trahat motu
opposito illi, quem tertius edebat musculus. Ga-
lenus libro de musculis, hunc voluit scapulam
attollere, cū parum animaduertisset fieri non
posse, vt tam tenuis musculus ab hyoïde exor-
tus, vt ipse voluit, quod os mobile est, ingens
illud scapulę pondus attraheret, atq; attolleret.

De Linguae Musculis. CAP. xiii.

LINGVA organum est, quod multas nobis
præbet utilitates. nam & edendo, & biben-
do, & loquendo nobis præstò est lingua. gu-
standisque

standisq; saponibus opportuna . Huius situm neminem arbitror ignorare : eius figura oblonga est , lata magis , quàm profunda , in radice , quàm in fine crassior , quod à natura lógè prospiciente idcirco factum est , quoniam velociter undique mouēda erat . Quocirca nouem musculis prædita fuit , præter substantiam ipsius peculiarem , quæ cùm mollis sit , rara spongiæ instat , confusâque carne , inter musculos adnumeranda non videtur : etsi alia ratione , quòd voluntate iubēte moueatur , nō videatur à musculorum numero seiungenda . Quod si fiat , duo musculi nouem prædictis addendi sunt . nam videntur esse duo musculi , cùm lingua candidam lineam in medio habeat , quæ dextram partem à sinistra distinguit , sub qua ligamentum est , quod infantibus sæpe incidendum est , eo quòd locutioni impedimento sit . Igitur duo prædicti musculi à basi ossis hyoïdis emergunt , atque in summam linguam desinunt . Omne fibrarum genus habent adeò intertextum , vt aliud ab alio seiungi nequeat , veluti in aliis musculis seiungitur . Ambit linguam tunica quædam , in quam quartum par neruorum cerebri inseritur , quos natura gustui præcipuè destinauit , eorûmque pars ad palati tunicam tēdit , vt suo loco dicemus . quæ tunica tum huic , tum œsophago , tum laryngi communis est . Tertium verò , & quartum linguæ musculū cæteri anatomici nō cognouere , tu verò , si diligēter secueris , horum

Musculi linguæ nouem , vel vt aliqui volunt undecim.

Ligamentū linguæ in infantibus incidendum.

Duo musculi linguæ attributi.

Tunica linguæ ambiens . Vnde lingua habet gustus sensum.

Tertius & quartus linguæ musculi alius ignoti.

exortum medio in mento cōspicaberis, vbi duæ
 adsunt asperitates, quæ rectà ad linguæ radicem
 proficiscuntur . fibræ ipsorum rectæ sunt , ipsi
 muscoli teretes . ad hos musculos spectat, lin-
 guam extra dentes, & labia exerere . neq; enim
 naturæ miraculo nullius ope muscoli lingua exe-
 ritur, vt nonnulli credidere. Quintus autem, &
 sextus cū à styloïde oriantur processu , graci-
 lesque sint : in linguæ radicem & ipsi desinunt:
 sed in ipsius lateribus . Horum vsum si quæris,
 hic est, vt cū vtérque operatur linguam ver-
 sus seipsos ducant, cū verò alter tantū mo-
 uet, sursum in latus trahat . Septimus, & octa-
 uus egrediuntur è processibus ossis hyoïdis , &
 in linguæ lateribus inserūtur eam deorsum tra-
 hentes . At nonus, decimúsq; nascuntur à ma-
 xilla , & in latera desinunt . munus horum est,
 nunc huc, nūc illic impellere, cū mandimus,
 aut deglutimus . Postremum musculum carnis
 pinguedinis , gládulæque confusam miscellam
 rectiùs diceremus, quàm verè musculum. posi-
 tus est in radice linguæ : esui suavis admodum
 est, ductúsque ipsius est ab hyoïde osse. Nihilo
 fecius, posteaquam cæteri , qui ante nos de hac
 materia scripsere , inter musculos descripsere,
 nos quoque musculum appellemus , ne confu-
 sioni locus relinquatur : quod esset , si eandem
 partem, quam alij musculum vocant, nos mus-
 culum esse inficiaremur. Equidem, ingenuè fa-
 teor , cū hæc particula in humano corpore
 perexigua

*Quintus, & sex-
 tus linguæ mu-
 sculi.*

*Septimus & o-
 ctavus linguæ
 musculi.
 Nonus, ac deci-
 mus linguæ mu-
 sculi.*

*Vndecimus ac
 postremus lin-
 guæ musculus.*

perexigua sit, & nullius ferè pretij, huius ne meminisse quidem, cùm ad alia magis necessaria nostra festinet oratio, vt huic perutili historix finem aliquando imponamus. Itaque præter *Linguam consistentia.* musculos vndecim, quos suprà memorauimus, & præter neruos, & ligamenta, & membranam, adhuc restant venæ, arteriæ, duoque alij nerui, quos septima coniugatio gignit, qui huic parti motus gratia addicti sunt, cùmque eorum situs in inferiore parte collocetur, summopere cauedum ne vnà cum ligamento, quoties excindendum est, hi quoque ab imperitis incidantur.

In ligamento linguae abscindendo quid cauedum.

De Musculus laryngis. CAP. XIII.

LARYNX caput est asperæ arteriæ, estque *Laryngis musculus.* instrumentum, in quo primo vox effingitur, quod rerum omnium opifex Deus admirabili arte composuit. Hæc in faucibus sub lingua, & hyoïde ossè collocatur, cuius ossa, & cartilagine cum superius suo loco descripsimus, reliquum est, vt nunc de eiusdem musculis agamus, nosque humani laryngis musculos, non belluini describemus, vt Galenus, & post illum Vesalius descripserunt: ne erres. De quo Vesalio ego profectò non possum non satis mirari, quo pacto, cùm is Galenum nunquã non laceffat, reprehendatque, quòd simias, & bruta, non homines secuerit: ipse tamen in hoc ridiculus reprehensor belluæ laryngem, non hominis depinxerit, neque admonuerit. Quod ipse fortè effecit, propterea quòd larynx bestia-

Larynx quid sit.
Vox ubi primo efformetur.

Gal. de Ves. belluini, non humanum laryngem scripsisse.

Vesalius ridiculus Gale. reprehensor.

*Quare ab aliis
differat de la-
rynge.*

*Musculus la-
ryngis non vi-
ginti ut aliqui
voluit, sed qua-
tuordecim verè
esse.*

*Primi duo la-
ryngis muscoli.*

*Musculi secūdi
laryngis.*

rum, cū multò maior sit, quàm humanus, cō-
modior sectio fieri potuit: quod non modò in
larynge, sed in oculis etiam egit bonus Vesalius
vt magis admirere. sed ad rem redeamus. Pro-
fectò humanus larynx exiguus satis est, & ob
hoc secatu difficilis. Quamobrem ne mireris,
si cū cæteri de belluino larynge, ego verò de
humano loquar, ab aliis non parum dissensero.
neq; enim vt optimos alioqui viros oppugnem,
sed vt errores veritate duce, quoad eius fieri po-
terit, tollam, ab eorum opinione in hoc præfer-
tim argumento cogor abscedere. Laryngis ita-
que musculos alij viginti statuunt, octo scili-
cet communes, proprios duodecim. Ego verò
quatuordecim esse affirmo, quorum quinque
communes sunt, proprij reliqui. Priores duo
communes (ita dicti, quòd aliunde cū orian-
tur, huc tamen desinūt) à summo pectore ena-
scuntur, vnde duo primi hyoïdis musculi ortū
ducunt: carnosi vbique sunt tendinis expertes,
principio acuto præditi: incessus ipsorum est su-
per arteriam asperam, inferunturque in inferio-
rem partem duorū ossium scuti imaginem re-
ferentium, deorsum trahendo: apprimè vtilis
sunt, quòd dum agunt, infrà quidem astringūt,
suprà verò laryngem dilatant. Secundi à late-
ribus hyoïdis proficiscuntur, ipsi quoque car-
nosi, terminus ipsorum propè priores accedit,
fibræ his rectæ similiter contigere: ab his infe-
rior pars dilatatur, constringitur superior, con-
trario

trario prioribus motu laryngem sursum attol-
lunt. Ex his, quos cōmunes dixi, vltimus mu-
sculus œsophagum complectitur, opemq; cibi
& potus deglutioni præstat. Oritur ab oīsiū
scutiformium lateribus, & transuersas fibras se-
micirculum imitātes est nactus, quibus partem
lateralem laryngis coarctat. Hic musculus me-
iudice, vnus est duntaxat, non duo, vt Galenus
& cum Galeno Vesalius existimauere qui cū
hoc diligenter considerauerint, arbitrati sunt
hos exoriri à parte posteriore œsophagi, qui mē-
branofus, mollisque est, volūntq; vt laryngem,
rem duram, ac grauem attrahat. Quare nihil
est in hoc, quod eos excusē, cū absurdum
maximum consequatur, si eos musculos illinc
proficisci dixerimus. Quòd si vel fibras ipsas
diligenter intueberis, perpetuas illas, non diui-
sas inuenies. Vesalius binos alios musculos cō-
munes describit, quos inquit enasci à parte hy-
oīdis interna, atq; in Epiglottidem inferi, quos
in boue, bubulo, & eiusmodi animātib; haud
dubiè inuenire poteris: sed in homine nequa-
quam, quamuis perdiligens, & accuratus in se-
cando fueris: & ita si octo communibus, quos
appellant, tres detraxeris, quinq; erunt reliqui.
Proprij nouem sunt, ita dicti quòd à larynge
proficiscuntur, & in eandem desinunt, & huic
vni seruiūt. facti sunt hac vna de causa, vt glot-
tidem aperiant, claudāntque. Est autem glottis
rima oblonga in media larynge posita, de qua

*Musculus œso-
phagum comple-
ctens.*

*Opinio diuersa
ab opinione Ga-
leni, & Vesalij.*

*Musculos binos
laryngis & Ve-
salij descriptos
in homine non
dari.*

*Musculi nouem
laryngis, qui
ipsius proprij di-
cuntur.
Glottis quid,
& ubi sit.*

Ex nouem musculis laryngis unde duo primi exoriantur. Os anulare.

Vesalij error de duobus primis laryngis musculis.

Musculi versus suorum exortum operantur.

Galenus inquit, similem substantiam in animali nō inueniri. Ex his nouem musculis duo primi ab eo osse prodeunt, quod ego anulare appello, reliqui à Cartilagine innominata. exigui sunt, fibrásque habent obliquas, & in ossiū scutiformium inferiore parte finem habent. Vfus ipsorum est, partem inferiorem rectè constringere, superiorem dilatando. neque hoc motus contrarij loco censendum est. nam ossa dura sunt, quòd si infrà constringas, suprà dilatari consequitur. idem in brutis faciūt scutiformes cartilagine. Ex his autem musculis alterum dextrum, sinistrum alterum cōperias, licet Vesalius quatuor hoc loco proprios musculos describat, quorum primos à scutali Cartilagine oriri arbitratur, & in innominatam desinere. Quamobrem nequeo satis mirari, quoniam innominata motu caret, idcirco hi duo musculi, si adescent, ex ipsius sententia illā omnino mouerent. musculi nanque versus suum exortum operantur. Hi quatuor musculi, teste eodē, intercostalibus similes sunt, inquit ipse. quod ita falsum est, vt neque in homine, sed ne in brutis quidem inueniri possit. Secundi verò illi musculi in posteriore parte cēphagum versus collocati, prolixi sunt, & perspicuitatem nescio quàm prae se ferunt: oriuntur carnosa deriuatione à posteriore, lateralique parte anularis ossis, rectaque in quartum, & quintum os per tendinem finiunt, hoc est inferiore in parte, vbi
cum

cum tertio coarticulatur. In hunc usum creati sunt, ut rectè trahant. nam rectis fibris constant, & glottidem versus lateralem partem dilatant, quæ horum duorum musculorum auxilio crebro referatur. Quare horum beneficio graues voces emittuntur. Tertij ferè ab anteriore parte ossis anularis emergunt, cumque obliqui sint, in quartum, quintumque os terminum habent, prope eam partem, ubi duo secundi desinunt, non autem in scutalem, ut Vesalius ipse voluit. hi glottidis anteriora adstringere, posterioraque dilatare possunt. At quarti ortum habent ab interiore parte scutalium ossium, quibus cum articulantur, & obliquè incedunt, donec in dicta ossa ingrediantur, quæ arytanoïdem constituunt, hoc est in lateralibus partibus. hi quoque cum anteriora arctent, posteriora amplificent. Extremus musculus laryngis adèd paruus est, ut minorem in vniuerso corpore inuenire nequeas. positus est transuersim in radice eorum duorum ossium, de quibus proximè meminimus, & fibræ illius transuersæ sunt, haud dissimiles fibris vltimi musculi ex communibus, qui œsophagum complectitur. ab hoc autem posterior pars constringitur, vnàque anterior dilatatur. Voluit quidem Vesalius hunc musculum musculos esse duos, qui ab arytanoïde exeant, atque in eandem redeant. Ego verò vnum duntaxat esse musculum hunc constanter affirmo, & fibras illius esse continuas.

Voces graues eius merito emittantur. Tertii laryngis musculus.

Glottidis anteriora astringentes, posteriora dilatantes musculus.

Arytenoidia constitutio.

Musculus extremus laryngis omnium minimus.

De Musculis scapulas mouentibus.

CAPVT XV.

Musculi scapulas mouentes.

Musculos scapulas mouentes quatuor non septem, ut Gale. voluit, esse.

Musculus cucullarius, primus scapulae est musculus.

Musculi cucullaris varij motus.

ET SI de Musculis, qui caput mouent, prius loquendum videretur: tamen cum eorum magna pars sub scapulae musculis contineatur, de his mihi antea, deque humeri musculis loquendum videtur, quam de musculis capitis verba faciam. Galenus lib. de Musculis, scapulas asserit à septem musculis vtrinque moueri. At ego in homine quatuor duntaxat vtrinque reperio. Quatuor sunt scapularum motus, sursum caput versus, deorsum, antè, retròque. Prioris musculi figura perelegans est. nam is cum suo pari simul consideratus monachorum cucullae percommode comparari potest, aut panno, quem viduae nostrae Cremonae super humeros gestant: ideo cucullaris musculus non absurdè dici poterit, egrediturque tum ab occipite, tum ab apice spinarum, vertebrarum omnium, colli, atque thoracis, ad octauum vsque. habet verò in occipitio lineam transuersam, spatiumque occupat, quod occiput, aurèmq; interiacet. Eius exortus exilis est, & procul admodum ab occipitio vsque ad octauam thoracis vertebram. terminum in Acromio ponit iuxta rotum maioris scapulae processum, & clauiculae partem: & cum variis sit constructus fibris, motus etiam edit varios: superioris partis ope fibris obliquis scapulam sursum obliquè trahit, mediis autem versus dorsum adducit, inferioribus autè fibris deorsum

deorsum trahit, cuius verò figura huiusmodi est. Galenus hunc cucullarem musculum in duos diuisit, superiorémque partem trapeziam vocat, qui licet in homine vnus sit, in simiis tamen duo sunt. Nam à maiore processu acromio dicto vsque ad occipitum vnus est, ab hoc ad octauam vertebam musculus alius est. Cucullaris hic musculus in homine à Vesalio pro secundo describitur, qui scapulæ deseruit. Secundus musculus scapulæ dicatus primo humeri musculo subiacet, enascens à secunda, tertia, quarta, & quinta, rarò autem à sexta costa, ubi in Cartilaginem degenerat, & sursum oblique ascendens in angustum cogitur, & in ancyroidè minorè scilicet scapulæ processum, tum carnosus, tum tendinosus terminatur. In hunc usum à natura genitus fuit, vt scapulam ad anteriora versus sternon adducat. Galenus autè existimauit hunc musculum humero famulari, cū tamen nullo pacto famuletur. Musculus hic, quem nos secundum dicimus, à Vesalio primo loco describitur. Tertius prodit à transuerso processu secundæ, tertiæ, quartæ, quintæq; ceruicis vertebræ, & cū carnosus descendat, crassescit, validus fit, & in superiorem, atq; interiorè scapulæ partem inseritur. Fibre illi rectæ sunt ferè omnes. sunt enim aliquæ etiam obliquæ. Vtitur hoc natura ad scapulam attollendâ, prioriq; auxilium ferendum. nam scapulæ os satis graue existit. Quartus latus est musculus, tenuis, quadrangu-

Cucullarem musculum in homine unicum esse, non duos ut in simiis quicquid Gal. dixerit. Musculus secundus scapulæ.

Secundi scapulæ musculi usus contra Galenum.

Tertius scapulæ musculus.

Tertii musculi beneficio scapulæ attollitur.

Quartus scapulæ musculus.

Q

laris: progreditur à spina quintæ, sextæ, septimæq; vertebræ colli, & à tribus primis, superioribusue thoracis: carnosus incipit, & partim tédinosus, fibris obliquis: terminus ipsius est iuxta vniuersam scapulæ lōgitudinem, quam dorso adducit, hoc est retrò trahit.

De Musculis humerum mouentibus.

CAPVT XVI.

Musculi humerum mouentes.

Humeri plures motus.

Humeri musculos septem non undecim esse, ut Galeno placuit. Primus scapulae musculus.

HUMERVS voluntario omni motus genere mouetur: sursum scilicet, deorsum, antè, retrò, & circulari motu: eius musculi septē sunt, nō vndecim, vt Gal. placet lib. de Musc. Primus magnus est, carnosusque, qui anteriorem thoracis partem occupat: à media clauicula versus sternon progreditur, & longitudinem totius ferè ossis pectoris sequitur, & à Cartilaginibus septimæ, & octauæ costæ, cui māmilla innititur. Principium huius amplum est, & magnū, semper tamē imminuitur: fit acutus, tandēmq; in tédinem breuem quidem, sed latum desinit, qui in interiorem humeri partem sub ipsius ceruice inseritur. habet musculus hic fibras varias, humerūmq; multifariam ad pectus adducit: suprà scilicet, in medio, & infrà: habet insuper hic musculus quinque latera. Illud obiter adnotato, in inferiore huius musculi parte nonnunquā in quibusdā hominibus reperiri portionē quandam in acutū tendentem: ita vt musculus alius esse videatur, cū tamen nō sit. Gal. lib. de Musc. ex vnico hoc musculo ternos, si Dijs placet, efficit:

Galeus inconueniens.

cit: huicq; absurdo aliud absurdius addit. Nam in animū induxit suum, brachium obliquè huius ope moueri, quod in finia quidem inuenire potest, at in homine nullo prorsus pacto. Secundus humeri musculus triangularis est, crassius, fibris varijs intertextus, ab Anatomicis *ἰπωμαῖς δελτοειδὲς* dictus, & *δελτοειδὲς*, & humeralis, è media clavicula, ab acromio, totòque maiori scapulæ processu enascitur, initium ipsius latum est, tendinosumque: desinit tamen in acutum. supra humeri caput fertur, & medio in humero in validum, transuersumque tendinem desinit. qui tēdo mediam humeri crassitiē amplectitur, multiplicibus fibris constat, quibus brachium attollit, & suprà, & antè, & in medio, retròque. Tertium verò musculū humeri carnosum, tere-
tēmq; conspicies, qui ab inferiore parte scapulæ egreditur carnea origine, fibris à principio ad finem vsq; rectis, sitūque obliquo est, super gibbā, anterioremque scapulæ partem progreditur, & in tendinem validum latum exit, qui in posteriore humeri parte implātur, partes huius musculi sunt, vt brachiū deorsum versus posteriora trahat. At quartus musculus ingens est, & latissimus, oritur ab apice spinæ sextæ vertebræ thoracis, descenditque iuxta apicem omniū vertebrarum inferiorū vsq; ad ossis sacri dimidium. hoc adeò prolixum principiū neruosum est vndiq;, sed gracile: deinde sūtsum ascendit, in angustū redigitur, & in validum tendinem, breuem, la-

Secundus humeri musculus ἰπωμαῖς δελτοειδὲς ὁ ἰπωμαῖς δελτοειδὲς

Tertius humeri musculus.

Quartus humeri musculus.

tumque definit: sub humeri caput prope eū locum, cui musculum primū pectus brachio adducentem adhærere diximus, inter quos Axillæ cauitas relinquitur. Varias hic musculus habet fibras, propterea brachium vario modo deorsum trahit, idque tamē obliquiūs potius, quàm alio positionis genere. Tribus angulis inæqualibus præditus est. nam ex his vnus brevis est, duo verò prælongi. origo ipsorum ita se habet, brevis est à sexta vertebra, vsque ad ipsius finē, ex longis, alter ab hac vertebra vsq; ad ossis facri dimidium, alter ab hoc loco ad ipsius terminum pertingit.

Quintus humeri musculus.

Quintus musculus eam omnem cauitatem occupat, quæ inter summam scapulam, & maiorem ipsius processum posita est, & à posteriore parte ipsius enascitur: carnosus est, in validumq; tendinem desinens, cum sub eo ligamento deferatur, quod humerum cum scapula annectitur. in caput humeri superioris finit, multumque scapulæ ipsi adhæreret. Sextus

Sextus humeri musculus.

musculus ambit vniuersam scapulæ partem gibbam. emanat autem è parte posteriore iuxta ipsius longitudinem: carneus est, scapulæ admodum inhærens, desinitq; in tendinem crassum quidem, sed latum: in caput humeri inseritur

Septimus humeri musculus.

versus posteriora. Septimo interna cauitas scapulæ vniuersa dicatur, vbi costis inhæret nascitur à tota posteriore scapulæ parte. Situs ipsius est inter costas, scapulamque, & finis verò tendo est satis latus, & in interiorem humerum inseritur.

feritur. Vſus horum trium mufculorum, quos ultimo loco memorauimus, eſt brachij circumactio.

*Brachij à quinto, ſexto, & ſe-
primo humeri
mufculis circum-
agi.*

De Mufculus Capitis. CAP. XVII.

CAPUT tam primo, tum ſecundario mo-
uetur. primario cùm dicimus, intelligimus
de motu cum prima, ſecundâq; vertebra. ſecun-
dario autem cum toto collo. Motus ipſius pro-
prij tres mihi videntur eſſe, vnus antè, retròque,
alter ad latera, tertius cùm id circumagunt, li-
cet ad duos reduci haud incòmodè poſſint, ad
rectum ſcilicet, & obliquum rectus ſuper prima
fit vertebra, ſub ſecunda obliquus, quicquid Gal.
in hoc aſſerat, qui longa errauit via, adeò vt neq;
Mathematicen, neq; Anatomè in hoc calluiſſe
videri poſſit. Mufculi verò propriis motibus de-
ſeruientes ſeptem vtrinque ſunt. primi oriuntur
à ſpinis quinque ſuperiorum vertebrarum tho-
racis, ſurſumq; à colli-vertebris ad tertiam uſq;
aſcendentes, poſtmodum ſeiuunguntur, & obli-
què verſus occipitium incedunt, vbi deſinunt
inter poſteriorem partem, & aures. fibræ verò
iam inde ab origine ſua, donec diuidantur, re-
ctæ ſunt: deinde ſurſum ſpectâtes obliquæ ſunt.
prædicti mufculi ſunt ſatis carnoſi. Vſus illorū
eſt, vt caput ad poſteriorem partem tunc attra-
hant, cum ambo vnà operantur. ac cùm alter
duntaxat agit, caput in latuſ circulariter ver-
tunt. his mufculis tria ſunt latera, vnū ab initio
uſq; quo à coniuge diuiditur, aliud inde ad oc-

*Mufculi capi-
tis.
Caput primo, et
ſecundario mo-
tu mouetur.
Capitis motus
proprij.*

Gal. caſus.

*Mufculi pro-
priorum motu
capitis ſeptem
vtrinque ſunt.
Primi caput mo-
uentes mufculi.*

caput, tertium ab occipitio ad exortum vsque.

*Secundi muscoli
caput mouētes.*

Secundi muscoli varij admodum, qui multas figuras, & impressiones varias habēt, partibúsque multis tēdinosis, carnosisque etiam cōpluribus constant, ita vt plures quàm quinque muscoli videantur esse. Tamen par vnum duntaxat est, dextrum inquam, & sinistrum. initio acuto à transuerso processu quartæ, quintæque thoracis vertebræ exoriuntur, cūmq; sursum ascēdant, tandem medio in occipitio figuntur. rectus est ipsorū situs, munus verò caput ad posteriorem

*Tertij muscoli
caput mouētes.*

partem rectà attrahendi. Tertij muscoli sunt graciles, qui oriuntur à spina secundæ vertebræ ceruicis, demūmq; desinunt in occiput, sed aliquantulum disjuncti incedunt. fibris rectis constant, caputque posterius rectà ducunt. At

*Quarti muscoli
caput mouētes.*

quarti sub tertiis occultantur, carnosiq; omnes sunt, quemadmodum tertij, sed breues, à posterioreque parte primæ vertebræ oriuntur, vbi illi vertebræ in spinam desinendum fuerat, qua cau-

*Quinti caput
mouētes mus-*

uit, ne tertios musculos læderet. medio in occipitio finis ipsorum est, & ipsi quoq; rectà caput retrahunt, neque cuiquam mirū videri debet naturam tot musculos collocasse, qui caput retraherent. nam ita necessariū fuit, propterea quòd anterior pars grauis admodū erat, quippe cui facies, maxillæque inferior coniuncta est. Quinto pari musculorum capitis obliquus contigit situs, atque hi à secundæ vertebræ spina exoriuntur, & in primæ transuersum processum terminantur,

terminantur, caput in orbem vnà cum prima vertebra trahūt, carnosiq; omnes sunt, licet graciles. Sexti item obliqui, sed contrarij sunt, triangulūmq; efficiunt: è medio occipitio desinunt, emerguntq; ex primæ vertebræ processu, & versus anteriora trahunt. Itaque hi duo antè dicti, quintus inquam, & sextus proprij musculi sunt, qui caput in orbem cient à primis tamen, atque ab extremis, quos mox describemus, adiuti. Septimo loco musculi occurrūt lōgi, teretes, validi, quiq; vel nondū excoriato cadauere apparent, imò vel in viuētibz conspiciuntur, quos maiores nostri in numismatibz tanta diligētia obseruauere, obliquo sunt situ, eorū autē fibræ à summo pectore, atq; à clauicula oriūtur. duo habent principia, inter quæ cauitas adest: neruei sunt, in exortu lati: carnosī fiunt, & in processum māmillarem implātantur, quem & amplexantur. cū vterque operatur, caput antè inclinant. verū quoties vnus ex his mouetur, caput in latus agitur. Validi admodum sunt, atq; hi satis idonei fuere, vt caput in prouum flecterent. Illud est insuper obseruādum, hos musculos vnà cum quarto hyoïdis musculo magnam crucem in collo efficere.

Sexti caput mouentes musculi.

Quinti, & sexti musculi proprie caput in orbem mouentes.

Septimi caput mouentes musculi.

De Musculis Cervicis.

C A P. X V I I I.

LOQVVT iam sumus de musculis, qui primò caput mouent: nunc de iis loquemur, à quibus secundariò mouetur, qui quidem cervici deseruiūt, qua mota, caput etiam ipsum, non

Musculi cervicis.

Secundarij caput motus.

Q iiii

Cervicis musculi octo.

Primi cervicis musculi.

Musculi sub œsophago latitantes.

Secundi cervicis musculi.

Tertijs cervicis musculi.

moueri non potest: cùm cervix capiti articulata, atque annexa sit. Cervix igitur tū antè, tum retrò, tū ad latera mouetur, & eius musculi sunt octo, quatuor scilicet vtrinque. Primi in anteriore parte positi sunt, recti à corpore quintę thoracis vertebrę prodeunt, prope locū illū, in quo cum costā connectitur, ascendensque vniuersis vertebrarū corporibus annectitur. Sed mediam partem, qua œsophago iter præbetur, detectam relinquunt. suntque hi musculi, quos sub œsophago latitantes appellant, tendine acuto in anteriorem primę vertebrę processum finiūt, vbi illi in corpus (vt vocant) desinendū erat. Eorum vsum si petas, ego dicam tibi, flectunt cervicem versus anteriora. Verū illud est obseruandū, musculos, quos proximè memoraui, occipitio etiam quandoque, sed rarò annecti, vbi foramen est, per quod spinalis medulla descendit. Secundi à prima costā carnosī, amplique nascuntur, ascendentes ita arctantur, vt triangulū tantū non efforment. fulciuntur à transversis processibus vertebrarū colli à parte anteriori. Tertijs origo est è radice trāsuerſi processus sextę vertebrę thoracis, & sursum ascēdēdo à ceteris quoque transversis processibus vertebrarum thoracis, tandēque à singulis processibus vertebrarū colli posteriore in parte connectuntur. horum vtilitas, & eorū, quos secūdos nominauimus est, vt collū rectā ad scapulas flectant, id est ad latus, cū vterq; eodē agit tēpore.

Sed

Sed cùm alter tantùm agit, tunc obliquè mouetur. Inter binos hos musculos nervi, qui à spinali medulla prodeunt, inter vertebrae colli exeunt. At quartus exortus est, à septima vertebra thoracis, supra omnes thoracis, collique spinas, desinuntque tandem in spinam secundæ vertebrae colli. munus autem ipsorum est collum ad posteriora attrahendi.

*Quartus cervice
musculi.*

De Musculis Dorfi. C A P. XIX.

VARIIS motibus dorsum mouetur, in anteriorem partem, posterioremque, item ad latera, & in orbem nescio quo pacto. quos motus pereleganter in saltatoribus quibusdam videas. Octo prædicitur est musculis dorsum ipsum. quatuor enim utrinque habet. Primi oriuntur à cavitate superiore, posterioremque ossis ilij, & à superiore quidem, sed interiore parte ossis sacri, origo eorum lata, carnosaque existit, & in parte abdominis interiore ascendunt, & adhærent transuersis processibus vertebrarum lumborum, & infimæ costæ, carnosi sunt toti, & figura quadrilatera. Hunc autem in usum confirmati fuere, ut dorsum in anteriora flecterent, cùm scilicet uterque simul operatur: quod si seiunctim moueant, tunc ad latus trahunt. Secundi longiores sint musculis omnibus nostri corporis. nam ab imo osse sacro ad caput usque extenduntur. Exoriuntur autem ab extremo osse sacro, principio nervoso, validoque: deinde in carnem degenerant, hærentque trans-

Dorfi musculi.

*Musculi dorse
octo.
Primi dorfi mus-
culi.*

*Primorum dor-
fi musculorum
usus.*

*Secundi muscu-
li dorfi.*

nerfis processibus vertebrarum lumborum versus posteriorem partem. postmodum omnibus transuersis processibus vertebrarum thoracis ad primam vsque thoracis vertebram, & ad vnumquemque ex transuersis processibus tendinem mittunt, siue neruosam ansulam : quo loco Vesalius opinatur ipsum musculū desinere, à processibus discedens, & ascendens in temporale os, supra mammillarem processum desinit. & hanc, quam describimus partem Vesalius cum musculis capitis confudit. Neque inutiles sunt suprā à nobis positi muscoli. nam illis munus demandatum est, vt vniuersum dorsum, & caput etiam ad partem posteriorem flectant, & vt mole corporis semicirculi figuram imitari possimus. Tertij nascuntur à posteriore parte ossis sacri, initio in acutum tendente: annectuntur spinis vertebrarum lumborum, & in spinam duodecimæ vertebræ thoracis acutè terminantur: & nonnunquam in yndecimam, ansulis præterea neruosis præditi sunt, vt superius meminimus: lumbos flectunt, ne vsum quæras. Quarti à spina duodecimæ vertebræ thoracis oriuntur principio & ipsi acuto, & spinis omnibus vertebrarum thoracis colligantur, & in primâ fine etiam acuto finiunt in medio lati fiunt circa sextam vertebram: eorum vsus est thoracem erigere, & cum tres supradicti vna operantur, dorsum vniuersum rectum detinent. Quod si quatuor agant simul, vt vnus scilicet alterum subse-

Vesalij negligentia.

Tertij dorsi musculi.

Quarti dorsi musculi.

Quartorum dorsi musculorum vsus.

subsequatur, in orbem mouent, agentibus autē musculis, qui ex altera duntaxat sunt parte, corpus in latus voluitur. Tres priores sunt musculi lumbales, quos Græci *ῥόας* vocant, tres vltimi annexi admodum sunt, hic fit, vt nisi optimus. diligēsq̃ue fit Anatomicus: haud facillē inueniantur, & distinguantur. Ego tum in his, tum in ceruicis musculis describendis à Galeno reprehendendo volens abstinui (licet hos malē Galenus descripserit) ne studio contradicendi potius, quā quod re ipsa ita inuenirem, hæc scripsisse cupiam videri possim. sed si nostram horum musculorum descriptionem, cum Galeno contulerit facillē inueniet quantum interfit.

Tres musculi lumbales, Græcis ῥόας dicuntur.

Galenus error in vltimis dorsi musculis describendis.

De Musculis thoracem mouentibus.

C A P. X X.

THORAX pars est intus concaua ouum re- ferens, in quo ea sita sunt instrumenta, quæ vitæ ancillantur, & per consequens respiratio- ni, inspirationique, sine quibus ne vita quidem ipsa stare vllō modo potest. Hic tum electio- ne, tum natura mouetur: licet Gal. secundo de mo- tu Muscul. illum electio- ne solū moueri cen- fuerit. ego verò assero nos cū somnum capi- mus, tunc naturaliter thoracem moueri nō vo- luntate, ad quam prudētissima respiciens natu- ra inter costas, sternō-que cartilagine posuit, quæ pulmonis motui facillē cedunt. qui pulmo vigilante, dormientēque pariter homine moue- tur, præterquam sermocinantibus nobis, ac vo-

Musculi thora- cem mouentes, Thoracis de- scriptio.

Thoracē & na- turali, & volū- tario motu mo- ueri aduersus Galeni senten- tiam.

ciferantibus. Tunc enim paulò amplius mouetur; quoniam musculi thoracem magis dilatâr.

Thoracem musculis propriis, et pulmonis motu dilatari.

Thoracis proprii musculi sunt 13 & 8. nō proprii.

Ex his motibus, qui voluntarius est, à musculis proficiscitur, alter ob pulmonis dilatationem, ac constrictionem. Igitur qui hoc præstant mu-

sculi sunt proprii quidem vnus supra octoginta, & octo cōmunes in abdomine positi. qui quāuis illi famulentur: tamē thoraci quoque famulantur. sunt ergo omnes octoginta nouem. Ani-

In inspiratione inferiores thoracis partes dilatantur, superiores vero cōprimuntur, in expiratione cōtra se habet. Primi thoracis musculi.

maduertendum est autem hoc, quod est pulcherrimum: quum inspiramus, inferiores thoracis partes dilatari, superioresque comprimi. cōtrā cum expiramus, constringi inferiora, superiora dilatari. Primi, qui occurrunt, bini sunt, vtrinque vnus, ab inferiore clauicula prodeūtes, initio, finēque item oblongo sunt & in partem

Secundus thoracis musculus.

primæ costæ superiorem inseruntur, quam dilatant. Secundus musculus magnus est, latus, carnosus totus, qui à basi scapulæ emergit, incessus eius est inter ipsam, & costas, inseriturque in primam, secundam, tertiam, quartam, quintam, sextam, septimam, & octauam costam, & quandoque in nonam. proximè verò eam partem, quā in cartilaginem desinunt fines ipsius sunt digitorum instar factus est octo costas dilatan-

Tertius thoracis musculus et eius usus.

di gratia. Sed tertius exilis est, & parvus, à spinis trium vertebrarum colli, quæ extremæ sunt, & à prima thoracis enascitur: principium latum, membranosumque est, terminant hunc primæ thoracis costæ, & interdum in quartæ posteriorem

rem partem definit. hoc usu à natura cōstructus fuit, vt hasce costas dilatarer. Quartus musculus & ipse exilis, & quadrangularis, prodit à spinis vertebrarum duarum extremarum thoracis, & nonnunquam à prima lumborum. principium eius latum est, neruosum, membranosumque: deinde carnosum efficitur, & in tres infimas costas terminum habet, finis verò est in digitorum morem: & eas costas dilatat. Quintus carneus prodit à parte posteriore, superiorèque ossis sacri, & ab interno osse ilij. adeò pertinaciter secundo dorsi musculo adhæret, vt illius portio non iniuria esse videatur. Nihiloscìus, quum primum ad costas peruentum est, planè patet hunc à musculo dorsi diuersum esse. Quò magis ascendit, eò tenuior euadit. demum neruosarum ansularum adminiculo inferitur omnibus costis posteriore in parte, nō procul admodum à transuersis processibus vertebrarum, vbi costæ asperitatem eminentem habent. constriungunt partes posteriora thoracis. Sextus positus est interna in cauitate thoracis secundum sternon, & cartilagines septem verarum costarum, oblongus est, carnosus totus, sed exilis. hunc in usum natus est, vt anteriora thoracis coarctet. Sequuntur deinde intercostales musculi ita dicti, propterea quòd costarum occupant interualla: qui vtrinque sunt triginta quatuor. nam vndecim sunt interualla, verarum costarum sex, quinque autem notharum: in his duo sunt in

Secundi thoracis musculi usus.

Quartus thoracis musculus.

Quintus thoracis musculus.

Sextus thoracis musculus.

Musculi intercostales sunt vtrinque triginta quatuor.

*Musculi inter-
costales exte-
riores.*

*Musculi inter-
costales interio-
res.*

*Anatomicorū
omniū in inter-
costalium mu-
sculorū usu er-
ror.*

quolibet interuallo, in illis quatuor. hanc differentiam efficit, quòd cartilaginee versus pectus vertantur. In his enim fibrarū deductus voluitur. hi sunt exteriores, interiorésque fibris obliquis, sed contrariis, adeò vt exteriores cum interioribus x literam efficiant. exteriorum ortus est ab inferiore parte costarum: ac desinunt in superiora subsequendum, versus dorsum cum incipiant, in os pectoris demum inferuntur. Interiores verò initium sumūt à parte superiori costarum: & in inferiorem supra positā terminantur. Fibræ exteriorum à dorso obliquè versus pectus ita procedunt: vt à supernis ad inferna ita descendere videantur. Interiorum verò fibræ contrario se habēt modo, adeò vt in crucis morem coniungantur. subtiles quidem sunt, sed longi, non altiore loco siti, quod enim inter est spatij inter costas, perbreue est. Illud ne te effugiat, moneo candide lector, Anatomicos omnes in horum musculorum vsu deceptos fuisse. Vesalius inter reliquos, qui Galenum reprehendit, reprehensione non vacat. nam ipse certò asseuerat interiores non secus, ac exteriores genitos esse, vt costas constringant solū: neque sensit motum illum dilatare, quem ipse opinatus est adstringere. costā enim a costa seiungit: atque hunc in modum agit exterior musculus. Motum hunc dilatationis tunc edunt, cū soli operātur: hoc est vel interiores, vel exteriores seiunctim: cū verò omnes vnā mouent, coarctant

coarctât validè. Exteriores enim sursum trahūt, interiores deorsum, atque ita trahunt costas simul, validèque constringunt. nam vis constringendi in thorace valida esse debebat, eo quod foras expiramus, & vociferamur. & hunc motum ego sæpius in viui canis sectionibus obseruavi, sectionibus, inquam, quæ domi fiunt, non quæ palàm. ibi enim omnia, vt in priuatis sectionibus, exquisitè cōsiderari nequeunt, ob auditorū spectatōrumq; frequentia, sæpe enim tercentis, & amplius auditoribus in Academia Patauina, & Pisana, & Romæ deniq; , vbi iam decem annos profiteor, me circumdatum vidi. Causa quā obrem Vesalius in hoc hallucinatus fuerit, hæc fuit: quòd existimauerit in hoc motu primā costam immotam permanere. Verùm aliter se res habet. erigitur enim à primo musculo thoracis, qui à iugulo emergit: quæ cum attollitur, costas ordine trahit: quibus sui intercostales musculi opem ferunt: atq; ita sursum versus extendūtur, exterioribus auxiliantibus: cōtrà verò deorsum inferiorum adminiculo. quoniam vltima costa deorsum trahitur à musculo abdominis obliquè ascendente: atq; hoc, quo diximus ordine, dilatantur. Quum verò simul vtrique operantur, tunc vniuersa thoracis constrictio sequitur, vt iam explicauimus.

De septo transuerso. CAP. XXI.

DIAPHRAGMA musculus est mēbra naturalia à vitalibus diuidens: vt inquit Diui-

*Vesaliy erroris
causa in in-
tercostaliū mu-
sculorum usu.
Primam costā
moueri.*

*Quomodo costæ
moucantur.*

Diaphragma.

*Falsa opinio
Aristot.*

nus Plato, qui animam irascibilem à concupiscibili diuidebat. Aristoteles diuisionem hanc à natura genitam existimauit, ne qui vapores à cibo attolluntur, cor læderent, in quo duas prædictas virtutes, atque alias etiam plerásque collocauit. Quod falsum esse, suo loco dicemus. sed, quamuis hoc non adesset septum, aio hos vapores cor non offensuros fore. nam per œsophagum progrediuntur. Quòd si hoc fuisset, quemadmodum ipse in animum induxit suum, quo pacto se volatilium corda haberent, cùm septo careant? hic musculus à reliquis omnibus differt situ, figura, nobilitate. Situs enim est in vltimo thorace, & corpori nostro transuersus manet. Figura ipsius orbicularis est, in medio nerueum tendinem habet: partibus tamen carnosus circumdatur, fibris à centro ad circumferentiam tendentibus, re contemplatu pulcherrima. Nobilitas verò eiusmodi est, vt veteres medici phrenes illud, quasi mentem dixeris, appellauerint. hoc etenim læso, rarò euadimus. Sed præter neruosum, quem diximus, tendinē, qui multi sensus est particeps, venæ ad sunt, arteriæque non paruæ. amplius multis quoque; neruis refertum est septum, qui quidem à spinali medulla emanantes inter costarum interualla ad diaphragma properant. Inter quos neruos, duo sunt, qui inter quartam, quintamque cervicis vertebram incedentes inferius supra pericardium inferuntur, vbi carnosâ pars septi in tendinem

Phrenes.

*Partes septum
transuersum in-
gredientes.*

nem degenerat: seu mauis vbi in carnosam naturam definit tendo. & hanc sanè ob causam Galenus de exortu ipsius varius admodum fuit, sibi que dissidens. nunc enim hunc inquit à costarum notharum cartilagine, nunc à spina exoriri. Septum hoc, de quo loquimur, thoracis est musculus, qui expirationi, inspirationisque ministrat. cum enim suo munere fungitur, retrahit sese versus vertebrae, ascendensque extrema thoracis ad se trahit, inferioremque partem vniuersam constringit: atque hæc, cum expiramus, at cum inspiramus relaxatur, descendensque permittit inferiora thoracis dilatarı. Atque hæc est septi transversı utilitas, quam in viua sectione spectare licet. Hic musculus tum supra, tum infra, quasi veste tegitur, supra quidem à pleura, infra verò à peritonæo. à vertebrae exoritur. Alij principium ipsius partem nervosam esse existimant. Ego verò duas eius partes esse dicerem longiusculas illas, quas Vesalius ligamenta nuncupauit, quæ corpuscula prodeunt è latere corporis vertebræ duodecimæ thoracis, & à superioribus lumborum: atq; inde postea pars ipsius nervosa initium sumit, quæ cartilagini, quæ gladialem vocant, cõiungitur. Gladialis verò cartilago, vt suo loco latius explicatum fuit. idcirco genita est, vt septi prædicti propugnaculum foret. non oris ventriculi, vt vulgus medicorū arbitratur, & huic etiam parti cor innititur. fit carnosum vtrinq; septum, & in cartilagine costarum

Septum thoracis esse musculum inspirationi, expirationi seruientem:

Gladialis cartilago.

R

*Duo septi transuerſi propria ſe-
parantur.*

Tertium foramen in ſepto contra Veſalij opinionem non datur.

Hippocr. & Galeni error.

*Muſculi abdominis.
Abdomen.
Επιδείξιον.
Mirach.*

rum, quas mendosas dicunt, demum implantatur vltimam costam amplectens. Sed hoc idem septum, licet nobile admodum sit, ut diximus: nihilominus necesse fuit, ut aliis nostri corporis partibus cederet, accommodareturque. Idcirco duobus præditum est foraminibus, quorum in dextra vnum, alterum in sinistra situm est. Per dextrum vena caua ascendit, quæ in thoracem progreditur, per sinistrum œsophagus descendit, cuius terminus in ventriculum est. cum œsophago autem incedunt nerui bini, quos sextum par nervorum cerebri constituit. Atque hæc propria sunt septi transuerſi foramina. Vesalius præter hæc, tertium ponit proprium diaphragmatis foramen: per quod arteriæ ἀορτή dictæ iter sternitur. At ego hoc foramen esse nego. nam ipsa arteria ἀορτή transit corporibus vertebrarum adhærens. Itaque septum dum vertebrae amplectitur, arteriam quoque amplectitur: non tamen propter ea perforatur. Non negauerim equidem Hippocratem diuinum hominem, nec non Galenum post ipsum scriptum reliquisse per idem foramen, quo aditus œsophago patet, magnæ etiam arteriæ iter præberi. sed profecto pace tantorum virorum sensus aliter esse aperte ostendit.

De Musculis Abdominis. CAP. XXII.

ABDOMEN ea pars est humani corporis, quâ nos ventrem inferiorem dicimus, Græci ἐπιδείξιον, Arabes mirach appellauerunt, in quo tum nutritionis, tum generationis membra continentur,

tinentur, in cuiusque medio situs est umbilicus. Musculis octo præditum est abdomē, qui ipsius ministerio addicti sunt: licet thoraci opem quoque ferant: nam illud dilatant: quod si comprimant, fæcum vrinæ, & fœtus expulsionī auxiliatur præsertim à septo trāsverso adiuti. Quid? quod hi musculi detinendis omnibus iis, quæ à natura in hac regione sita fuere, magno sunt v-
 fui? Sed vt ad ipsorum descriptionem descēdamus: sunt vtrinque quatuor. Primi duo musculi obliqui descendentes ob id nuncupantur: quod è superioribus originem ducētes in inferioribus desinunt partibus. fibras habēt obliquas, & propterea obliquorum nomē illis inditum fuit, lati admodum sunt, positiq; in lateralibus partibus. Emergunt à sexta, septima, octaua, nonaq; costa, anteaquàm in cartilaginem desinere incipiant, deincepsque à subsequētib; costis, & ab apice transuersorum processuum vertebrarū lumborum, & à dimidia ossis ilij appendice, latissimum habent principium, & carnosum, digitorum vt plurimum instar, qui inter eos fines secundi musculi thoracis ingrediūtur, qui octo costas dilatant. Postea verò quàm non parum progressi sunt, in latum tendinē, neruosum, membranosumque degenerant, qui tendo reliquæ parti appēdicis ossis ilij, de qua dicebamus, & pubis adhæret: non autem coxendici, vt male Leonardus Fuchsius opinabatur. in medio ventre finiunt, à mucronata scilicet cartilagine,

Musculi abdominis octo nempe vtrinque quatuor.

Primi duo abdominis musculi descendentes dicti.

Fuchsi falsa opinio.

R ij

Vesaliij error.

*Secūdi abdomi-
ni muscoli a-
scendentes vo-
cati.*

rectà vsque ad os pubis, quo loco candidam li-
neam cernere est, vbi horum musculorum ten-
dines vnà cum obliquis ascendētibz, & trans-
uersalibus coniunguntur. hæc autem pars ideo
albicat, quòd illi caro non subiacet. Igitur can-
dida linea terminus est prædictorum musculo-
rum: nō in osse pubis, quemadmodum Vesalius
vult. Nam os pubis non mouetur, quocirca
munere suo quī fungi potuissent obliqui descē-
dentes abdominis muscoli, si in os pubis inserti
fuissent, & religati? qui præterquam quòd & in-
testina, & quæ diximus, alia premunt, inferiora
thoracis etiam constringunt, & septo auxilium
ferunt: scitòque eam esse illorum tendinis vnio-
nem, vt musculus vnus duntaxat esse videatur:
cui duæ carnosæ partes cōtigere. Verū si quis
terminum fibrarum diligenter animaduertit,
duos esse musculos planè comperiet, qui in me-
dio vniuntur: & alios sex ventris inferioris mu-
sculos supereminent. Secundi sunt obliqui ascē-
dentes, quorum fibræ opposito modo se habēt,
ac primorum fibræ, nam illæ deorsum, hæ verò
fursum obliquè spectant: & quæadmodum in-
tercostalium musculorum fibræ, cruciantur, vt
dicunt, id est crucis, vel x literæ figuram imi-
tantur. Oriuntur igitur hi carnosi ab appendice
ossis ilij, & transuersorum processuum vertebra-
rum lumborum initio membranam imitante,
fursum quidem carnosi nectuntur inferioribus
costis: deinde in latum, neruosum, membra-
nosumque

nosumque tendinem desinunt, qui ubi ascendit, rectisque musculis occurrit, in duos scinditur: quorum alter supra rectum musculum, alter sub ipso incedit. Quia in re non poteris studiosè lector naturæ sagacitatem, atque admirabilem sapientiam satis obstupescere. nam recti musculi hoc complexu robustiores efficiuntur, & in medio trium constituuntur. Et nisi tendo iste scissus fuisset, recti musculi in medio collocari nullo modo poterant. sed uniuntur denuo hi tendines, ubi lineam candidam sitam esse diximus. atque hîc, eo modo, quo descendentes, finiunt, & quibusdam nervosis rectorum musculorum partibus adhærescunt. Vfus eorum est, ut intestina comprimant, & costas deorsum trahant, quo thorax dilatetur. Tertij musculi abdominis sunt recti, ita dicti, quòd secundum corporis rectitudinem siti fuerint, rectisque fibris constent. incipiunt ab osse pubis, quamvis Galeno sexto Metho. in quinto de usu Part. & in quinto de Aggress. Anat. aliter videatur. Arbitratur enim ipse illos à pectore, si Dijs placet, emergere, cùm in illud potius supra mucronatam cartilaginem desinant. Duo principia ut plurimum habent, nervosum alterum, alterum carneum, à superiore parte ossis pubis: quandoque tamen vnum solùm habent carnosum initium. terminantur in sternon, ut dixi, & in cartilagines ultimarum costarum verarum, idque lato fine: tendinis expertes sunt: tribus tamen

*Ascendentium
& descendens
musculorum u-
sus.*

*Tertij abdomi-
nis musculi re-
cti appellati.
Galenii error de
rectis musculis.*

*Musculorum re-
torum interse-
ctiones à Gale-
no descriptæ.*

*Musculi trans-
uersales.*

*Transuersalium
musculorum
usus.*

*Tendines obli-
quorum, ascen. de
scen. et transuer-
salium perfora-
tos esse.*

tendinosi, nervosiq; intersectionibus nō carne
re, quibus muscoli obliqui ascendentes adhæ-
rent. Túque adnotato Galenum, quas diuisiones
suprà memorauimus, nullo modo adnotasse: li-
cet vel in similibus ipsis reperiantur. At quorsum
hæ intersectiones? inquis. horum musculorum
roboris gratia effectæ fuere, néue admodum in
profundum abdomen contraherentur, ut ven-
ter magis sphericus relinqueretur. Sunt in exor-
tu proximi, sed quò magis ascendunt, eò magis
sejunguntur. Crassi sunt satis, validique hac uti-
litate à natura facti, ut anteriora abdominis cō-
primant. Sed euidentior eorundem usus est,
thoracem deorsum trahendi, ut suprà dilata-
ri posset. Vltimi sunt transuersales, hoc nomē sor-
titi sunt, quoniam transuersim in corpore collo-
cantur, à transuersis processibus vertebrarum
lumborum nervosi prodeunt, deinde carnosique
evadunt, & ossi ilij, costisque inferioribus cohæ-
rent, fibras quoque transuersas habent. finis ve-
rò illorum tendo est latus, nervosus, membra-
nosusque in linea candida, & ossi pubis hæren-
tes fiunt, quemadmodum obliqui ascendentes
& descendentes, licet non ita adhæreant. hæ-
rent etiam peritonæo. partes eorum sunt abdo-
men comprimere, & hypochondria constrin-
gere. Animaduertendum insuper est, tendine
musculorum obliquorum descendentium, ascen-
dentium, & transuersalium perforatos esse. Pri-
mò ubi umbilicus positus est: secundò prope os
pubis

pubis, & per ea foramina descendunt vasa semen testibus præparantia, ascenduntque deferentia, quæ in glandulas parastatas tandem inseruntur. atque hæc foramina sunt per quæ herniæ fiunt. sunt etiam in mulieribus perforata, quanquam Vesalius hoc nunquam animaduertit, quemadmodum dicemus ubi de matrice verba faciemus. Inuenies etiã alios ætatis meæ Anatomicos, qui & ipsi aliquid inuenisse videri volunt, decemque musculos in abdomine constituunt. Sed hi meherclè falluntur: nam carnosum rectorum musculorum principium musculum esse distinctum volunt: quod nullo pacto est: neque enim musculi definitio illis accommodari potest. Quod si musculi essent, ut illis placet, aliquo munere sibi fungendum esset: ut quod Priapo ad illum erigendum præstò sint, quod agere nequeunt, eo quod illi non adhæreant, sed ossi pubis superius affixi sint. Quod si penis illis sursum trahendus esset, sursum quoque esset ab iisdem vulua trahenda. Nam in fœmella non secus, atque in mare deprehenduntur, quæ vulua voluntariè non mouetur. sibi in animum induxerunt prædictos ab ipsis vocatos musculos rectis opem ferre, quod verum esse neutiquam potest. Nam adeò validi sunt recti abdominis musculi, ut auxilio non egeant. sin autem velint suos musculos vesicam comprimere: tantundem est. nam ab omnibus octo comprimitur, quod verum duntaxat ex his of-

Vasa semē præparantia.
Vasa deferentia semen.

Error posteriorum anatomicorum.

Vulvam motu voluntariè non moueri.

R. iiij

ficiis fungendum esset sibi: quoniam nihil superest agendum præter hæc. absurdum aliud non minus sequitur, quod hæc carnosæ origines, quas distinctos musculos isti vocant, in omnibus non inveniuntur, quos sequeretur his utilitatibus carere, ob quas geniti sunt dicti muscoli. Quare vanum hoc dictum est: & hæc de decem musculis abdominis sententia defendi nullo modo potest.

Improbatur opinio de decem musculis abdominis.

De Musculis Testiculorum. CAP. XXIII.

Musculi testiculorum.

Δακτύλιος membrana.

BINI sunt, tenues, oblongique muscoli, qui testibus deseruiunt. sibi sunt in Darto membrana, eorumque origo est supra os pubis, ubi foramen videre est, per quod seminaria vasa descendunt eadem membrana inuoluta. Profectò, si verum fateri licet ingenuè, veri muscoli formam vix præ se ferunt. Sunt enim fibræ quædam carnosæ, rectæque in hac Darto positæ, hos musculos antiqui cremasteras, quasi suspensores dixeris, appellauerunt. Hanc enim ob causam effecti à natura videntur, ut testes suspenderent: ne temerè dilaberentur. Aliis placet hos non modò testes detinere, ne prolabantur: verum etiam testes ab hisce attrahi, idque voluntariè, dextrum à dextro, atque sinistrum à sinistro.

κρέμας ὅστις musculi, ac suspensores dicti.

De Musculus Penis. CAP. XXIII.

Penis descriptio

Quatuor penis musculi.

σφιγκτήρ.

PENIS præter eius substantiam, quæ rara est, porisque referta spongiæ instar, & crassam, qua circumuoluitur, membranam, quatuor insuper musculos habet. quorum primi à sphinctere ortum ducunt, orbiculari scilicet musculo, qui

qui extremo recto intestino adiacet, longiusculi sunt, subtus incedunt & media ipsius parte plus minus in meatum vrinarium implantantur, qui meatus semini quoque communis existit. hūc amplectuntur, subtiles sunt, in hunc vsum producti, ut cum lotium nobis, vel semen emittendum est, hunc meatum dilatent. reliqui duo musculi à coxendicis appendice oriuntur, sub ipsius penis exortu, qui ab inferiori parte ossis pubis initium sumit. sunt hi quidem breues, at prædictis crassiores, in ipsumque penis corpus desinunt, in meiendi munere ipsi quoque magnam opem ferentes, maiorem verò in coeundo afferunt. nam penem sustinent, erectumque detinent, donec opus absoluator.

Primi duo penis musculi.

Primorū duorū penis musculorum usus.

Duo posteriores penis musculi.

Posteriorū duorum penis musculorum usus.

De Musculi Vteri. CAP. XXV.

ANIMADVERTENDUM est in laterali-bus vteri partibus, ubi adsunt seminaria vasa, duas etiam adesse membranas duarū alarum instar, quæ diuisionem ab hisce vasīs factā continent, Quibus in membranis non in omnibus quidem, sed in quibusdam duntaxat mulieribus certæ sunt carneæ fibræ, velut in viro- rum darto. has carneas fibras Vesalius ita describit, quasi musculi sint, qui vterum sursum sensim attollant. Ego verò, si quis paucas hasce fibras, quæ neq; etiam in omnibus fœminis reperiuntur, voluerit pro vteri musculis accipere, non multum morarer. parui enim refert, has ne musculos voces, an musculos esse deneges.

Musculi vteri. Membrana in vteri lateribus alarum instar posita.

De Vesicæ Musculis. CAP. XXVI.

*Vesica.**παρὰσάττις
glândula semen
continentes.**Musculus vesti-
cæ collum com-
plectens.**Error contingēs
imperitis lapidē
ē vesicæ extra-
hentibus.**Mulieres carēt
glandulis para-
satis. cum ta-
men musculum
ibi existentem
habeant.**Anus.**Ani tres mus-
culi.**Musculus orbi-*

IN hominis Vesica, cū in collum euadit, na-
tura duas glândulas παρὰσάττις dictas, colloca-
uit, quæ quidem semine continenter refertæ
sunt, nisi vel puer sit, vel senex, vel macie con-
sumptus. In harum glandularum fine natura
prudēs musculum tenuem posuit orbicularem,
circularibus fibris, qui vesicæ collum consttrin-
git, ne vrina nobis inuitis exeat. Etenim nisi
hic adesset musculus, in horas singulas lotium
exire cernerēs, quemadmodum in quibusdam
conspicimus, quibus hic musculus relaxatus est:
& vt iis euenit, quibus miseri empirici quidam
qui lapides euellere profitentur, transuersum di-
ctum musculū incidere: qui, cū huius situm
prorsus ignorent, hunc nolentes secant, & pro
morbo morbum inducūt. nam quibus hic mu-
sculus præcisus est, semper vrina exit, nunquam
colligitur. Quamobrem femoralia vrina asper-
sa, fœtentiæque habent semper, quo nihil quic-
quam fœdius dici, excogitarique potest. Adeo
vt planè videas ab hoc musculo detineri urinā,
qui, cū inieciere volumus, relaxatur, atque ita
lotium exit. hic musculus & in mulieribus etiā
reperitur, quanuis assistentes glandulas non ha-
beant.

De Musculis Ani. CAP. XXVII.

ANO tres musculi contigere, ex quibus v-
nus orbicularis est, qui sphincter appellatur
in extremo recti intestini positus. hic latus po-
tius,

nus, quàm crassus dici meretur: fibris transfuer-
 sis cōstat, & cum cute admodum vnitur, à coc-
 cyge ligamētis mutuo acceptis. Eodem mune-
 ne fungitur, quo fungi vesicæ musculus dixi-
 mus. fœces scilicet hic detinet, ne nobis inui-
 tis exeant, vt ille vrinam. Reliqui duo lati qui-
 dem sunt, sed subtiles: cūque ab ossis sacri li-
 gamento, atque ab ilio initium sumpserint, in
 partem sphincteris superiorem terminatur. hoc
 vsu à natura producti sunt, vt rectū intestinum
 sursum trahant, si fortè quibusdam conatibus,
 vt quandoque fit, in excernendo exierit.

*cularis recti in-
 testini sphincter
 ductus.*

*Duo reliqui re-
 cti intestini mu-
 sculi, eorumque
 vsus.*

De Musculis femur mouentibus.

CAPVT XXVIII.

CUM Gal. in lib. de Vsu Part. diffusè satis
 loquatur, quo pacto fiat deambulatio, ego
 ab huius rei tractatione nunc vestra pace lubens
 abstinebo. Dico itaque femur & flecti, & ex-
 tendi, & in orbem agi, intrò, foràsque ferri: &
 vt breui omnia complectar, femur vndequaq;
 verti. Decem verò sunt musculi, à quibus mo-
 uetur: iique magni satis, propterea quòd cum
 membrum tum crassum, tum oblongum mo-
 uendum esset, validis musculis opus erat, à qui-
 bus hoc efficeretur. Ex his primus ille est mu-
 sculus, qui nates constituit, satis crassus, carno-
 sus: exoritur à dimidia ossis ilium appédice, ab
 osse sacro, coccygèque. Principium huic la-
 tum est, & semicirculare, sed ita semper arcta-
 tur, vt tandem in acutum desinat. Desinit au-

*Musculi fe-
 moris.*

Femoris motus.

*Musculi femur
 mouētes decem
 sunt.*

*Primus muscu-
 lus femur mo-
 uens nates
 constituit.*

*Secundus femo-
ris musculus.*

tem in maiorem τροχαντήρα, & adhuc inferius in femur, per latum autem tendinem coxendicis articulum supereminet. Secundi femoris musculi maior pars sub primo later, liuétque: oritur à tota ilij appendice carnosà, semicircularique origine, eundem articulum superequitat, & in tendinem latum, & validum finit summo magno trochanteri adhærescens, quem & ample-

*Tertius femoris
musculus.*

ctitur. Tertius verò totus sub secundo latitat, liuidus & ipse, carnosoque, & semicirculari initio, vt de secundo dictum proximè est, exit ab osse ilij, & quemadmodum de duobus aliis diximus, in progressu imminuitur in tēdinem desinens, quo magno trochanteri adnectitur, sed in summitate illius interiore, vbi is nō nihil inuertitur. Vfus horum trium musculorum est, vt femur extendant, sursum attrahant, & ad ex-

*Quartus femo-
ris musculus*

teriora ducant. Quartus est obliquo situ: oritur autem à tribus inferioribus ossibus sacri dicti ossis, principio carnosò, quod & teres videtur: finis ipsius est in tendinem teretem, quo in apicem maioris trochanteris, posteriora versus definit, femurque ad sese trahit, & eius circum-

*Quintus femo-
ris est musculus
lumbalis.*

actioni auxilio est. Quintus musculus lumbalis est in abdomine situs, teres quidem, sed carnosus, & crassus, & validus. situs eius aliquantulum obliquus est: rotus liuet. Initium verò sumit ab vndecima, duodecimâq; thoracis vertebra à tribus superioribus lumborum, quā corpus vertebrarum est, descendit supra pubis os, & in

& in teretem tēdinem finem habet, qui in minorem trochantera inseritur. At sextus offis ilij concavam internā partem vniuersam occupat: oritur à tota illius appendice, positus est in abdomine principio semicirculari, descendit supra os pubis: totus carneus est, itaque fere ad eius extremum progreditur, vbi in tendinem degenerat, qui in minorem trochantera implantatur. Vfus tum quinti, tum huius, quem nunc memorauimus, est, vt femur flectant. Septimus exit ab osse pubis iuxta ipsius cartilaginem lata origine, sitūque obliquo: definit tandem in interius femur sub minori trochantere, exiguo tendine. eius vtilitas est, vt femur vnum versus aliud trahat, & femur femori superimponat, si quis rectè consideret: non autem flectendi causa, quemadmodum in hoc deceptus voluit Vesalius. Octauo musculo femoris, qui Gal. Vesaliōque est quintus: nullus in humano corpore maior est, tanta fibrarum varietate refertus, vt si quis decipere cupiat, nō docere, tres, quatuorūe musculos pro hoc ostendere facile possit. Oritur ab osse pubis parte nimirum eius interna, & à coxendice minorem *τροχαντῆρα* amplectitur: deorsumque tendit, femori adhærescens sua illa oblonga, asperaque linea, posteriora carnosa. Tandem tendinem efficit, qui quidem in caput femoris interius inseritur. Dicti muscoli vfus est femur erigendi: neque hæc vtilitas paruipendenda est, huius enim munere

Sextus femoris musculus.

Septimus femoris musculus.

Octauus femoris musculus omnium muscutorū maximus.

femur erigimus: femoris autem rectitudine à brutis animantibus differimus. nam nos erecti incedere possumus: illa verò in terram prona perambulant. Ad hanc vtilitatem illud insuper accedit, quod octaui huius musculi beneficio septimo auxilium præstetur: vt femur femori, cum volumus, superimponamus. Nonus totum illud foramen occupat, quod in osse pubis, & coxendice positum est exteriori in parte. Principium eius latum, carnosumque est: exteriorem partem versus incedit, transuersus manet, & semper arctatur: adeò vt in satis validum tendinem tandem tendat, qui tendo definit in cavitatem quandam in maiori trochanteri positam. Decimus, & vltimus femoris musculus interiore in parte est, dictumque foramen ipse quoque occupat. Musculus hic non modo aspernandus non est, sed est summo-pere animaduertendus: admirabilis enim est, & in quo summi opificis prouidentiam cõtemplari licet. Nam carnosus oritur, latusque, vt suprà de nono memorauimus, quique ab intus ad extra feratur supra coxendicem, vbi cavitatis ad trochleæ imaginem efformata. hic musculus, cum sibi incessus flectendus est: tres sæpe tendines efficit, quandoque, quatuor, & quinque: qui postremo vniuntur, vnũq; tendinem duntaxat nerueum, perpulchrum constituunt, cuius terminus in posteriore maioris trochæteris parte sistitur. Sed hoc, quæso, priusquam ab hoc musculo

musculo discedimus, animaduerrite, quod est pulcherrimum. Quum primum tendinescit, *Marsupium carneum.* tendinisque substantiam sapere videtur: natura statim prudentissima carneum marsupium parauit de industria, in quo tendinem hunc collocat, ut tutus incedat, neq; ab ossis duritie villo pacto lædatur: quod os ab hoc musculo amplectitur. Non desunt, qui carneum marsupium, quod diximus ad decimi musculi, cum tendinescit, propugnaculum paratum: musculum peculiarem à dicto seiunctum esse contendunt: Quod mihi nullo pacto probatur, cum decimi musculi portionem esse plane perspiciam.

De Musculus Tibiam mouentibus.

CAP. XXIX.

TIBIA flectitur, extenditurque secundum *Tibia.* rectitudinem, quemadmodum palam cer- *Musculi tibiae:* nitur: mouetur etiam obliquè versus exteriora, licet obscurus sit motus iste. Quamobrem Vesalius deceptus, qui motum hunc obliquum pernegat. Hi motus, quos dixi, à decem musculis perficiuntur, quorum quinque flectunt, quatuor extendunt, vnus vero duntaxat sub poplite latitans oblique mouet. Ex his primus tum neruosus, tum carnosus ab interiori appendice ossis ilij exoritur. Idem tamen deinceps carnosus euadit, & fasciā præ se fert: obliquè incedit per femoris interiora delatus: cum autem ad internū caput femoris peruenit, procedit, & in neruosum finit tendinē, sed qui verè non est teres

Tibia motus à decem sunt musculis.

Primus tibiae musculus.

(vt Vesalius autumat) sed latior : finit verò in anteriorem tibiā . Hunc musculum voluit Gal. tibiā supra tibiā deferre : vt pueri ludētes , facere consueuerunt , quod falsum est , si de homine intellexit : quanquam in simia verū esse deprehendatur . nam hic musculus in simia , vel

Secundus tibiæ musculus.

in media tibiā definit . Secundus tibiæ musculus enascitur ab anteriore parte ossis pubis prope Cartilaginem , initiumque illius latum est ; iuxta lōgitudinem commissuræ ossis pubis , carnosus descendit , rectis fibris , fit teres apud internum femoris caput , & in nerueū tendinem definit , qui penè est teres : tamen deinde dilaturatur , & termin⁹ eius est in anteriore tibiæ parte , quam ἀντικνήμιον Galenus vocauit , penes primo loco dictum musculum . Tertius verò ab

Tertius tibiæ musculus.

infima coxendicis appendice nerueo principio oritur , longo , & tereti : deinde circa mediū femur carnosus efficitur , sed multiplicibus fibris , defertur per posterius femur , quum primū autem ad genu peruenit , tendinem nerueum efficit , quo in posteriorem sed interiorem tibiā implantatur . Quartus ab eodem loco oritur

Quartus tibiæ musculus.

prope tertium , verū eius origo tum carnea , tum neruea est , deorsumque tantū non teres existit . Incessus verò est per posterius femur , fibris constat rectis . propè genu in nerueū tendinem exit , qui priusquam finiatur , dilaturatur : finitque tandem parte tibiæ anteriore inter pri-

Quintus tibiæ musculus.

imum , ac secundum . Quinti origo est ex appendice

pendice coxendicis penes exortum tertij, quartique, eaque acuta primò, deinde fit crassior, & progreditur per posterius quidem, sed exterius femur. quum verò medium illius attingit, notatu dignam carnis molem sibi asciscit à medio femore enascentem, quam fortè aliquis musculum vnum censeret, sed profectò nō est ea caro distinctus musculus à quinto quem describimus. Tamen si cui post hac libuerit dictā carneam quinti musculi partem pro nouo musculo numerare, quem alij nō animaduenterint, vt aliquid adnotasse, videri possit: id per me sibi liceat, mihi sat sit, quid ingenuè sentiā, admonuisse. Hoc eodem in loco extrinsecus incipit in tendinem degenerare, qui cū ea carne, quam dixi, vnā in finem vsque descendit, in termino ipsius in capite fibulæ collocato. Si verò petas causam, quamobrem natura illam carnis portionem huic musculo affixerit: ego dicam propterea factum esse, vt musculus validior efficeretur, voluit, vt è medio femore exiliret, vt illi magis proxima esset. nam in extrinseca parte vnicus hic duntaxat adest musculus, cū interius quatuor adsint. Vfus horum quinque musculorum est, vt tibiā flectant. Illud autem scire operæpretium est, hunc musculum, quem nos, vt ordine cuncta distinguamus, quintum esse diximus, à Galeno & Vesalio pro quarto tibiæ musculo cōnumerari: hic ille est musculus, quem Galenus ait iussisse, vt cursori cuidā adi-

*Quinque primorum musculorum tibiæ v-
sus.*

*Quintus in ordine tibiæ musculus pro quarto à Vesalio an-
numeratur.*

S

meretur, quo adempto cursor nihilominus velocius currere poterat. Quæ res profectò Galeno medicæ artis principe (Hippocratem semper excipio) indigna non esse non potest. Nam si hunc musculû, quem exterius solum esse diximus, demas è crure, flexionem rectam efficere nullo pacto poteris: at in cursu rectam fieri flexionem Galenus admonuit secundo de administrat. Ana. Immò verò oppositum re ipsa cõperi: faucios scilicet in hoc musculo, quem nos quintum, Galenus quartum vocavit, neque magno vulnere, qui licet in sanitatē redacti essent, non sine labore tibiam flectebant. Quòd si Galenus de vno ex intrinsecis quatuor intellexisset, ego ne verbû quidem de hac re fecissem, quippe qui maximè omnium à contradicendo principibus in arte viris abhorream. Vos obsecro, qui nostra hæc qualiacunque legitis: huius musculi magnitudinem considerate: vsum illius animaduertite, & Galenum in hoc longè decipi faciliè iudicabitis. Flexionis musculis absolutis, reliquum est; vt ad musculos tibiam extendentes deueniamus, qui quatuor numero sunt. *Sextus igitur tibiæ musculus* (iam enim quinque absoluiamus) dignus est, quem diligenter consideres, & admireris. Oritur è media appendice ilium ossis. principium illius tum nerueum est tum carneum, brevis quidem est musculus, sed tamen crassiusculus, & maiori trochanteri coniungitur. ibi eius caro definit, sed tendo latus membra

*Sextus tibiæ
musculus.*

Tendo sexti ti-

membranofus, neruofusq; fequitur, quo tendine maiorẽ in vniuerfo corpore nullũ videbis, amplectitur omnes ferẽ mufculos, qui circũ femur pofiti funt, rectæ funt illius fibræ: tendo, quẽ dixi, maxime est nobilitatis propterea chirurgi animaduertant, ne illum tranfuerfẽ fecent. rotulam genu complectitur, & in anteriore partem tibiæ, fibulæq; tandem inferitur. Septimus exit è magno trochantere principio nerueo: & totũ trochantera circumdat: femori adhærefcit fuperius, & exterius. craffus admodum est hic mufculus, totũsq; liuidus, ad patellam vſque carnofus rectis fibris progreditur, deinde in latum, mēbranofũmq; tendinem definit, qui patellam complectitur. Octauus neruofus emergit è ceruice femoris, & à magno trochātere, quaſi duabus cōſtet originibus: ſed immediatẽ fit carnoſus, femori adhærefcit, progreſſus illius eſt anteriorius, & interiorius, carnoſus vt dixi, ad patellam vſque progreditur, variis fibris: finis eius eſt tendo, qui genu & ipſe cōplectitur. Nonus verò ortum habet ab anteriore parte offis ilium ſupra articulum coxēdicis, egreſſus huius mufculi acutus, nerueũſque primo eſt: deinde fit carnoſus, & teres. figura eſt huius mufculi, qua mufculum eſſe decet. rectus enim incedit ſupra anterius femur inter ſeptimum octauũmq; mufculum, priuſquam ad genu perueniat, tēdinem gignit nerueum, validum, qui ex anguſto fit latior, coĩtq; cũ ſeptimi, & octaui tēdinibus,

hic mufculi omnium tēdinum maximus.

Septimus tibiæ mufculus.

Octauus tibiæ mufculus.

Nonus tibiæ mufculus.

S ij

*Musculi tibiā
recta extenden-
tes.*

Galenī error.

*Decimus tibiā
Musculus.*

vnāq; patellam amplexantur, ac in anteriorem tibiā suis finibus inferuntur. Quatuor hi muscoli, quos proximè memorauimus, tibiā per rectam lineā extendunt: veluti ab aliis quinq; recta quoq; linea flectebantur, quicquid Gal. de horum vsu dixerit tertio de Vsu part. qui ita in hoc deceptus est, quemadmodum in ea sententia, qua à coxendice quatuor musculos exoriri opinabatur: cū re ipsa (si de homine loquamur) tres duntaxat exeant à coxendice. Decimus sub poplite latitās, origine neruea, teretiq; emanat ab externo femoris capite, extra sub ligamento delatus: postea verò carneā naturam induit, situ est obliquo, fibris obliquis, & carnosus in posteriorem, interiorēq; tibiā implātur. Hic musculus tibiā obliquè mouet versus exteriora, licet hoc Vesalius inficietur, qui hunc musculum in genu articulatione minus quàm rectè perpēdit. laxa etenim est: & quamuis velit ipse articulationes illas per ginglymū rectā dūtaxat flectere, & extendere, agere præterea nihil, ego tamē affirmo ab hoc occultato musculo, quem verbis descripsi, tibiā obliquè moueri.

*De Musculis extremo pedi deseruientibus, qui in
tibia siti sunt. C A P. X X X.*

Pes extremus.

*Musculi extre-
mi pedis 12. seu
13.*

EX T R E M V S pes flectitur, extenditur, moueturq; ad latera suorum musculorū adminiculo, qui in posteriores, & anteriores diuiduntur: sunt verò numero duodecim, vel summum tredecim. Primus emergit ab interno capite femoris

moris supra genu retrò, carnosus quidem incipit, & angustus, verùm progrediens dilatatur, & circa mediâ tibiâ plus minus in tendinem cessat latum, ac nerueum, qui postmodû semper angustus efficitur, & in posteriorem, superiorémque calcem definit. Secundus priori similis est. nam etsi exeat ab externo femoris capite, in reliquis ramen eadem agit quæ prior, adeò vt vnus duntaxat musculus esse videatur duobus principiis. nam corpus vnum est, tendo vnus. Quòd si illud me euitare posse confiderem, ne hoc lectorum mentes perplexas haberet: equidem hos duos musculos vnum solum musculum esse profiterer. Hi duo musculi, quos in vnum cogere meritò possemus, ventrem tibiæ posteriorem construunt, quam suram appellamus. Tertiò occurrit musculus exiguus, ipse quoque exoriens ab externo capite femoris propè articulum. sui exitus initiò acutus est. deinde in ventrem prominet, brevis est, sed in tendinem teretem, atque nerueum definit, quo tendine inter teretes longiorem in humano corpore non inuenies. later hic musculus sub duobus, quos antea diximus. Situm habet obliquum, obliquas quoque fibras. A parte externa internam versus progreditur, tendini supradictorum adhærens, tandémque interno calci implantatur. eius vsus est pedem in interiora euertendi. Hic musculus in simiis latum tendinē producit, vt Galeno placuit, at in no-

*Primus pedis
extremi muscu-
lus.*

*Secundus pedis
musculus.*

*Musculi suram
construentes.
Tertius tibiæ
musculus.*

*Tendo longissi-
mus humani
corporis.*

*Quartus tibiae
musculus.*

*Tendo quartiti-
bæ musculi est
omnium robu-
stissimus.*

*Musculi pedem
extendentes.*

*Quintus tibiae
musculus.*

*Sextus tibiae
musculus.*

bis in calcem cessat. Quartus maior est tibiæ musculus, liuétque, nascitur sub appendice fibulæ à posteriori parte : principio nerueo, & valido, postea carnosus euadit, & fibulæ adhæret tibiæque : latitudine ossa excedit. Quum verò mediam tibiā attigerit, tum in angustum tendit, & versus calcem in tendinem terminatur, quo nullus omnino robustior in homine inuenitur. qui tendo cum priorum tendine vnitur, & in posteriore calce desinit. Munus primi, secundi, & quarti est pedem extendendi, in terramque figendi, cui rei tamen quatuor alij musculi auxiliares copias subministrant. Cùm Hector raptaretur hoc tēdine vinctus fuisse dicatur necesse est : nūcque in dies videmus laniatos integra bruta hoc tendine suspensa in macello proponere, quæ res huius tendinis robur maximum testatur. Quintus à tibia, & à fibula originem ducit : ligamentóq; illi adhærescit, quod tibiā, & fibulam interiacer, anteriores musculos à posterioribus seiungens. Carnosum conspicias ferè ad extremam tibiā, prope internum malleolum desinit in robustum, nerueum, & teretem tendinem : incedit tum sub interno malleolo, tū sub naiculari dicto osse : demum sub planta pedis in tarso moritur. hoc usu natura hunc musculum genuit, vt pedem versus interiora trahat : neque ligamenti expers existit. Sextus à posteriore tibia effluit longo exortu, & carnosus, etsi postmodum in tendinem

nem teretem degeneret, incedit sub interno malleolo: & sub calce ligamento præditum est ab appendice tibiæ exorto, Diuiditur dictus tendo sub planta in quatuor tendines teretes, perforatos, qui procedunt, donec in tertium articulum quatuor digitorum, pollice excepto, inferantur. Vtilitas non mediocris est. nam quatuor digitos flectunt, eosdémq; validè adstringunt. Septimus verò longus, carnosusque inchoat à fibula emergens sub appendice spatium digitorum, vt nunc loquuntur: carnosus est, donec ad calcem perueniat, vbi in tendinem teretem commutatur, qui sub ligamento, sub malleolo, sub planta præterlabitur, & in os pollicis inseritur, quod flectit. Haftenus de posterioribus musculis extremi pedis verba fecimus: nūc de anterioribus loquamur. Ex his primus à tibia egreditur, id est ab appendice penes fibulam, ipsique admodum adhæret. satísque crassus est, & hisce anterioribus maior existit. Vbi mediam tibiæ longitudinem præterit, angustus redditur, desinitq; in tendinem teretem, nerueū, & validum, cuius incessus est per superiorem tarsum, detinetur à ligamēto, quod emanat ab appendice inferiore tibiæ, fibulæq;. Hic ille est tendo. qui adedò attollitur, itaque euidens est sub pelle: finis eius est in osse pedij pollicis præposito. Vfus est extremum pedem flectendi. Secundus exit acuto initio ab appendice tibiæ, adhæretque ligamento, quod

Pedis perforati tendines.

Tendines quatuor digitos pedis flectentes.

Primus musculus anterioris pedis.

Tendo in pede sub pelle apprens.

Tendo extremū pedem flectens.

Secundus musculus anterioris pedis.

Tendines superiores quatuor digitorum pedis.

Tertius musculus anterioris pedis.

Musculus pedis qui tertius decimus annumeratur.

Quartus anterioris pedis musculus.

tibiam, fibulamque interiacere diximus: deinde fibulæ ipsi ad finem ipsius ferè, carnosa quidem est huiusce musculi radix: veruntamen in quatuor teretes tendines desinit, qui detinètur sub eo ligamento, quod à tibix, & fibulæ appendice exoritur. Quatuor hi tendines ampliatur, postremoque in omnium digitorum superiorem partem inseruntur: pollicem hîc quoque excipio. vsus est, vt digitos illos extédant. Tertius à media fibula carnosus exilit prope ligamentum: deinde in tendinem teretem degenerat, qui sub transuerso itidem ligamento defertur, & in vltimum pollicis articulû inseritur, quem & extendit. hic tendo in duos diuiditur, quorum alter finem habet, vt dixi, alter verò inferitur in os pedij, pedique flectendo auxilium præstat. Secundus hic tendo à musculo quoque oritur, quæ portio in quibusdam, raris tamen hominum corporibus, alius musculus videtur esse. Ego tamen vnum solum musculum dicerem. licet non magnopere ægrè tulerim, si cui hunc duorum musculorum locum habere videatur: tunc duodecim, quos diximus, tertius decimus addetur, itaque vt initio huius capituli attingimus, tredecim erunt numero, secundum quosdam, musculi extremo pedi deseruientes. Quartus nascitur ab appendice superiori fibulæ versus exteriora: etsi quis omnia ad viuum refecaret, musculus hic, neque posterioribus, neq; anterioribus adnumerâdus esse videretur.

Sed

Sed ut ne lectoribus obscuritatis tenebras effundamus, inter anteriores adnumerabitur. Exortu carneo, nerueoque constat, fit carnosus deinde: postremò exit in teretem tendinem, & sub planta suis finibus in pedij ossa immittitur. hic musculus pedem ad exteriora euertit, & ligamento constat transuersali. Quintus & ipse à fibula prorùpit exortu oblongo, exterius carnosus est, quemadmodum de quarto diximus: itémque sub externo malleolo incedit, ubi vnà cum quarto in tendinem teretem finit, qui in os pedij inferitur, quod minimo digito præponitur. pes exteriora versus ab hoc musculo trahitur. Illud est insuper animaduertendum, licet ex his musculis omnibus dixerimus pedem vel extendi, vel flecti, vel intrò, vel foras ferri, nihilominus, si omnes vnà conueniant, atque in vna actione concurrant, tunc idem ab hisce omnibus humi affigeretur.

Musculus ad exteriora pedis euertens.

Quintus anterioris pedis musculus.

Quo pacto humi pes affigatur.

De Musculis in extremo pede positis.

C A P. XXXI.

MUSCULI positi in extremo pede sunt decem & octo, qui omnes digitis deseruiunt, quauis quatuor alios suprà descripserimus, quorum alios flectere, alios extendere monuimus.

Musculi extremi pedis digitis deseruientes sunt 15.

Ita vides quo pacto muscoli, qui pedis digitis famulantur, sint viginti duo. Primus igitur ex his decem & octo propositis, sub media planta iacet, initio sumpto à parte calcis inferiore, id est ab eius appendice, superstat huic tendo la-

Musculi digitis pedis famulantes sunt viginti duo.

Primus musculus pedis digitis inserviens.

tus,quem(vt suprà admonui,Galenus existima-
uit oriri à tertio musculo , qui à nobis inter po-
steriores tibiæ tertius , à Galeno quartus nume-
ratur lib.de Diffect.muscul.huic principiū ner-
uosum,carneūque contigit: sub pedij osse di-
uiditur,& in quatuor tendines teretes,perfora-
tósque euadit,qui in secundum articulum qua-
tuor digitorum inseruntur,mirabile dictu , visu
verò admirabilius. Quis enim obsecro,incredi-
bilem opificis nostri prouidentiam non admi-
retur,atque suspiciat , cū in vno musculo tor,
tantāque contemplari possit? Vñus est flectendi
secundum articulum illorum digitorum , quos
dixi. latus, qui huic musculo superstat , tendo
sensus est acerrimi,tanto verò sensu dedita ope-
ra à natura donatus est,vt quàm citissimè exter-
nas iniurias persentiret. Aiunt quidam plantam
propterea depilem esse:quod ego falsum credi-
derim , cū lepori non desit hic tendo , cuius
planta nihilo secius pilis referta est. Secundus
& ipse à calce prodit penes primum , sed inte-
riore ipsius parte , teres ferè existit , ossi pedij
quod pollicis præfertur, colligatur,tēdinēque
producit,quo in pollicem implantatur. hoc vsu
fabrefactus est,vt pollicem ab aliis digitis abdu-
cat. Tertius quoque ab eodem calce exoritur
prope primum.iter ipsius est exteriorem partem
versus,& ossi pedij minimo digito preposito af-
figitur,vbi processum illius videre est:deinde fi-
nit tandem tendinosa substantia in eundem mi-
nimum

*Quatuor perso-
rati tendines,et
eorum usus.*

*Latus tendo pe-
dis acutissim
sensus.*

*Plantam nō esse
depilem tendi-
nis lati causa.*

*Secundus pedis
musculus digi-
tis inferniens
pollicē ab aliis
digitis deducēs.*

*Tertius muscu-
lus digitis pedis
inferniens.*

*Tendo abducēs
minimū pedis*

nimum digitum, abducitque illum à reliquis. *digitum ab aliis.*
 Cum ab his tribus discefferis, sequuntur alij quatuor, qui sub pedis planta tibi occurrunt sub ossibus pedij, quorum exortus emanat à tendinibus musculi perforantis, qui in tertio articulo quatuor digitorum cessat, sed hi musculi cum parui, teretesque sint: carnis portionem sibi admovent, quam à calce mutuo accipiunt. De his musculis Galenus & Vesalius scribunt, usum horum esse, ut quatuor digitos à pollice diuellant: quoniam desinunt in quatuor tendines teretes, ac nerveos, qui procedunt per externam partem quatuor digitorum, & alligantur tendini superiori, quem extendere diximus. progrediuntur autem usque ad extremos digitos: neque desinunt in primo articulo, quemadmodum hoc in loco voluit Vesalius qui in hoc parum diligens fuit, cum his musculis obliquum duntaxat motum concedat. Sed scitote lectores candidissimi, meum esse inuentum hoc, neque quenquam ex his, qui de Anatome ante nos scripsere, hunc usum agnouisse. Non enim mouent hi musculi obliquo motu, sed quatuor digitos verè extendunt: atque ita extendunt, ut ab his magis extendantur, quàm ab aliis tendinibus: ut sensu oculorum à quouis in secundo perito deprehendi facile potest. Post hos decem sequuntur musculi in platea ossibus. nam singulis digitis bini musculi inditi sunt, qui ab initio pedij proficiuntur, finemque habent in primo articulo omnium quin-

Quatuor musculi pedis digitis inferuentes.

Musculus perforans.

Quatuor musculorum quatuor pedis digitos extendentium usus non aliis cognitus.

Decem musculi singulis digitis pedis bini inferuentes.

que digitorum, carnosus sunt, itaq; à natura efformati, ut flexioni pròptius obtemperarent: quod agunt, quando bini vnà mouent eodem tempore. cum verò alter ex his duntaxat agit, digitos obliquè trahunt intrò, & extrà. Postremus musculus extremo in pede positus, id est decimus octauus positus supra tarsum & pedion, ortum ducit à ligamèto, quod tibiam, & fibulam cum pede connectit. Est musculus latus, & subtilis desinens in quinque tendines, nonnunquam in quatuor. inseritur in omnes digitos externa in parte, digitos mouet obliquè ipsos extendens.

Postremus musculus pedis.

Decimi octauus pedis musculi usus.

Musculi cubiti feruientes.

Cubitus.

De Musculis, qui cubito deserviunt.

C A P. XXXII.

CUBITVS flectitur, & extenditur rectè, quicquid Galeno videatur de motu obliquo, quem nunquam in homine inuenies: neq; ego hac de re longo sermone contra Galenum disputabo: cum sensui pateat cubitum rectè extendi, flectique, & obliqui motus prorsus expertum esse. quod cum mihi in mentem venit, non possum satis mirari, quo pacto Galenus vir aliqui diligentissimus rem adeò absurdam, atque à veritate abhorrentem affirmauerit, cum in se ipso periculum facere nullo negotio potuisset. Musculi flectentes duo sunt, totidemque extendentes. Primus musculus est validus, qui sub cute conspicitur: & vulgo ab Italis dicitur Il pescerto. situs est in parte humeri interiore: exoritur à scapula duobus initiis distantibus, quorum

Musculi cubiti duo sunt extendentes, & totidem flectentes. Primus musculus cubitum flectens.

rum alterum nerueum est, ac teres, quod originem ducit à parte suprema supercilij acetabuli, quod in scapula cernitur. Incedit supra caput humeri, & per illam rimam præterlabitur, quæ sita est in hac parte superiori, quâ rimam natura huius tendinis gratia finxit. Alterum verò huius musculi initium egreditur ab ancyroïde processu, qui partim nerueus est, partim carnosus: carnosâ verò pars humero adhærescit, videturque conuiuentibus distinctus musculus, & separatus, qui humero opem præstet, illum versus pectus trahens. Deinde hæ duæ origines dicti musculi sub capite humeri vniuntur, & musculum crassum efformant propemodum teretem, validum, fibris rectis constantem, qui apud cubiti articulum in tendinē nerueum cessat: qui dum fini proximus est, dilatatur, radiōque annectitur, vbi is tuberculum internum habet ob insertionem huius musculi fabrefactum. Secundus exit ab osse humeri carnosus totus, fibrisque rectis, sub priore latitat, carnosus deferretur supra cubiti articulum, & in cubitum, ac radium infigitur. Horum duorum musculorum utilitas est, ut cubitum rectè flectant. Tertius è scapula prodiit parumper sub illius ceruice: per humeri posteriora deferretur, tendinēque constat suprâ lato: carnosus suo cum tendine in ὠλέκρانون tendit: atque illud etiam præterit. fibræ eius sunt rectæ. Quartus duobus initiis exit à ceruice humeri, cui multum adhæret, & cum tertio ad-

*Secundus cubi-
tum flectens
musculus.*

*Tertius cubiti
musculus.*

*Quartus cubiti
musculus.*

*Tertij ac quartij
musculi cubiti
usui.*

modum vnitur , adeò vt tertius cum quarto vnus solus musculus videatur multiplici origine constans : tamen duo reuera sunt. Demum hic quartus musculus ibi desinit , vbi tertium desinere diximus: fibras rectas habet. Munus amborum tertij inquam , & quarti est cubitum rectè flectendi.

*Musculi manuum
mouentes.*

De Musculis summam manuum mouentibus.

C A P. XXXIII.

Manus.

MA N V S (vt Aristoteles & Galenus in-
quiunt) organum est organorum: eiúsque
structura admirabilis est summum artificium præ
se ferens. Hanc Deus Opt. Max. homini concessit,
vt huius ope omnes artes exercere , seque ab
externis iniuriis tueri posset. de qua cum Galenus
vir eloquentissimus tam longo processu primo de
vsu Part. loquutus fuerit , hoc argumentum lubens
præteribo . Ego de summa manu mouentibus
musculis postremo loco verba facturum sum hanc
vnam ob causam, quòd , cum illorum compago
miraculi instar esse videatur, in calce de his loquendum
existimaui: vt memoriæ magis inhereant, quæ in
libri calce leguntur. Cum autem Galenus qui & ipse
miram hanc compagem vidit, & animaduertit, statim
in initio rem hanc tractauerit, non iniuria quispiam
huius mei ordinis causam quæret. Ne existimetis
me in finem hanc materiam reiecisse , quòd illius
oblitus fuerim , vt Galenus contigit libro de vsu
Part. de musculis femoris, quos obliuio-
ne præ

*Quare in calce
de extrema manu
musculis
dedita opera
tractauit.*

ne præteriit, sed ut superius attingi, dedita opera hætenus distuli, ut res pulcherrimæ, & maxime viles, lectorum mentibus magis hærent. Immo verò consulo, ut dum publicè in scholis fecantur corpora, hic ordo seruetur. nam hi muscoli diutius incorrupti perseverant, tum quòd dum vivimus, hos musculos magis exerceamus, tum quòd minus pinguedinis contineant. Hos musculos Galeni more in internos, & externos diuidam, ut eos, qui pedem mouent supra diuisi. Interni octo sunt, de quibus prius agemus: nouem externi. Interiorum summæ manus musculorum primus perelegans est: exoritur ab apice interni tuberculi, quod est in humero, exortu acuto, nerueoque: deinde carnosus euadit, & paruus, musculique veram formam refert. nam illi caput paruum est, venter latus, cauda (ut ita dicam) longa & angusta usque ad brachiale. hic musculus parum obliquè versus manum incedit, defertur per medium cubitum retrò magis, quàm sit longitudinis cubiti medietas. desinit autem in tendinem teretem, atque oblongum, qui supra ligamentum brachialis internum ambulat, quo prætergresso tendo latus efficitur, qui per volam extenditur, relictis tamen duobus montibus maioribus detectis. postremò in quatuor digitos inferitur. Verus vsus huius musculi est digitis flectendis auxiliari, & ut acuto sit sensu. Ergo si quid nocuum nobis manum cōstringentibus occurrat, id dictum, ac factum abiici-

Musculi extremæ manus in internos, & externos, diuiduntur.

Musculi manus interni sunt octo, Primus musculus manus interior.

Vola.

Primi musculi interioris manus vsus.

*Latrones carēt
ut plurimum
primo interiore
musculo manus*

*Secundus mus-
culus interior
manus.*

*Tertius interior
manus muscu-
lus.*

mus, priusquam læsio procedat, non autem est
usus, ut vola depilis fiat, quemadmodum aliqui
voluere. obseruavi in quibusdam furibus, ac la-
tronibus magni nominis ob præclara ipsorum
facinora, eos hoc musculo caruisse, licet tendo
adesset, qui exortum ducit à ligamēto brachia-
lis interno. Hoc primū Patauij obseruavi in
illustri fure Cotola dicto, dum Anatomen pu-
blicè profiterer. Idē Pisīs animaduerti in Tym-
panista Certaldensi, si rectè memini, & superio-
ribus annis Romæ idem vidi, & spectatores ad-
monui in presbytero Lucensi, qui furum Rex
meritò dicebatur, & propterea aureo torque,
diadema gestans aureum suspensus est, ut suarū
præclarissimarum virtutum præmia cerneret,
antequam ex hac vita migraret: exemplōq; suo
alios ad furta alliceret, qui furum regem viderent
in tantum honorem. Secundus egreditur
ab interno tuberculo humeri, principio in acu-
tum tendente, tum nerueo, tum carneo, cubito
adhæret, & per eius longitudinem progreditur
vsq; ad radicem brachialis: puluinaris instar cu-
bito præstō est: quum primū ad brachiale per-
uenit, in tendinem degenerat, & in quartum os
brachialis implantatur carneo, & nerueo fine.
Tertio origo est ab eodem loco, & incessus ob-
liquus iuxta radij longitudinem. cū verò ad
brachiale aduentat, in tendinem teretem, & va-
lidum exit, qui inseritur in os illud postbrachia-
lis, quod indicem fulcit. Vfus duo musculi, cum
vterque

uterque agit, brachiali flectendo dicati sunt, id est extremæ manui, cum verò alter tantum agit, obliquè mouet nunc sursum, nunc deorsum, duobus tamen musculis opem ferens, qui in exteriori parte siti sunt. Quartus musculus exortum habet admirabilem. nerueus etenim acutulusque nascitur ab interno humeri tuberculo, carnosus postmodum fit: & iuxta cubiti, radiq; longitudinem deferitur. vbi medium cubitum præterit, in angustum tendit, terminaturque in quatuor tendines reretes, nerueos, ac perforatos: qui sub ligamento brachialis deferuntur, sub quo tamen tres primi muscoli non deferuntur. terminum habent hi tendines in secundo articulo quatuor digitorum, quos flectunt: & quoniam tendinibus quinti musculi, ad tertium articulum quatuor digitorum penetrandum erat: propterea natura hos perforauit, qui neruei sunt, pulchri, pellucidi: resque est & spectanda, & admiranda. hoc autem natura sagax effecit, ut digiti ordine quodam sese consequerentur. Quintus musculus quarto multò validior est, neque mirum: quoniam huic maior etiam motus futurus erat, maiorisque momenti. Etenim quatuor digitos flectit, non quinque ut Gale. lib. de Vsu Part. primòq; de Anatom. administ. & lib. de Musc. voluit, quos & optimè constringit: nascitur prope quartum, sed maiori parte à superiore, interiorèq; cubito. later sub quarto, arctatur pederentim, & cubito adhærescit, antequam ad

Quartus manus interiorum musculus.

Tendines manus perforati.

Quintus manus musculus interior.

T

Quatuor manus tendines perforantes.

brachiale perueniat. exit demum in quatuor teretes, nerueosque tendines, & perforantes, qui denique inferuntur in tertium articulum quatuor digitorum, pollice excepto. tametsi Gale. primo de Administ. Anato. vnum ex huius musculi tendinibus ad pollicem tendere dixerit. Quod tamen verum esse in simiis deprehenditur, in hominibus nequaquã. Nam hominis pollex à proprio musculo flectitur, quem mox describemus. Quintus hic musculus (vt ad illum redeamus) hæret ligamento, quod diuidit musculos anteriores à posterioribus, quemadmodum

Sextus manus interior musculus.

in tibia. Sextus oritur à radio, ligamentoque illi adheret, quod interiores ab exterioribus musculis seiungit: per radij longitudinẽ iter habet: prope brachiale definit in tendinem teretem, & nerueum, qui transit sub copula carpi, vnã cum quarti, & quinti musculi tendinibus: deinde in vltimũ pollicis articulum inferitur quem flectit.

Septimus manus interior musculus.

Septimus carnosus emergit ab interno tuberculo humeri, & à superiore, interiorẽque cubito, obliquus repit, & in media longitudine radij terminum eius videbis partim carneum, partim nerueum, fibris obliquis constat.

Octauus manus interior musculus.

Octauus musculus quadratus est, positus prope brachiale, carnosus exoritur à cubito: & carnosus item in radiũ definit: fibras transuersas habet, situmq;

Musculi radii in pronum vertentes.

transuersam. Munus duorum musculorũ, quos suprã memorauĩ, septimi inquam, & octauĩ, est radium in pronum vertendi.

De

De Musculis externis, qui manui famulantur.

*Musculi manus
externi.*

CAP. XXXIIII.

Ex his, qui primo occurrit carnosus, & nervus: prodit ab externo humeri tuberculo: deinde carnem induit, & crassescit, inter cubitum, & radium incedit, donec ad brachiale accedat: nunc in quatuor, nunc in tres tendines teretes, & nervos tendit, qui per sinū pertransiunt, qui est in appendice radij: colligantur vero ab vno ex iis ligamentis, qui à dicta appendice oriuntur. Hi tendines, quos dixi, procedendo lateuadunt: & finiuntur à primo vsque ad tertium articulum quatuor digitorum, id est, in indice, medio, anulari, atque auriculari. Quum verò tribus tantū tendinibus præditus est, auricularem digitum tendinum expertem demittit. sed frequentius quatuor tendinibus munitū inuenies hunc muscolum, quàm tribus: qui tendines vsque ad extremos digitos sub vnguibus progrediuntur: neque tamen eorum radicibus inferuntur. atque hæc illa causa est, quamobrem tantus dolor excitetur, si quid carnem, & ungues intercedat, vt verus est verbum: sed dolor carnē, & ungues non interiacer, sed inter tendines, carnēque. Idem fit ab aliis tendinibus extendentibus. Atque hoc à nobis primo scito fuisse animaduersum. Vsus huius musculi est, vt quatuor digitos extendat. Secundus ab eodem tuberculo emergit prope primum principio acuto, nervo quoque, defertur inter primum, & cubitū iuxta eius lon-

*Primus manus
externus mus-
culus.**Primus manus
exterior muscu-
lus mittit ten-
dines ad tres
tantum medios
digitos.**Causa doloris
ingentis in so-
lutione continui
inter carnem et
unguem aliis
ignota.**Secundus ma-
nus exterior
musculus.*

T ij

Musculus minimum manus digitum à ceteris deducens.

Tertius manus exterior musculus.

Tendo manus bifidus.

Quartus manus exterior musculus.

Quintus manus exterior musculus.

gitudinem, & versus brachiale. Terminatur autem in tendinem teretem, nerueumque, qui nō nunquam bifidus est: defertur supra brachiale inter radium, & cubitum: inseritur in minimū digitum vsque ad extremum eius. hic musculus est admodum teres, eius vsus est minimum digitum à reliquis abducendi, nobisque vsui est non mediocri ad palmam gignendam. Tertius carnosus prodit medio cubito plus minus, quo loco cubito inest linea oblonga, & aspera, facta ut tribus musculis exortū daret. situs huius musculi tertij obliquus est: terminus eius est tendo teres, qui in indicem inseritur, ut indicet, id est indicem obliquè extendat. at tendo, quem dixi, à radij appendice ligamentum fortitur: atque hic tendo bifidus est in nonnullis. Quartus principio carneo à cubito egreditur penes tertium, qui & ipse est obliquus: defertur supra radij appendicem: desinit in teretem tendinem, nerueum: inseritur in tertium articulum pollicis, quem extendit, atque ab aliis multum abducit: hoc enim vsu constructus fuit. Quintus profilit ab eadem cubiti linea prope quartum, longo carneoque principio, cuius progressus obliquus est pollicem versus. hic musculus varias habet inscriptiones, & in varios tendines desinit. Quamobrem, si quis ex multiplici musculorum numero voluptatem perciperet, (ut cōplures hoc ingenio sunt) posset ex hoc vno musculo tres, & quatuor efficere. sed profectò, v

liberi

liberè dicam quod sentio : vnicus mihi musculus videtur esse , qui supra musculum bicornem deferitur: dehiscit verò in quatuor, & quâdoque in quinque tendines , quorum vnus ad tertium pollicis articulum procedit, alius ad secundum, alius ad primum, quartus ad os brachialis , quo pollex fulcitur : & nonnunquam hoc loco præter prædictos tendines alij duo inueniuntur. Vtus est extendendi pollicem. Sextus ortū ducit à radice externi tuberculi humeri : cubito connectitur , quem & amplexatur , & per eius longitudinem perreptat: quum verò ad carpum peruenit, degenerat in tendinem teretem , nerueum, & validum, qui deferitur supra cubiti appendicem in sinum quendam iuxta styloïdem (est autem stylois cubiti processus) ab hac suū ligamentum suscipit, quod transuersum est , inseritur deinde in os illud postbrachialis , quod minimum digitum sustinet, & non multò procul à brachiali. Septimus , quem bicornem appellant, carnosus longa linea ab inferiori humero supra articulum oritur : & supra radium repit: circa medium radij desinit in tendinem validum, crassum, bifidumque , cui propterea bicornis nomen impositum fuit : qui postquam supra brachiale iter fecit , inseritur in ossa postbrachialis , à quibus index , & medius fulciuntur. Hi duo muscoli , quos proximè dixi , extremam manum extendunt, vel ita dicamus , brachiale tunc extendunt , cum vterque operatur.

*Musculus pollicem extendens.
Sextus manus exterior musculus.*

Stylois processus.

Septimus manus exterior musculus.

Tendo bifidus, & bicornis dicitur.

Musculi extremam manum extendentes.

T iij

*Motus manus
furfum, & deor-
fum.*

*Motus manus
in orbem.*

*Octauus manus
exterior mufcu-
lus longiffimus
nuncupatus.*

*Nonus manus
exterior mufcu-
lus.*

ὠλέκρῶνον.

*Mufculi manū
fupinā reddentes,
ac radium
exterior mouē-
tes.*

*Mufculi extre-
mæ manus v-
nus & viginti.*

Primus extre-

Cum verò feptimus vnà cum fecundo ex inter-
nis agunt, aliis duobus cedentibus, manum ob-
liquè deorfum ferunt. at fepto vnà cum tertio
ex interioribus mouente, tunc manus furfum
obliquè fertur. atque hic primarius eft eius vfus.
fecundarius autem extremam manum, vel car-
pum circumuertendi: quem morum edunt,
quando ita conueniunt, vt vnus aliū immediatè
in agendo febfequatur. quamuis hic vfus ab a-
liis prætermiffus fuerit: propterea quòd illis igno-
tus extiterit. Octauus mufculus, cui nomen lon-
giffimus, qui proficifcitur ab humero, origine
carnea, fupra exterius tuberculum: incedit fu-
pra radium obliquè, membraneoque tendine
in radij appendicem inferitur. Nonus prodi-
t à copula, quæ cubitum humero connectit, & à
fuperiori parte cubiti, quam ὠλέκρῶνον vocant ob-
liquus progreditur, totus carneus eft, immitti-

tur in mediū radium. Hi duo mufculi manum
fupinam reddunt: mouētque radium exterius

De Mufculis in extrema manu pofitis.

CAP. XXXV.

MVSCVLI extremæ manus funt vnus, &
viginti, neque plures vnquam, pauciore
tamen aliquādo funt, decem fcilicet, & nouem
quorum feptem (fi vniuerfi effent viginti, & v-
nus) pollicis deferuiūt: fi nouē & decem, quinq-
duntaxat: minimo digito quatuor famulantur
reliquorum verò vnicuique tres opem ferunt, v-
nūsq; lato tendini. Primus eft mufculus paruus
trans

transuersus, supra Veneris montem positus, à *ma manus mu-*
 membrana carnosà exoriens fibris carnosis re- *sculus scripto-*
 fertus est, & inseritur in tendinem latum, què ut *rib. ignotus.*
Veneris mons.

dilaret, constructus fuit. hunc musculum ani-
 maduertas. nam neque ex veteribus quisquam,
 neque Vesalius hùc musculum nouit. Quatuor *Quatuor extre-*
 alij sequuntur longiusculi, graciles, teretes, qui *mae manus mu-*
 egrediuntur à tendinibus quinti musculi inte- *sculi.*

rioris, qui flectit tertium articulum quatuor di-
 gitorum. Hi positi sunt in vola, penes primum
 quatuor digitorum articulum. Desinunt autem
 in teretem & nerueū tendinem, & per internos
 digitos delati iuxta eorū longitudinem, adhère-
 scunt tendinibus primi musculi exterioris, à qui-
 bus quatuor digiti extēdebantur, & in tertium
 articulum suis finibus immittuntur, non autem
 in primum, quemadmodū Galenus & Vesalius *Galenus & Ve-*
 voluere, qui musculos quidem cognouere, sed *saliy inscitia.*
 illorum insertionem, & vsum ignorarunt. nam
 inquiunt adduci ab his quatuor digitos, polli-
 cem versus. Ego verò assero ab his ipsis, licet in
 interiore parte positis, nihilosecius quatuor di- *Musculi qua-*
 gitos extendi, meliùs quàm à priore exterior- *tuor manus di-*
 rum, vel tantundem, quemadmodum in sectio- *gitos extenden-*
 neprehenditur. Interiùs autem siti fuere, *tes.*
 eò quod natura periculum imminens eorum
 viderit, qui exteriùs sunt. Vnde sæpe euenit,
 vt exterioribus digitorum tendinibus incisis,
 digiti adhuc extendantur. Quod cum accidit
 medicis quibusdam Anatomicæ artis ignaris,

T iij

*Sextus extre-
ma manus mu-
sculus.*

Metacarpion.

*Musculus auri-
cularem digitū
ab aliis abdu-
cens.*

*Septimus extre-
ma manus mu-
sculus.*

*Octauus extre-
ma manus mu-
sculus.*

*Nonus extrema
manus muscu-
lus.*

*Musculi Mar-
ti montem di-
ctum constitue-
tes.*

vſuſque priuatim horum quatuor mufculorum, ſe mirè efferunt, quippe quibus miraculi inſtar illius vulneris curatio ſucceſſiſſe videatur. Sextus exit à ligamento brachialis, & à quarto inſuper oſſe eiufdem, Veneriſque montem conſtituit: per inferiorem metacarpij partem progreditur, eſt ferè teres, in tendinem finit, qui in primum os auricularis digiti implantatur. Eius vſus eſt, vt paucis abſoluam, hunc digitum ab aliis abducendi. Septimus oritur à brachiali, poſitus eſt in ſuperiori parte, muſculus eſt carnoſus totus, & in ſecundum os pollicis deſinit. Octauus prope ſeptimum emergit carnoſus & ipſe, volam verſus poſitus eſt, tendine per exiguo inferitur in ſecundum os pollicis. Nonus ſub ſeptimo oritur ab eodem carpi ligamento, totus carneus eſt, & in primum articulum pollicis finē habet. Hi tres muſculi eam carnoſam pollicis partem conſtituunt, quam Chiroman- tiam profitentes montem Martis appellant: trahunt pollicem verſus ipſorum originem. Tres alij ſequuntur, qui prodeunt ab oſſibus poſtbrachialis indicem medium, & anularem fulcien- tibus: ſitu obliquo ſunt, vel tranſuerſo potiùs, ſiti ſub linea vitali dicta. hi deſinunt in ſecundum pollicis articulum. principium verò illorum ſemicirculare eſt. De his tribus dico ego, poſſe quempiam eos vnum dūtaxat muſculum dicere, quòd lato eſſet principio, ſine acuto, fibrifq; variis eſſet intertextus. Sed ne data opera

roties

toties à Vesalio dissentire videar, ego quoque tres esse aio : liceat tamē cuique per me hos tres vnum dicere. horum, vel huius vsus est pollicem flectendi volā versus : aliorum verò trium, quos antea memorauimus, munus est eundem extendendi, & procul ab aliis efferendi. Septimus pollicis musculus scaturit ab osse metacarpij, cui ossi index innititur, spatiūmq; illud occupat, quod est inter pollicem, indicēmq; transversum situm obtinuit, & in os pollicis inseritur. partes huius musculi sunt hæ, vt pollicem versus indicem trahat, atque indici superponat. Octo insuper alij musculi præter dictos inueniuntur ab ossibus postbrachialis exorti, illisque adhærentes, qui in primos articulos quatuor digitorum demum insertionem habent. Ex hisce musculis duo vnicuique digito contingere, præter pollicem, in quem nemo ex his octo inseritur. Vsus eorum est, cum duo ex his agunt, simul, vt primum articulum, in quo inseruntur, rectè flectant. Sed cū vnus duntaxat agit: motum obliquum efficiunt flectendo. Hos musculos faterur Galenus ingenuè primo de Anat. administ. se diu ignorasse, & tandem in eorum cognitionem deuenisse.

Musculi pollicē flectentes, extrinsecus, ac ab aliis efferentes.

Septimus pollicis musculus,

Musculus pollicem versus indicem trahens, illique superponens.

Octo alij musculi manus digitis inseruientes, quorum nullus datur pollicis.

Musculi manus digitos & rectā, & obliquè flectentes.

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber Sextus.

DE IECORE, ET VENIS.

*Iecur, seu hepar**Iecur primum
omnium mem-
brorum in ani-
mali generati.**Iecoris situs.**Iecoris ligamen-
ta duo.**Hominis iecur
non dividi in
lobos.
Galeni error.*

IECUR, siue Hepar inter principes nostri corporis partes adnumerari nemo sanæ mentis ambigit. Sed illud scitu dignum est, iecur primum esse membrum, quod in nobis gignatur. Cùm primum enim nata est umbilicalis vena, illi tum primum hepar adhærescit. Situm est autem in dextro abdominis latere sub mendosis costis, quo loco duobus ligamētis adnectitur, quorum alterum circa cauam est venam, alterum suspensorium dicitur, à quadam ortum diuisione, in qua vena umbilicalis inseritur. Hæc itaque septo transuerso affigunt iecur, quod quanquam in dextro sit latere (vt iam dictum est) nihilo secius magnam quoq; sinistri partem occupat, vbi validi ligamenti ope diaphragmati connectitur. Si hepatis figuram quæris, tantum non exactè spherica est, & in homine integrum existit, non in lobos diuisum, vt Galeno placuit, licet

licet illius modi in quadrupedibus reperias. Causa verò quamobrem in nobis integrum, in illis diuisum sit hepar, ea est, quòd cùm recta figura à Deo Opt. Max. donati simus, caua sui parte ventriculū immediatè tegit. nam à dextra in sinistram tegens, vniuersam anteriorem regionem occupauit, effecitque ne ventriculus algeret. Quocirca qui cartilagini mucronatæ calida admouent vnguenta, existimantes oris ventriculi intemperiem frigidam, hisce præstidiis sublatam iri, viderint, quàm prudenter id agant, iecoris præcalidi membri xiphoïdi substrati feruorem adaugentes. Sed ad rem redeamus. Sectum fuit iecur quadrupedum in lobos complures, vt illorum ventriculū instar digitorum manus amplexarentur, quod, si integrū esset, illis pronis incedentibus effici nullo pacto posset. In auibus autem, quippe quæ rectæ potius stant, quàm in terram sint pronæ, in duas duntaxat partes secatur. In homine igitur nusquam diuiditur iecur, nisi anteriore in parte, atque in extremo iecore: idque necesse fuit ob venam vmbilicalem tantisper diuidi, vt illi adiutū præberet. sub hac, vbi vena porta exit, binæ, exiguæq; adsunt eminentiæ, ne vena à vertebrarum corporibus comprimeretur, pernecessariæ. has autem eminentias neq; lobos, neque fibras, neque pinnas dixeris. Habet hepar partes duas, anteriorem scilicet, & posteriorem: gibba exterior est, & lauis, interior caua, & as-

Quare nostrum iecur non diuidatur.

Topica remedia cartilagini mucronatæ temere adhiberi.

Quare quadrupedibus animalibus diuisum iecur datum sit.

Auium iecur in duas tantum partes secari.

Vnica diuisio hepatis humani quare facta sit.

Eminentie duæ sub caua vena.

pera instar rupis: idque quoniam ei gibbus subest ventriculus: tenuissima peritonæi membrana, in quam sextæ neruorum cerebri coniugationis ramulus inseritur, circumdatur hepar.

Membrana iecur inmensa, cuius merito iecur sentit.

Quæ sit iecoris substantia.

Concupiscibilis virtus in iecore.

Naturales spiritus in iecore non gigni.

Sanguinem in iecore tantum, & non in corde contra Aristot. sententia gigni. Iecur sanguinis fons.

Venæ portæ origo.

Falsa Vesalii opinio.

Porta venæ ab Hip. appellata.

Primus venæ portæ ramus ad superiorem ventriculum deferatur.

Propterea superficietenus non est sensus expers. Substantia eius nihil aliud est, quam concretus sanguis venis compluribus, quibusdāque arteriis intertextus, membrum est permagnum, & veluti in abdomine rex. in hoc concupiscibilis virtus residet. Aliqui credidere ibi generari spiritus naturales, quam tamen sententiam non approbo, membrumq; est sanguificationi dicatū. neq; enim sanguis alibi gignitur, quicquid de corde scripserit Peripateticorum princeps Aristot. Est igitur iecur omnium venarum caput, fons, origo, & radix. huius caua parte vena oritur *σπληνική* à Græcis, quam portam Latini dicunt, quæ cum vena umbilicali continua est, licet Vesalio secus videatur esse. Portæ itaque venæ radices caua in parte iecoris per illius substantiam vario disseminantur, quæ crassæ sunt satis, præsertim quò ad tunicam attinet, & in vnicam duntaxat venam tandem coeunt, atque crassum truncum constituunt: quæ posteaquam inter perexiguas illas eminentias integra exiit, quas magnus Hippocrates portas appellauit, in multos ramos sub ventriculo diuiditur, quorum primum ad superiorem ventriculum. cuius rami pars eius longitudinem perrepat. alius verò orificium eius superius amplexatur

plexatur coronæ in morem. Idcirco coronalis hæc vena dicta est. Secundus portæ ramus inferiore ventriculum petit, ibique per eius longitudinem secatur. Huc verò missi sunt hi venarum rami, ut illorum sanguine ventriculus nutriretur. neque enim nutrirī chylo posset unquam vētriculus, quod crassus nimium existat, omnēque excrementorum genus in se cōtineat. excrementis autem ali nulla pars corporis potest, lienem tantum excipio, qui atrabilario humore alitur. Tertius portæ ramus ad omentum alendum pergit, ibique variè scinditur. Quartus ad lienem se confert, ut sanguinem melancholicum ab hepate ad ipsum deferat, estq; ramus satis insignis, & sub ventriculo fluit, quo loco natura multas illi glādulas substrauit, easq; vnā, ne corpora vertebrarum attingeret neue hīc comprimeretur, sursum attollitur, splenisq; longitudinem secat, eamq; ingreditur. Ab hac autem vena alia exoritur exigua in aliquibus, in aliis maior, atque adhuc in aliis maior. hæc superius ventriculi orificium versus scandit, atque hīc finem habet. Illud sciendū hanc quandoq; adeo in altum non ascendere. Vfus eius est, ut humorem acidum suscipiat, qui in liene gignitur, dum nutritur, atque huc demandatur, ut in nobis famem excitet, quo cibum capimus, cuius multis sæpe, magnisque negotiis præpediti obliuisceremur. Quocirca quibus vena hæc exigua est, hi facilius in ediam ferunt, quibus

*Coronali vena.
Secundus vena
portæ ramus,
qui ad inferiorē
ventriculū de-
fertur.*

*Ventriculū non
nutriri chylo,
sed sanguine.*

*Lienem tantum
excrementis a-
li, aliam verò
partem nullā.*

*Tertius vena
portæ ramus ad
omentum.*

*Quartus vena
portæ ramus ad
lienem.*

*Vena ab liene
ad ventriculum
humorem aci-
dum ad famem
excitandam de-
ferens.*

*Quamobrem ali-
qui facilius ali-*

*qui difficilius
famen ferant.*

*Qui pro diu-
turiore fame
in Syncopen in-
cidant.*

*Quintus vena
portæ ramus ad
intestinū colon.*

*Sextus ramus
omnium maxi-
mus ad graci-
lia intestina.*

*Septimus ad
rectum intesti-
num.*

*Singulas venas
cavitatem inte-
stinorum ingre-
dientes singulis
mēbranis ope-
rientibus esse
præditas in ex-
tremitatibus.*

*Quod nemo
adhuc cognouit.*

Quid sit chylus

verò maior, minus ferunt. Immò nonnullos inuenias, qui si edendi tempus, quanuis minimo interuallo prætereant, in syncopen incidunt.

Quintus portæ ramus ad intestinum colon mittitur. Sextus, qui omnium est maximus, ad intestina gracilia. Septimus ad rectum intestinum: atque hi præcipui sunt venæ portæ rami.

Ex quibus tres illi, quos ad intestina ferri diximus, cum in mesenterium peruenerunt, in mesaraicas dictas venas innumeras, ac penè infinitas scinduntur, quæ intestina non modò amplectuntur,

sed etiam ad internā vsque cavitatem perforant: quo loco natura sagax extremæ unicuique harum membranam apposuit, qualem in vesicæ cavitare extremis vteris apposuit: quæ lotio ad vesicam descendentem aditū præbent, prohibentque ne ad superiora amplius reuertatur.

Idem in extremitate harum mesaraicarum, quas innumeras diximus, effecit natura. Quod à nemine, quod sciam, adhuc animaduersum est: licet omnes vno ore dicant factas fuisse mesaraicas, ut chylum ab intestinis exurgerent: in eo tamen parum diligētes fuere, quod finem earum persequi neglexerint: ut magnam naturæ industriam facile perspicerent: quanta scilicet arte effecerit, ut hæ venæ chylū facile suscipere possent. ne autem egrediatur, membranulæ illæ prohibent. Est autem chylus conuersio cibi, potusque in materiam lacti persimilem, qui posteaquam ventriculum prætergressus est, per intestinorum

finorum anfractus traditus descendit, donec
 exugant quidquid est succi plenum. & quoniā
 huic muneri neque quatuor, neque decem ve-
 næ sat erant, eas natura innumerabiles genuit,
 atq; hæ in superioribus intestinis multò amplio-
 res, ac frequentiores existunt. descendentes au-
 tem sensim rariores, minorésque euadunt. neq;
 enim tanta erat in vltimis intestinis necessitas,
 quoniā chylus in fœces, (hoc est in durum ex-
 crementum) iam redactus erat. Adhuc descri-
 bendus est ramus alius, qui tamen inter venæ
 portæ ramos connumetatur, at ab eo originem
 ducit, qui lienī dicatur qui parte læua per me-
 senterion descendens extremum rectum inte-
 stinum petit, venāsque gignit hæmorrhoidales,
 quibus duntaxat potest à melancholico humo-
 re vindicari. Atque hæc de venæ portæ origi-
 ne, atque descriptione sat sunt. Vñs verò tum
 venæ portæ, tum ramorum eius est, vt chylum
 ad iecoris concauum deferat, ac per eius substā-
 tiam dispergat, vt ab ea coquatur, & in rubrum
 sanguinem, qualis ipsa est, conuertatur: qua in
 coctione duo gignuntur excrementa, bilis in-
 quam tum citrina, tum atra. Ex quibus flaua-
 bilis, cū sit igni similis, à vesicula, quam in
 iecoris concauo natura locauit, suscepta est. sed
 melancholicus succus per quartum ramum de-
 missus est ad lienem, vt nutriatur. Et quamuis
 ob chylum deferendum hæ venæ genitæ sint,
 tamen fuit alius insuper vsus non minus neces-

*Quo pacto chy-
 li distributio
 fiat.*

*Quare vene in
 superioribus in-
 testinis plures,
 ac maiores con-
 stitutæ sint.*

*Hæmorrhoida-
 les vene.*

*Venæ portæ, e-
 iusque ramorū
 vsus est chylum
 ad iecoris conca-
 uo deferre.*

*Bilis utriusque
 generatio, & se-
 paratio.*

*Venarum du-
 plex vsus.*

Quæ vena sanguificandi virtute careant. Galeni error.

Omne alterans in sui colorem alterandum alterat.

Omnia cibaria à ventriculo alba reddi.

Testes sanguinem conuertunt in album semper.

Mammillas convertunt sanguinem in lac.

Vena concava chyli, et magna dicta.

sarius, vt sanguinem scilicet deferrent, qui mēterio, ventriculo, intestinis, omētóque alendis esset. Sed illud adnotes velim hisce venis sanguificandi uirtutem nequaquam adesse, vt Galeno placuit quarto de Vsu Part. meæ autē sententiæ is faciliē subscribet, qui tenuem venarum tunicam, albāque substantiam diligenter animaduernerit. Quo enim pacto sua ipsarum tenuitate, atque albedine chylū album, crassumq; in rubrum, tenuēque sanguinem verterent, cū præsertim illud natura comparatum sit, vt vnumquodq; corporis nostri membrum, quum aliquid conuertit, in sui ipsius colorem trāsmutet? Idcirco ventriculus, licet alba, rubra, flaua, viridiq;, & aliorum colorum dapes esitemus, nihilominus in colorem vnum, eūque candidissimū omnia conuertit, idq; propterea quod is est substantiæ suæ color. Ita in testibus conspiciaberis, qui rubrum sanguinem, quod albi sint, in album colorem conuertunt. ita & māmilla sanguinem rubrum in album lac trāsmutant. In parte verò iecoris gibba, vbi maiorem, crassiorēque substantiam eius videre est, vena enascitur, quæ cōcaua dicitur, chylis, magnāq; est enim aliarum omnium nostri corporis venarum mater. huic variæ sunt radices crassæ, & magnæ, quæ in huius substantiam à summo ad imum inferūtur, quæ amplam, quam diximus, venam tandem constituunt, suprà caput versus, infrà ad pedes extenditur, &, vt ita dicam, ramificatur.

mificatur. Huic eidem venæ fluminis quoque
 fimilitudo accommodatur. quemadmodum e-
 nim è flumine riuulos manantes sæpe videmus,
 ita complures riuuli ab hac vena deriuantur, seu
 varij ab hoc trunco rami, qui quidem per vni-
 uerſum corpus panduntur, vt ſanguinem iam à
 iecore paratum, atq; elaboratum deferat. Nam *Quid ſit vena.*
 venæ nihil aliud ſunt, quàm vaſa concava ex te-
 nuī quadam ſubſtantia conflata, vt ſanguinem
 ad ſingula membra deferant, ſabrefacta. nam
 ſanguine alitur omnis pars noſtri corporis. Sed *Omnēs corporis*
 ad rem redeamus. Hæc vena concava dum ſu- *partes ſanguī-*
 pra iecur caput verſus aſcendit, tranſuerſum ſe- *ne ali.*
 ptū perforat, quo loco diſtat à corporibus ver-
 tebrarum, eòq; loco duas emittit venas, quæ in
 ramos ſciſſæ per ipſum diaphragma diſtribuun-
 tur. quod poſtquā effecit, vena caua immēdiatē
 ferē dextræ cordis auriculæ occurrēs panditur,
 cum hac cōnectitur dextri cordis ventriculi o-
 riſcium ſuperficietenus vndiq; complexa, ne-
 que in illum intrō fertur. Quo loco venam pa-
 rit, quæ cor circumdat, ramificatur, atque illud *Coronalis vena*
 coronæ inſtar amplexatur. propterea vena coro- *cordis.*
 nalis appellatur. Caua vena aſcēdens verſus ca-
 put ſupra pulmonem ſcilicet fertur, ibiq; à ver-
 tebris diſtat, & ſupra cor non exiguo interuallo
 (non prope cor, vt Galeno viſum eſt ſecūdo de
 Ratione vict. in acutis) *ἀφ' ὧν*, id eſt, venam ſine *Vena ſine pari*
 pari, ac coniuge nuncupatam parit, quæ quan- *exortus.*
 uis in dextro ſit latere, tamē è media parte, ſive

Vena intercostales.

Vena à vena sine pari ad sinistram latus arteriam demissa.

Vena vertebrae ac spinale medullam nutriendas.

Axillares venae.

ex centro concavae venae initium sumit, quae reflectitur iuxta corpora vertebrarum, & usque ad extremum thoracem descendit, sed per intervalla costarum dextra, laevaue suos mittit ramos earum partium nutriendarum gratia. & licet in dextro sit latere truncus, tamen sub pulmone, oesophago, magnaue arteria ramos ab eo trunco exortos ad sinistram partem alendam dimittit. Ab eodem dextro trunco, dum reflecti incipit, ramus alius exit, qui sursum ascendens ramos mittit superioribus intervallis supremarum costarum alendis dicatos, neque solum in dextris, sed in sinistris quoque, aliquos tamen excipio, sed perpaucos, quibus sinistra parte ramulus adest ab axillari ortum ducens, qui nunc ad duo, nunc ad tria costarum intervalla, & quandoque ad vnum dumtaxat defertur. Ex hisce venis omnibus intervalla nutrientibus aliae oriuntur venae, quae inter vertebram, & vertebram ingrediuntur, ubi adsunt foramina ob nervorum exortum. alunt autem haec venae spinalem medullam, & vertebrae: deinde foramen ingrediuntur, quod post vertebrarum corpus situm est. Ab his, antequam spinalem ingrediantur medullam, ut eam nutriendas, ad dorsales musculos, & ad cutim venae mittuntur. Supra venam sine pari, ascendit caua super asperam arteriam usque ad iugulum recta: atque ibi duas magnas emittit venas axillares dictas, quod sub axillam traeseant, quae thoracis cauitatem inter iugulum, & primam

nam costam prætereunt. Deinde ex se venam promit humeralem, vel cephalicam, & capitalem dictam, quæ tamen summum humerum non ascendit: sed potius ad internam regionem defertur, inter primumque & secundum humeri musculum transiens ad externa tendit, ibi superficialia efficitur. nam ubi membranam carnosam præterit, inter hanc, & cutim ad cubitum vergit, delata extrorsum prope primum musculum, qui cubitum flectit: apud cuius flexuram in duos ramos secatur, quorum alter internum cubitum petit, & ubi à flexura eius discessit, cum alio id genus basilicæ ramo unitur. ex quibus duabus fit vera communis vena. alter verò ramus humerariæ in externo cubito superius & exterius ramulos quidem multos propagat: sed tadem præcipuus ramus supra brachiale, extremamque manum inter minimum digitum, & anularem tendit, atque hinc diuisus ad utrumque digitum fertur ad summum usque ipsorum. Hanc venam tum Arabes, tum qui praxim exercent ferè omnes saluatellam nuncupant, cuius sectionem in affectibus lienis mirè aiunt prodesse. Sed quantum missio sanguinis è saluatella in splenis morbis auxiliari possit, ego sanæ mentis lectori iudicandum relinquo. Posteaquam axillaris vena è cavitare thoracis emerit, &, quam dixi, venam genuit, sub iugulo apud Anchiroïdem scapulæ processum profundè immergitur, quo loco ramos cõplures profert, qui primum bra-

Vene cephalicæ, humeralis dictæ origo.

Quo loco cephalica cum basilica unitur. Vene communis vera constitutio.

Error Arabum de vene saluatellæ sectione in lienis affectibus

*Venarum in fac-
minis ramillas
nutrientium
exortus.*

*Vena basilica,
iecoralia, hepa-
ticaque dicta,
interna ab Hip.
appellatur.*

*Vena communis
quare dicta.
Mediana vena.*

*Prope humera-
riam venâ mi-
nimè, verû pro-
pe basilicam ef-
se neruum.*

chij muscolum enutrient, neque hunc solum, sed scapulæ secundum, secundum quoque thoracis, quartumq; & septimû humeri, & scapulâ ipsam, & vsq; ad abdomen. Præter hos in fœminis alij rami ad mammillam alendam se conferunt. Hæc axillaris vena ad humerum delata sub primo musculo cubitum flectere, tres in venas, atque illas insignes diuiditur, quarum vnâ basilicam dicunt iecorariam, hepaticâve, Hippocrates cubiti internam vocat. hæc, quam altius penetrare diximus, fit sensim superficialia, & extremo humero accedit: ac ubi cubitus flectitur, humerariæ instar in duos diuiditur ramos, quorum vnus interno cubito cum humerariæ ramo vnitur: quo loco efficitur cõmunis vena. communem autem dicunt, quod vtriusq; venæ sit particeps. qui illam constituunt rami, medianæ appellantur, quos semper ferè vulgo secant. Sed hic animaduertendum est, prope humerariam, atque eius medianam, neruum adesse nullum, quemadmodû prope basilicam. Alius ramus & ipse per exteriorem partem diffunditur, varièq; coniungitur. nunc enim cum humerariæ ramo: nunc cum communi anastomosim efficiens: tandem verò supra brachiale, postbrachialeque ramos mittit, tum ad mediû, tum ad indicem. Alia superficialia vena, qua cõmunis appellatur, medio & interno cubito obliquè supra radium fertur, variè scinditur, ramumque inter indicem, & pollicem, atque in-

ter indicem & medium mittit, ac in ipsorum finibus cessat. Hunc ramum in capitis affectibus secare consueverunt. Aliarū verò duarum magnarum venarum axillarium, altera profundè satis, quinque nervos subit: parūmq; abest, quin os humeri attingat, & ramulos emittit, qui duos musculos cubitum flectentes alant, deinde deorsum flectitur inter primū, ac secundum musculum: & supra flexuram cū transiit, in tres secatur ramos: atque hinc ad internos cubiti musculos ramulos mandat: dein altius penetrans ad brachiale inclinatur. hi sub ligamento vbi ad manus volā peruenere, surculos promunt iis musculis alendis dicatos, qui in extrema sunt manu, deinde singulis digitis venulas binas distribuunt, quæ à lateribus ad eorum extremitatem feruntur. alius autem ramus apud flexuram id ligamentum præterit, quod inter cubitum, ac radius positum est, & ad exteriores musculos distribuitur. Alia axillaris medio humero plus minus reflectitur ad posteriorem partem, ad duos musculos cubitum extendentes ramos relegans. Postmodum deorsum magis tendit ad musculum longissimum, ad bicornem, necnon ad musculos, qui ab externo humeri tuberculo, ortum ducunt, atque inter hos musculos disperditur. Eadem in regione sub iugulo, vbi est ortus axillarium, quatuor tenues

Vena in capitis affectibus secari solita.

Duarum magnarum venarum ductus.

Quatuor venæ ab axillariū venarū exortu ad abdominis musculos tendunt.

bus lateralibus penes costarum cartilaginem, hē deorsum vergunt, thoracēmque prætereuntes per rectos abdominis musculos descendūt, quæ in nonnullis mulieribus cum alia vena coniunguntur, quæ ex inferiore loco ad dictos musculos scandit. Hæ inter quartam, ac quintam costam nunc altiùs, nunc decliviùs descendentes

Vena quæ in viris anteriores abdominis musculos alunt in fœminis verò etiam lac generant.

exteriorem in partem se conferunt, in viris anteriores musculos nutriētes, in fœminis autem non modò ob hoc, sed ob lactis quoque generationem cum in mammis dispergantur. Reliquæ duæ deorsum latè supra concavum pulmonis iuxta mediastinum supràque pericardiū feruntur vnà cum nervis duobus, qui ad tendinē diaphragmatis feruntur. Altiùs aliquantulum emergunt quatuor iugulares venæ: ex quibus binæ internæ sunt, externæ reliquæ. Externæ supra iugulū immediatè pullulant venæ ad musculus *ἐπωμιά* delatæ, & post scapulam truncus per colli latera obliquè affurgens ramulos mittit ad musculos capiti inferuientes, ac post occipitium sursum ad capitis cutem apud eam partem iugularis externæ, quæ reliqua erat: suprà inferiorem maxillam se effert ante masseterem, & obliquè per mediam faciem fertur ad maiorem oculi angulum: quosdam etenim ramulos ad faciei musculos distribuit, in angulū verò venam supra orbitam mittit, idq; per musculus palpebram constringētem: & quod reliquum est, inter supercilia per frontem ad cutim

Vena capitis musculis inferioret, ac in reliquis capitis, ac faciei partes se diffundentes.

tim capitis ascendit. Illud adnotabis dextram venam in quibusdam inter supercilia cum sinistra iungi, deinde rursus seiungi. Alia iugularis vena est satis insignis, quæ sursum attollitur versus caluariæ basim per anteriora processuū trāsfuersorū vertebrarum colli penes asperā arteriā. Hæc, quam diximus, vena sub larynge ramum profert notatu dignum, cuius ramulis glandulæ musculiq; laryngis aluntur. Eadem vena sub inferiore maxilla variè diuiditur, tamen minor est diuisio huius cū accedit ad glādulas, quæ sunt sub aure, ad musculos hyoïdis seruientes & ad linguam ipsam: idque inferiùs. Medici iubent hanc secari in angina, reliquum venæ tum ad φαρύγγα distribuitur, tum ad eam tunicam, quæ os inuestit. Maior dictæ venæ truncus caluariā ingreditur per inæquale foramen, per quod sextum par neruorum cerebri descendit. Vbi verò ingressus est, ad posteriora conuertitur, atque in duram matrem immittitur. Verùm suam secum tunicam portat, & per occipitium ad summum penè lambdalis futuræ ascendit: quo loco dextra cum sinistra iungitur, & quæ dura mater duplex efficitur, à posteriore parte ad frontem ducitur parte suprema cerebri, in orbicularéque foramen inseritur inter frontem & ethmoïdes situm, parte capitis posteriore, vbi in vnum venæ coïbant, in duræ matris quadruplicationem admittitur. Indèque duæ venæ per vniuersam superiorum ventriculorum longitudinem pro-

*Venas supercili-
horū in aliqui-
bus dexterā cū
sinistra iūgi, ac
inuicē seiungi.
Venæ iugularis
versus caluariæ
basim processus.*

*Vena musculos,
glādulasque la-
ryngis nutries.
Vena quæ in an-
gina secatur.
Vena quæ ad
duram matrem
inseritur.*

*Vena cerebri
substantiam a-
lentes.*

Linon, seu torcular.

Vena mirabilē sinū constituēs.

Venarum in duram, ac tenuem membranā cerebri ramificatio, ac in cerebri substantiam ingressus.

Venas, ac arterias cerebri substantiam ingredi nemini hucusque cognitū.

grediuntur. huiusce ramuli cerebri alunt substantiam. **Q**uadruplicatio autem duræ meningis, quam suprà memoravi, & linon, & torcular appellatur, iacétque inter cerebrum, ac cerebellum. Vena verò per superiorem cerebri longitudinem vergens admirabilem sinum cōstituit. nam suprà semicirculum præ se fert, infra verò tres angulos habet, qui hoc in loco nūc paulò ampliores, nunc arctiores sunt. vario se modo diffundit, eiúsque rami postquam duram membranam perforarunt, per tenuem lati nūc fursum, nunc deorsum variis modis per illam totam ramificantur. at vbi tenuem prætergressi sunt ipsam substantiam cerebri ingrediuntur. quod dictum non dubito quin vobis nouū esse videatur, cū nemo istuc ipsum antea obseruauerit. Ego enim primus (absit verbo inuidia) obseruavi venas atque arterias cerebri substantiam introire. Sub hac substantia cerebri iugularis interna antequā craniū ingrediatur, venu-las per laterales partes ad musculos mittit temporales, in cranio verò ipso ad duræ matris latera iuxta iugulum. Hæc vena, venam aliam paruulam parit dum ascendit per transuersos processus vertebrarum cervicis, ac ramulos emittit, qui cervicis musculos alant : ea in aliquibus ab axillari exoritur. Vbi verò inter cervicis vertebrae exeunt nerui, hæc vena ad spinalem medullam ac vertebrae nutriendas properat : primam vertebrā eadem superequitat occipitium versus,

versus, vbi foramen cernere est, quod ad auditus organum penetrat, eoque ingreditur, vt hoc organum omne nutriat. Ab hac iugulari interna omnia ossa capitis, maxillæq; tum superior, tum inferior dentisque omnes nutriūtur. Quare nihil est quod alium venæ peculiarem ramū describendum expectes, qui dentes ipsos alat. Cava vena, postquam sub diaphragmate ab hepate tanquam à proprio exiit fonte, corpori vertebrarum dexteræ partis adhæret, quæ post exitum paulò infra hepar venulā ex sese procreat, quæ partes ibi adiacentes alit, & variè scinditur. Postmodum truncus deorsum inclinans duas venas, quas emulgentes dicunt, parit, quæ in renes terminantur. hasce solas semper esse caue existimes. In tres enim, quatuor etiam, & quinque nonnunquam diuisas esse comperies, licet hac de re scriptorum nullus adhuc meminerit. Sunt autem emulgentes tam in dextris, quàm in sinistris. Galenus longo verborum apparatu causas reddit, quibus natura dextram sinistra altiore voluerit esse. Sed cùm sensus cōtrarium prorsus attestetur, omnes illius rationes protinus corruant, necesse est, cùm ingeniosæ potiùs, quàm veræ existant. Equidem in brutis animantibus situm emulgentium venarum homini contrarium deprehendi, ita vt de brutis locutum fuisse Galenum tam perspicuum sit, quàm quod maximè Nos igitur hominis emulgentes venas describentes ita dicamus. A sini-

Vena, capitis ossa, utranque maxillam, dentesque nutriendis descriptio.

Cauæ venæ ductus.

Venas emulgentes in plures ramos scindi solitas a nemine animaduersum.

Galeni frustra in rationibus inueniendus de emulgentium situm laborasse quantum ad corpus humanum spectat.

*Emulgentium
venarum de-
scriptio.*

Renum situs.

*Cribra ab aliis
posita in renibus
non dari.
Galenii error.*

*Qui lapillus e
renibus ad vesti-
cā derivatur.*

*Emulgentium
venarum usus.*

stra igitur parte caux venæ sub ventriculo sca-
turit vena ampla satis, & longa, emulgens di-
cta, quæ supra vertebrarum corpus, arteriamque
deorsum fertur, per mediumque sinistrum renem
fluit (est autem is in homine non parum dexte-
ro superior, & hoc ob lienis paruitatem) quæ
illi non obstat, cum iecoris magnitudo plus lo-
ci occupans dextrum renem cogat esse inferio-
rem. postea verò quàm ad renem peruenit eo,
quo dictum est, pacto, eius corpus ingreditur,
ibi amplificatur, atque in ramos secatur, qui per
renis substantiam distribuuntur. Noli tamè ex-
stimare confici ex his cibum illud magni no-
minis, de quo Galenus tam multa, per quod lo-
tium percolari existimabat: hoc verò dilatato
sanguinem mingi. Hic natura membranas ap-
ponere poterat, quemadmodum mesaraicis, at-
que vreterum finibus: sed, quoniam hoc illi
commodius visum est, ex ipsamet renis substan-
tia quasdam eminentias procreavit, quæ in di-
ctos ramos ingressæ, obstant, quominus san-
guis, qui ad renes vnà cum serosa parte dedu-
citur, naturaliter delaberetur. Hoc tamen ob-
seruato, quod est pulcherrimum, cum natura
lapillus aliquis deorsum trudendus est, id ple-
runque tanta vi fieri, ut magnam vim sangui-
nis cum vrina demittat. vsus harum venarum
est, ut sanguinis serum, & pro renibus nutri-
mentum deferant. Ab huius venæ concauo vas
oritur, vreter, id est vrinarius dictus, ut pro-
prio

prio loco fufius dicetur. oritur inquam in ipfius renis corpore: hîc yrinam fufcipit, & ad veficam fert. In dextra parte eadem emulgens fita eft finiftra inferior, & breuior multò. nam inter cauam venam, & dextrum renem parum quid intereft: inferitur autem eo pacto, quo in finiftra dictum eft. Oritur à finiftra emulgente vena feminalis nuncupata, quæ obliquè sub peritonæo descendens fupra os pubis deducta in tefticulum inditur: quemadmodum apertiùs explicabitur, vbi de partibus geniralibus agemus. fed interim diligenter adnota ortum feminariæ venæ ab emulgente non efle, vt humor ferosus ad finiftrum tefticulum deferretur, quo maiorem in coïtu voluptatem pareret, ficuri plerique Anatomici in hoc parum prudentes credidere: fed vera caufa eft ipfa venæ exiguitas, quæ fi ex venæ cauæ corpore emerfiffet, vt dextra, quoniam illi fupra arteriam tranfeundum erat, periclitabatur, ne in magnis dilatationibus, ita vt fit, difrumperetur. quocirca prudens natura nō à corpore venæ cauæ, fed à finiftra emulgente finiftræ feminalis originem trahi voluit. at sub dextra emulgente apicis duorum digitorum interuallo ab ipfo venæ cauæ fonte effluit vena feminalis dextera, quæ primò obliquè descendit: deinde sub peritonæum fertur, deinde fuper os pubis: poftremò in tefticulum definit: quod in viris intelligas oportet. fecus enim contingit in mulieribus. licet enim origo fit eadem, & finis,

*Urinarium vas
vter uter appellatur.*

*Vena feminalis
ortus.*

*Falsa opinio a-
liquorum de ra-
tione ortus semi-
nariæ venæ.*

*Quamobrè non
à caua vena, fed
à finiftra emul-
gente feminalis
finiftra oriatur.
Dextram semi-
nalem à caua
nafci.*

*Differentia ve-
narum femina-
lium inter viri
& mulierum.*

tamen longitudo nō est tanta, neque summum
 offis sacri præterfluit: & in abdomine cessat. Il-
 lud verò magis miraberis sub feminali dextera
 ad quartam vsque lumborum vertebram nul-
 lam venam mitti ad superiora, sed ad inferiora
 duntaxat. à iecore nāmque ad hunc vsque lo-
 cum, inter vertebra, vbi exeunt nerui, vena ca-
 ua venas profert, quæ tum spinalem medullam,
 tum vertebrarum corpus nutriant. Quum pri-
 mum autem ad quartam vertebram lumborum
 caua peruenit, in duos insignes ramos diuidit-
 tur, qui obliquè super os ilij, pubis que delati ad
 dextrum, ac sinistrum crus iter habent. A qua
 diuisione primò venæ satis magnæ oriuntur,
 quæ deorsum latæ, primò versus anum se con-
 ferunt: vbi nāmque illa adhæsit offi sacro, ra-
 mos per ipsius foramen transmittit ad spinalem
 medullam, ad ipsum os sacrum & ad musculos
 in lumbis sitos, qui ab hoc sacro originem du-
 cunt. mittit insuper ramos ad natium musculos,
 qui femori deferuiunt. Ab iisdem ramis venæ
 illæ proficiscuntur, quæ in extremum rectum
 intestinum implantantur. Ab hac eadem vena
 prodeunt illæ venæ, quæ ad vesicæ latera profi-
 ciscuntur, vt ipsam, musculósque recto intesti-
 no deferuietes enutrient: idque in viris. nam
 in fœminis petunt ceruicis vteri principium, ex
 quo loco menstruæ illis effluunt purgationes, vt
 latius capite de vtero explicabimus. Idem ra-
 mus, qui vesicam, vteri ceruicem alit. & ipsa
 non-

*vena caua in
 quarta lumbo-
 rum vertebra
 in duas scindi-
 tur partes.*

*Distributio v-
 triusque rami
 caua venæ ad
 inferiores par-
 tes.*

*Ex quo loco mē-
 strua egrediā-
 tur.*

nonnunquam principalis diuifio venam gignit, quæ descendit, deorfumque lata eo foramine excipitur, quod in offe pubis, coxendicisque collocatum est, & ad nonum decimumque musculum femur circumagentes se recipit: vt eos nutriat. deinde ad septimum, deorfumque per internum femur spargitur, & terminum habet.

Animaduertendum tamen est vasa feminaria in mulieribus non finiri in testium capite, sed deorfum effundi, vt matricis substantiam alant.

Vasa feminaria in mulieribus quomodo constituta sint.

Ab his venis ortum ducit vmbilicalis vena, cui nostræ generationis exordia accepta ferenda sunt. Eadem venæ cauæ diuifio duas parturit venas dextram inquam, & sinistram, quæ sursum caput versus reflectuntur. Progressus earum est inter peritonæi diuifionem, supràque id sub rectis musculis ad secundam vsque ipsorum interfectionem in ramos, ac ramulos degenerantes distribuuntur, dictis musculis peritonæoque alimentum ferentes. Hæ sunt illæ venæ,

Vena vmbilicalis ortus.

Vene duæ peritonæum alētes.

quarum ope (vt magnus Hippocrates, & post eum Gale. scriptum reliquere) tantus est vteri cum mammis consensus in mulieribus, quas quandoque inuenies cum illis duabus venis vniri, quæ deorfum descendentes sub sternum collocantur in rectorum musculorum fine. in quibusdam parte vna duntaxat, aut duabus ramulo perexiguo coniunguntur. Illud verò reticere nullo pacto possum, me in nonnullis mulierum cadaueribus quacunque diligentia ad-

Vene per quas compatitur vterus cum mammis.

hibita, nunquam tamen harum venarum vnionem inuenire potuisse. Hoc insuper assero, has non proficisci ab vtero, sed ab ea diuisione, vbi eius venæ oriuntur, quæ non vteri substantiæ alendæ dicatæ sunt, sed ceruicem illius nutriūt.

*Per quas venas
menstrua put-
gentur.*

Per eas memstrua expurgantur : quemadmodum sæpenumerò vidi hisce oculis in aliquibus mulieribus, quæ violenta morte periere, dum adhuc illis menses fluere. neque in his modò, sed etiam in aliis quibusdam quibus instabant, & mox fluxuri erant, idque præsertim Pisis accidit, dum mulierem eiusmodi in publico theatro secarem: aderat discipulorum, ac doctorum magnus numerus: mulieri, cuius anatomicen profitebar, Sanctæ nomen erat, quæ cùm ante mensem geminos peperisset, eosque miseros vix in lucem proditos luce priuasset, ac suffocasset, eam iusti iudices suffocandam iusserūt. nam vt inquit poëta ille,

Non est lex iustior vlla,

Quàm necis artificem arte perire sua.

In hac igitur muliere Sancta nomine, reuerà autem dæmoniaca potius, & venefica, huiusmodi venæ, quæ in aliis non admodum magnæ esse solent, insignes erant, & nigerrimæ, & propterea satis perspicuæ. Quamobrem licuit spectatoribus per Sanctę cadauer in animum inducere, per quas venas fluunt menstrua, eas non transire per vterum. Sed si quis ita obstinatè oppositum sentit, vt neque si oculis cernat, quod dixi,

illi

illi suaderi veritas possit, ego nihil moror, ipse viderit. Ramus hic crassus diuisionis arboris venæ cauæ cum supra os pubis peruenit extra abdomen, fertur in inguina: & hic ramulos complures gignit, qui glandulas ibi positas nutriant, in quibus glandulis fiunt bubones. Ab eodem loco venæ emergunt, quæ per penem ambulant inter pellem, & carneam membranam vsque ad extremum præputij. eius rami etiam nescio qui per scrotum disseminantur. Ex eodem loco, vnde venas hæc omnes exoriri dicebamus, vena exit satis apparens, quæ obliquè ascēdit ad ilium os, & sub pelle graditur versus extremas costas, supràque abdomen diuersos in ramos scinditur, quas venas bonus Vesalius præteriiit. Ramus hic insignis, quem paulò antè memorauimus, postquàm inguen superauit, trimembris euadit: quorum vnus intra pellem & membranam carneam obliquè introrsum, versus genu descendit, supràque ipsum internè per crus descendens, supra internum malleolum progreditur ac supra pedem digitos versus, pollicem præsertim, ibique variè finditur. Hæc vena illa est peruulgata satis, quam saphenam dicunt, è qua in vteri affectibus sanguis mitti consuevit, in cuius descensu ramuli complures hinc inde mittuntur, cum vt cutem alant, tum vt pinguedo gignatur. Reliqui duo crassi rami à musculis recti feruntur, obliquè tamen per femoris interna descendunt, transeuntq; inter duo inferiora

Glandule in quibus bubones fiunt.

Vesalijs negligentia.

Vena saphena.

femoris capita: sub genu deferuntur, priùs tamen ramulos multos promittunt pro eorù musculorum nutritione, qui femur ambiunt, quà femur flectitur. A maiori autem, quem diximus, ramo vena assurgit, quæ sub cute primùm, deinde per posteriora tibiæ ad pedem vsque excurrit. sub eadem genu flexura alia vena pullulat, quæ anteriores musculos tibiæ, aliùmque etiam profundiorē nutrit, deorsum fertur, ligamentoque adhæret, quod est inter tibiā, fibulāque: vbi ligamentum perforat, & ad anteriora tibiæ serpit, ac descendens supra pedem cum pedis ligamento adhæret. Ramus maior adedò ima perit, vt sub planta pedis excurrat per internum malleolum, & in tibiæ regione, nec non sub planta variis modis ramos edit. Alius ramus notatu dignus diuiditur & ipse per musculos, & venam mittit sub duobus primis musculis post tibiā sitis, vbi tendo eius initium sumit. Hæc assurgit, & anteriora versus sub cutem fluit, & ad externum pedis malleolum trāsmittitur. hæc illa est vena illustris, quam sciæ siue ischij & coxendicis vocant, & in eius affectibus secant. Ramus ille, qui sub genu fertur, poplitis vena nuncupatur: cuius apud antiquos frequens fit mentio. A quibus venis, quemadmodum ab aliis superiùs descriptis, plures alij ramuli exoriuntur, qui à nobis de industria præteriti sunt. quæ venæ & quòd exiles admodum sunt, neque eundem in omnibus cursum tenent

*Vena sciæ, ischij,
& coxendicis vocata.*

Vena poplitæ.

nent, describi nullo prorsus pacto à nobis debebant. Igitur quæ de venarum historia breuiter à nobis hæctenus exarata sunt satis esse poterunt candido, benignoque lectori: si tamen illud addiderimus, hanc esse venarum vtilitatem, vt ad omnes corporis partes sanguinem pro nutrimento deferant. etenim membra omnia solo sanguine aluntur: propterea cauas natura pro-

Venarum vtilitas.

creauit venas dedita opera, vt instar riuulorum per corpus excurrerent. Substantia

Cuncta mēbra solo sanguine nutrir.

venarum tenuis admodū est, neruo-

Quare caue facta sint venæ.

saq; cōstat membrana: idq; non

Venarum substantia tenuis & nervosa membrana prædita.

temerè. Nihil enim Deus

Opt. Max. temerè a-

git, sed ne ita fa-

cilè disrum-

patur.

X

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber septimus.

DE CORDE ET ARTERIIS.

*Cor est inter
principes corpo-
ris partes, no ta-
men princeps
pars.*



*Cor spiritus vi-
tales in pulmo-
nibus elabora-
tos perficit.*

*Cor arteriarum
omnium radix.*

*Cordis situs cõ-
tra Arist. sen-
tentiam.*

*Corporis centrũ
umbilicus occu-
pauit.*

OR licet inter principes partes non numerari nõ possit, princeps tamen non est, vt Aristoteles cõsult, qui actiones omnes in corde collocauit. quod profectò vitalis caloris fons existit, vitalés-

que spiritus perfectiores reddit, posteaquam in pulmonibus elaborati sunt: quẽadmodum planius audies, quando de pulmonibus. eiusque actionibus mentio fiet: estque arteriarum omnium radix, fons, & origo, & quamuis in thorace à sagacissima natura cor situm fuerit, dimidiarum tamẽ thoracem neutiquam occupauit: neque in medio corporis situm fuit, vt Aristoteli placuit. nam centrum corporis occupauit umbilicus, quemadmodum tunc dicemus, cùm de fœtu agemus. Illud verò nullo tibi pacto in mentem veniat cor neruorum, aut venarũ principium esse. situs cordis in homine est in thoracis cavitare:

cavitate: ísq; obliquus, & si in brutis rectus existat, in homine supra septum transversum iacet, & illud tangit: sed in brutis non parum distat. basis eius est tantum non in dextro latere, at cuspis sinistrorsum. membrana inuoluitur satis crassa, nerueaque, quam cordis inuolucrum appellant, cuius usus est, ut cor contineat, colligétq; ne decidat, néue os pectoris, costasque, dum mouetur attingat. Appellant autem cordis motus, *Diastoles & systoles cordis motus.* tum diastolen, tum systolen, quod scilicet & dilateretur, & constringatur. Pericardium igitur hoc, quod diximus, à corde aliquantulum distat: quo loco aqueum quendam humorem natura collocauit, ut eo cor humectaretur. periculum etenim imminabat, ne absque hoc præsidio ob frequentes, ne perpetuos dicam, ipsius motus, qui etiam nobis fiunt inuitis, cor exiccaretur. Quem humorem non modò in uiuentibus, sed in mortuis quoque deprehendes: licet de hoc Curtius Papiensis dubitauerit: at ego hoc ita esse, non semel, sed sæpius in publicis, priuatisque viui canis sectionibus apertè ostendi ita, ut nullus ampliùs dubitationi locus relinqueretur. Hoc inuolucrum, indumentumue in homine septi transversi tendini validè cohæret. Scito præterea cor præter inuolucrum, quod dixi, propria tunica præditum esse, quæ ipsius substantiam immediatè contingit: sed inter cor, & pericardium non parua oritur pinguedo, quæ manifestè conspicitur, & cordi adhæret: quam-

Membrana cordis inuolucrum appellatur.

Diastoles & systoles cordis motus.

Pericardium.

Humor aqueus in pericardio.

Curtij Papiensis hæsitatio.

Cordis alia à pericardio propria tunica.

Cordis pinguedo.

*Gal. & Arist.
falsa opinio.*

*Portius Neapo-
litanus Aristot-
elem defendēs
experientia ut-
itur.*

*Pinguedinis
usus.*

*Cordis humani
figura.*

*Cordis substan-
tia.*

Cordis fibra.

*Cor non est mu-
sculus, ut Hip-
pocrati placuit.*

*Cor coronalis ve-
na sanguine nu-
trit.*

*Coronalis arte-
ria.*

uis Aristoteles, & Galenus asserant, neque circa cor, neque circa aliam quamvis calidam particulam pinguedinem ullam nasci. Dicebat autē Portius Neapolitanus Physicus, qui in Aristotelis verba nimis iurauerat, hanc, quā diximus, pinguedinem circa cor pinguedinem nullo pacto esse: huius rei testimonium locupletissimū esse, quod ipsa non eliquatur. Ego verò in theatro, dum Pisis publicè profiterer, nihil respondens pinguedinem eandem candelæ, quæ præstabat, eliquavi. quo viso cū mutire amplius non auderet, tacitus abiit, ac penè explosus. Erat autem ob continentem morum pinguedo ibi valde necessaria. itaque pinguedinem in compluribus corporis nostri partibus cernimus, præsertim circa oculos, temporalēsque musculos, ne partes exiccentur. Humani cordis figura pyramidem prorsus nō præ se fert, quemadmodum in brutis: sed depressum est potius cor in homine. eius substantia dura admodum, densaq; est, eiusmodiq; facta est, ut ne in validis moribus disrumperetur. Tribus generibus fibrarum cor præditum est, hoc est rectis, obliquis, & trāsversis, ut & traheret, & contineret, & expelleret. nullo autē pacto potest cor inter musculos connumerari: quamvis diuinus Hippocrates in libro de corde ipsum musculum esse dicere non erubuerit. Undique vena coronali circumdatur, ut eius sanguine alatur: cui arteria coronalis quoque dicta se sociam præbet, & nōnunquam binæ:

binæ: idque ut eius ope substantia vitalis caloris vivificetur. quare dubitare aliquis posset, atque ex dictis argumētum elicere satis validum, non in corde, sed in pulmonibus vitales spiritus gigni. Ego verò magis philosophis huiusmodi difficultates discutiendas relinquo. mihi etenim satis fore puto, si partes corporis quomodo se habent, earumque usum, quantum in me erit, verè descripsero. sed, ut ad cordis historiam redeamus: Dux insunt cordi cavitates, hoc est ventriculi duo, non tres, ut Aristoteli visum est. ex his alter à dextris est, à sinistris alter: dexter sinistro multò est maior. in dextero sanguis adest naturalis, at vitalis in sinistro illud autem observatu perpulchrum est, substantiam cordis, dextrum ventriculum ambientem, tenuem satis esse, sinistram verò crassam: & hoc rum æquilibri causa factum est, tum ne sanguis vitalis, qui tenuissimus est, extra resudaret. Inter hos ventriculos septum adest, per quod ferè omnes existimant sanguini à dextro ventriculo ad sinistrum aditum patefieri. id ut fiat facilius, in transitu ob vitalium spirituum generationem tenuè reddi: sed longa errant via. nam sanguis per arteriosam venam ad pulmonem fertur, ibique attenuatur: deinde cum aëre unà per arteriam venalem ad sinistrum cordis ventriculum deferretur: quod nemo hactenus aut animadvertit, aut scriptum reliquit: licet maximè sit ab omnibus animadvertendum. Præter hæc omnia,

Cordis ventriculi duo, non tres sunt.

In dextro corporis ventriculo sanguis naturalis, in sinistro vitalis continetur.

Substantia ventrisque cordis ventriculi.

Cordis septum. Vitalis spiritus generationemini adhuc animadvertit.

Cordis auricula

quæ hætenus dicta sunt, adfunt quoque circa cor duæ aliæ particulæ, quas auriculas vocant, quæ tamen auditus sensui nullo pacto sunt dicatæ. Sunt igitur eminentiæ binæ, membranosa, anfractuosaque, ex quibus altera dextra est, sinistra altera: & rursus altera maior est, altera minor: rursusque harum altera ad cauam venam, altera ad arteriam venalem appositæ est.

*Auricularum
cordis usus.*

*Quatuor in cor
dis basi vasa.*

Vena caua.

Vena arteriosa.

*Arteria aop-
træ.*

*Arteria vena-
lis.*

*Vena caua cor
non ingreditur.*

*Vena arteriosa
à corde non à
corde ortus.*

*Quare vena ar-
teriosa dicatur.*

harum igitur auricularum in cordis motibus non paruus est usus, ne scilicet dum cor mouetur, vena caua, venalisque arteria, quæ ipsa quoque venarum instar, constructa est, disrumperentur: nimis enim quandoque sanguine opplentur. Circa cordis basim, quæ lata admodum est, quatuor vasa conspicua sunt: duo ad ventriculum dextrum, duo item ad sinistrum: in dextero est vena caua, venaque arteriosa: at in sinistro adest arteria aoptræ, & arteria venalis. Neque tamen existimes id, quod multi sunt opinati, venam cauam hinc exoriri, ut iam dictum est in tractatu de venis. illa enim cor non ingreditur, ut falsò arbitrantur, sed cum scissa sit eo loco, lataque, dextri ventriculi orificio duntaxat adhærescit. Vena item arteriosa non à corde oritur, sed à iecore. quod verum esse facile perspicies, si animaduuerteris. nam, dum in utero matris fœtus latitat, si eius introspeciamus, comperiemus cauam venam cum vena arteriosa continuam esse. Igitur quatenus vena, ab hepate ortum ducit: at quatenus arteriosa, ex corde, est enim cor arteriarum omnium

omnium principium. Hæc ad pulmonem incedit, ut ad illum sanguinem ferat, quo nutriatur, quemque pro corde alteret. Vena arteriosa hæc, quam diximus, magna est satis: immò verò multò maior quàm necesse fuerit: si sanguis ad pulmones supra cor exiguo intervallo deferendus duntaxat erat. Diuiditur duos in truncos tum ad dextrum, tum ad sinistrum pulmonem: deinde varios in ramos, quemadmodum tunc dicemus, cum de pulmone agemus. Verùm enimvero vena illa, quam diximus, seu membrana evanescit post infantis egressum ab utero: idque propterea quòd incipit cor suum officium præstare. Arteria ἀορτή, quæ est aliarum omnium arteriarum mater, à sinistro oritur cordis ventriculo, sursumque assurgit. Sed antea quàm huius arteriæ iter persequamur, de arteria venosa dicendum videtur, quæ sinistro ventriculo appositæ est. Dicitur autem arteria quoniam spiritibus, arteriosisque sanguini deseruit: at vena etiam appellatur eò; quòd venæ corpus, hoc est substantiam habet. vas est satis insigne, quod per pulmones instar venæ arteriosæ disseccatur. Scribunt Anatomici in hoc (pace eorum dixerim) parum prudentes harum usum esse, ut alteram ad pulmones ferant, qui flabelli instar ventulum cordi faciunt, idque refrigerâr, non cerebrum, ut Aristoteli visum est: existimantes iidem eas tunc fumos nescio quos capinosos (ita enim ipsi vocât linguarû ignoratione)

Arteria ἀορτή arteriarû omnium mater.

Arteria venosa quare dicitur.

Anatomicarû opinio erronea.

*Diuerſa à cate-
ris anatomicis
de arteria ve-
nali ſententia.*

excipere à ſiniſtro ventriculo profectos. quod commentum nō dici poſſet, quā ipſis placeat; quippe qui certò exiſtimant in corde ea fieri, quæ in caminis aſſolent: quaſi in corde viridia ligna exiſtant, quæ dum cremantur, fumum edant. atque hæcenus de harum uſu iuxta aliorum Anatomicorum ſententiam. Ego verò op-
poſitum prorſus ſentio: hanc ſcilicet arteriam
venalem factam eſſe, vt ſanguinem cum aëre à
pulmonibus mixtum afferant ad ſiniſtrum cor-
dis ventriculum. Quod tam verum eſt, quā
quod veriſſimum, nam non modò ſi cadauera
inſpicias, ſed ſi viua etiam animalia, hanc arteriā
in omnibus ſanguine reſertam inuenies. quod
nullo pacto eueniret, ſi ob aërem duntaxat, &
vapores conſtructa foret. Quocirca ego illos
Anatomicos non poſſum ſatis mirari, qui rem
tam præclaram, tantique momenti nō animad-
uerterint: quamvis præcellentes haberi velint;
immò verò à compluribus ſui ſimilibus habeā-
tur. Sed illis hoc ſatis eſt Galenum dixiſſe quaſi
Pythagoræ diſcipulis. Quid? quòd aliqui noſtro
tempore in Galeni placita de Anatome iura-
runt: vt hoc audeant affirmare, Galenum E-
uangeliftæ more ſuſcipiendū eſſe, nihilque in e-
ius ſcriptis eſſe non verum. mirūque dictu eſt
hoc dicto quantopere ſe efferant, ac Anatomico-
rum principes popello iactent. quod quā ſit
reprehendendum nemo non videt. etenim quis
eſt qui nunquā offendat? ſed de his ſatis ſupérq;.
Obſer-

*Fieri poruiſſe
vt etiam Gale-
lenus falſus ſit
nec omnia no-
uerit.*

Obseruandum est itaque orificio quatuor va-
 forum, quæ sunt ad cordis basim, vndecim mē-
 branas altare, quæ trifulcæ, vel tricuspides ap-
 pellantur: tres inquam ad cauam venam, tres
 item ad venam arteriosam, tres ad arteriā ἀορτήν
 dictam, duasque ad arteriam venalem: qua-
 rum figura non est eadem. nam quæ ad venam
 cauam, & arteriam venalem positæ sunt, diuer-
 sa sunt forma à membranis magnæ arteriæ, &
 venæ arterialis. hæ namque instar trium litera-
 rum, quæ C à Latinis dicuntur: aliæ verò sunt
 instar sagittarum. admirabilis autem harū vsus
 est, & ipsæ sunt quarum ope multa discimus ex
 his, quæ ad cordis, & pulmonū vsus cogniti-
 onem spectant. scito etiam quemadmodum ha-
 rum figura varia est, ita vtilitatem diuersam esse.

Ostiola itaque cauæ venæ, necnon arteriæ ve-
 nosæ ab interiore situ foras feruntur, vt sangui-
 nis emissioni seruiant: aliorum verò duorū va-
 forum ostiola cōtrā ab exteriori intrò, vt ad in-
 clusum sanguinem continendum facta esse vi-
 deantur. Illud insuper adnotato ea ostiola, quæ
 intus foras panduntur, quibusdam filamentis
 referta esse hac, illacque per ventriculos disper-
 sis: quæ propterea facta sunt, vt ipsas contineāt,
 firmētque. quibus fortè deceptus est magnus
 Aristoteles, qui filamēta hæc, quæ dixi, neruos
 esse opinatus est: hincq; factum est, vt Arist-
 oteles cor neruorū principium esse scriptum re-
 liquerit, & per consequens sensus, motusq; sed,

*Membrana tri-
 fulca, & tricuf-
 pides appellata
 in orificio qua-
 tuor cordis va-
 forum vndecima.*

*Vndecim mem-
 brarū vsus.*

*Cordis filamen-
 ta, pro neruis ab
 Arist. habita.*

*Quamobrem
 Aristoteles cor
 principium ner-*

*novum statue-
rit.*

*Quatuor vaso-
rum usus.*

*Sanguinem in
dextrum cordis
ventriculū in-
gressum nō re-
trocedere in ca-
vam venam.*

*Nervus mem-
branam cor in-
voluentem in-
grediens.*

*In hominis cor-
de os non repe-
ritur cum tamē
in brutorū in-
veniatur.*

ut ad supradicta quatuor vasa redeamus: duo ex his constructa sunt, ut intrò ad cor deferat, hoc autem evenit dum cor dilatur: duo verò alia; ut, dum cor constringitur, foras deferant. Idcirco quando dilatur, sanguinem à caua vena in dextrum ventriculum suscipit, necnon ab arteria venosa sanguinem paratum, ut diximus, unà cum aëre in sinistrum. propterea membranæ illæ demittuntur, ingressuq; cedunt. nam dum cor coarctatur, hæ clauduntur; ne quod suscepere, per easdem vias retrocedat, eodemq; tempore membranæ tum magnæ arteriæ, tum venæ arteriosæ recluduntur, aditumq; præbent spirituosò sanguini exeunti, qui per uniuersum corpus funditur, sanguinique naturali ad pulmones delato: res itaq; semper habet, cum dilatur, quas prius memorauimus, recluduntur clauduntur reliquæ. itaq; comperies sanguinem, qui in dextrum ventriculum ingressus est, non posse in cauam venam retrocedere. ex hac doctrina collige cor nullo pacto id mēbrum esse, in quo sanguis gignatur, quemadmodum sensit Aristoteles: cum à vena caua sanguis distribuitur. éstq; hoc admirabile, maximæque arte fabricatum. ad membranam autem cordis substantiam inuoluentem peruenit neruulus à sinistro recurrente neruo profectus. Hoc insuper velim certò scias nullum os in hominis corde inueniri: quanuis in bobus, bubalis, equis, atq; id genus magnis animantibus ossẽ nescio quid ostendatur;

ostendatur : quod in nobis neutiquam est . sed substantia duntaxat radicis magnæ arteriæ venam arteriosam versus , quæ cartilaginea videtur : licet os nullo pacto appellari queat , quicquid Galenus dicat , qui ridendus in hoc est , dū veteres rideret , qui os cordis nō describere : quod iudicium ipsi maximè faciendum erat . Hoc verò axioma in Anatome existimato arterias omnes à corde proficisci , quemadmodum ab hepate venas , necnon à cerebro nervos . A sinistro itaq; cordis ventriculo exoritur arteria illa , quæ aorten vocant , aliarum omnium arteriarum mater , quæ satis magna est . substantia verò tum crassa , tum alba , crassa quidē primò ne sanguis spiritu refertus facillè euanesceret , deinde ne suis in motibus disrumperetur : mouetur enim arteria continuò non per se , sed propter spiritus . posteaquam *ἀορτὴ* cor ipsum prætergressa est , parvam arteriam coronalem dictam , eo quòd cor ipsum circumdet , immediatè parit , quæ eius substantiam viuendam reddit , in qua variè diffeminatur . illud insuper scito coronalem hanc arteriam in nonnullis non esse vnicam , sed duas : deinde ascendens aliū duos in truncos scinditur , quorū alter maior , minor alter existit : maior descendit , ascendit minor , maior autem factus est ille truncus , quem descendere aiebam : quoniam maior corporis pars illi viuificanda erat . truncus ascendens à sinistris arteriam emittit , quam axillarem sinistrā vocant , quæ obliquè

Galenus error.
Quod in hominis corde reperitur non os , sed portio quedam cartilaginis.

A corde arteria , iecore venæ cerebro nervi nascuntur.
ἀορτὴς arteria exortus.

Arteria nō per se , sed à spiritibus mouetur.

Coronalis cordis arteria origo.

Coronalis cordis arteria aliquādo gemina.

Dividitur arteria aorte in duos truncos.

Ascendens truncus distribuitur.

*Axillaris finis-
fra arteria.*

*Trunci axillaris
arteria distri-
buita.*

*Arteria tangē-
ribus medicis
brachium se of-
ferens.*

versus axillam tendit, & ad superiores costas arteriolas mittit, & egrediens ad brachium iter tenet per internam partem, & cum basilica interna iungit se sociam, ramumque sursum mittit, ramulos autem alios ad omnes eos musculos, qui sunt circa humerum, scapulam, eius cavitatem, necnon ad anteriora thoracis, & ad eas glandulas, quæ sunt sub ala. Truncus verò axillaris rectè per internam regionem humeri descendit usque ad cubiti flexuram: & anteaquam regionem hanc pertranseat, arteriolam mittit sociam quarto nervo brachij ad musculos cubitum extendentes distributam: cum autem flexuram cubiti præterit, in duas, sæpe in tres arterias secatur, sed prius arteriolas ad eos musculos relegat, qui sunt in humero, & cubito, & ramus vnus penes id ligamentum incedit, quod inter cubitum, & radius positum est: & egressus foras ad externos musculos graditur. quod reliquum est, cubiti longitudinem sequitur: postea verò quam sub interno transverso brachialis ligamento præterfluxit, in palma ipsa variis secatur modis, & ad extremos usque digitos extenditur: at alter ramus tendit radius versus iuxta eius deductum: & vbi medium cubitum præterit, assurgit inter musculos: & ad cutim subit per internam partem radij. atque hic ille est ramus, cuius motum digitis persentiscere medici solent, cum manum in carpo apprehendunt, ut pulsus consulant. Illud præterea scias velim,

ramum,

ramum, quem dixi, in aliquibus vario situ locatum esse, ut dubites an is sit, quē hactenus memoravi, eo quòd foras versus feratur. quòd si quis medicus rei Anatomicæ ignarus huius pulsum, dum ægrotat præsertim, loco consueto duntaxat quærat, neque inueniat, nā is hunc morti proximum esse falsò iudicabit, & prædicet falsò. Non equidem negauerim perrarò arteriam huiusmodi situm obtinere: nam partem internam plurimū occupat. hæc ubi à brachiali discessit per partem externam, vsque ad digitorum extremitatem procedit. alter ramus iuxta ligamentū fertur. Truncus iste ascendens postquam arteriam axillarem peperit, in arterias binas diffecatur *καρωτίδibus*, hoc est soporarias appellatas, quæ per partes colli laterales rectæ feruntur vsque ad caluariæ basim, asperæ adhaerentes arteriæ, venisq; iugularibus internis affixæ. quam caluariam priusquam ingrediuntur, duas arterias ad faciem mittunt, & sub maxilla inferiori subdiuisæ ramulos mittunt ad musculos tum colli, tum capitis, tum laryngis, tum hyoïdis, tum linguę. sed duo ramuli, iisque maiores ad linguam ducti per eius longitudinem ad extremū vsque feruntur: quo peracto itinere ascēdunt sub aurem, & tum ante, tum post ipsam sursum attolluntur ad temporales musculos, ad frontemq; , necnon ad capitis cutem: & ad faciem, hoc est, ad eius musculos distribuuntur. alter eius ramus, quē retrò ferri diximus, disse-

καρωτίδες arteriæ scilicet soporariæ dictæ earumque distributio.

*Duo musculi po-
steriores capitis
nunc primum
cogniti.*

*Arteria den-
tiū radices in-
gredientes.*

*Dexterarum a-
xillarum arte-
riarum inter se
diuersitas.*

*Vesalij lapsus.
Arteria ad su-
periora thoracis
costarum inter-
ualla.*

minatur ad duos illos musculos, quos nos pri-
mū, pace aliorum dixerim, inuenimus: qui po-
siti sunt in parte capitis posteriore. fertur etiam
ad cutem, & ad musculos capitis. Ab eodem
loco, & aliquantulum altiūs etiam arteriæ duæ
ortum ducunt maxillā inferiorem ingredientem
sub aure in foramen ibi dedita opera sitū, iuxta
maxillæ longitudinem, quibus cum arteriis &
vena, & neruus quoque adiunguntur: dispergū-
tur autem ad omnes radices dentiū inferiorum:
pars verò egreditur per foramen ad mentū po-
situm, & per labrum incedit. Huius arteriæ Ve-
salius oblitus est prorsus, ita vt illius ne memi-
nerit quidē. Sed anteaquam illas arterias descri-
bo, quæ in caluaria continētur, aliquæ alię prius
describendæ sunt, quarū pars à caluaria quoque
suscipitur. Animaduertēdum igitur est, dexterā
arteriam axillarem è loco minus humili exoriri,
quàm sinistra. præterea obliquè non incedit, vt
illa. est autem origo eius à carotide dextera in
iuguli regione: & rectā incedit per axillam sub
iugulo ad brachiū dexterum. vbi diuiditur, &
progreditur instar sinistrae. at vnde hæ caroti-
des arteriæ, & axillaris arteria ortum ducunt,
ab anteriore parte duæ arteriæ nascuntur deor-
sum tendentes, ramos ad superiora interualla
costarum & ad vertebrae mittunt, quas Vesalius
ignorauit: aliæ item duæ exoriuntur arteriæ
paruæ, quæ sub sternō conuertuntur, descen-
duntque duabus illis venis comitantibus, quæ
ad

ad mammillas tendebant, & ad fines rectorum musculorum. itaque diuiduntur in illorum morem. In eadem penè regione retrò tamen versus corpora vertebrarum duas alias adnotabis, quæ per transuersos processus vertebrarum collidatæ (ob hoc enim illos natura perforauit) necnon per ea foramina, è quibus nerui egrediuntur, ramulos mittunt ad spinalem medullam, vertebrasque, & ad musculos ceruicem in latus flectentes: sed in quibusdam hæ duæ arteriæ nō à soporariis, vt in plerisque, sed frequenter ab axillaribus originem ducunt. hæ quas nūc ob oculos ponimus arterias, inter primam vertebram & caput, partem caluariæ posteriorem ingrediuntur: inter ipsam nimirum, & spinalem medullam: prius tamen duas arteriolas auris antro subministrat, quæ in ingressu miscentur. dextra nanque sinistra vnitur adeò, vt longitudine semidigiti vna fiat: in duas postea diuiditur: deinde in alias complures, tenduntque primùm ad duram, tenuemque meningem, deinde ad cerebellum. & profectò si hæ duæ arteriæ non fuissent à natura genitæ, posteriora caluariæ arteriis caruissent. ab hisce cerebellum viuificatur, & cerebri quoque pars, & medullæ spinalis origo. Hæ duæ arteriæ, quæ per transuersos processus vertebrarum inter primam vertebram, atque os occipitij sursum assurgunt, internam caluariæ regionem ingrediuntur inter ipsam, inque spinalem medullam. postea verò

*Duæ arteriæ
sub sternon.*

*Arteria per
transuersos colli
processus.*

*Membrana v-
triusque cere-
bellique arteriæ
Posterior capitis
pars non vacat
arteriis.*

quam caluariæ cavitatem ad dimidij digiti longitudinem sunt ingressæ, vniuntur, atque ex binis vnica fit arteria: tamen diuiduntur denuo in geminas, dexteram scilicet & sinistram, à quibus arteriæ ad duas cerebri membranas mittuntur, atque ad cerebellum. deinde per horum substantiam parte superiore ad dimidiam vsq; caluariam maxima fit harum arteriarum distributio. Quod reliquum est cranij, à duarum carotidum ramificatione viuificatur: vt paulò post dicam. quæ priusquam cranium penetrant, arteriolas auris labyrintho mutuo dant. vbi verò hic arteriæ truncus caluariam ingressus est, vt supra dicebam, ad spinalem medullam, ad duram, tenuemq; membranam, ad cerebellum cerebrumq; arterias mittit suas. Neque quemque inuenies, cui vera harum duarum arteriarum distributio cognita fuerit: neque Vesalius ipse illam olfecit. qui dum in arteriarum per transversos vertebrarum processus ascendentium descriptione versatur, inquit ingredientiæ caluariam per finem illum duræ matris tendere, quem iugulares ingrediuntur venæ. sed hoc potius ita esse animo concepit Vesalius, quàm oculis viderit. Quocirca nihil mirum est, si is rete mirabile à priscis Anatomicis tantopere decantatum nescio quo pacto irrideat. nam ab hisce, quas ignorauit, arteriis potius quàm à carotidibus rete mirabile efformatur: quanuis neque Galeno hæ duæ arteriæ cognitæ fuerint. nam venas, inquit,

per

Auris arteria.

Distributio arteriarum Vesalio incognita.

Rete mirabile dari contra Vesalium.

per posteriora capitis ferri, per anteriora verò arterias. Tu verò hoc loco admirabile & arte inenarrabile constructū opus ab opifice summo diligenter adnorabis, cuius de sapientia, prouidentiaq; silere satius duco, quàm pauca dicere. etenim duæ, quas descripsimus, arteriæ sub spinali medulla sursum attolluntur, & præter multifidos illos ramos, quos per tenuem membranam spargit, eo loco, quem conariū, vel pinealem glandulam appellamus ingrediuntur substantiam cerebri in extremitate superiorum ventriculorum, atq; ibi grādem, atq; insignem plexum perficiunt: qui plexus mea quidem sententia plexus mirabilis ob admirabile artificium appellari meritò potest: qui posteriore parte ad torcular affigitur. in hunc eūdem admiratione dignum plexum duæ quoq; arteriæ carotides immittuntur, vt suo loco audies. itaq; ex quatuor arteriis constructum esse rete mirabile obseruare poteris: quod antè me à nemine hætenus obseruatum fuisse comperi. ita vt & rei nouitate, & dignitate delectari, & doceri possit rei anatomicæ studiosus. arteriæ carotides vbi ad caluariæ basim peruenere, id foramen ingredi videtur è quo sextum neruorum par egreditur: & quod venas iugulares internas suscipit: non assurgunt tamen, neque hîc duas arterias pariūt, vt Vesalius cogitatione potius, quàm visu deprehendit: quas vnà cum iugularibus in duræ membranæ sinus ingredi voluit. sed quid, inquires,

Conarius locus.

Torcular.

*Rete mirabile
ex quatuor cō-
strui arteriis à
nullo adhuc ob-
seruatum.*

Y

hæ agunt arteriæ sub caluariæ basi? Ad anteriorem partem conuertuntur, pèrque id foramen transeunt, quod in osse temporali latitat prope illud, in quod sexta descendit neruorum coniugatio, & iugulares internos ingrediuntur, quæ prius quàm à caluariæ parte interna suscipiatur duas promunt arterias, quarum varij sunt rami, ad palatum nimirum, ad internum nasum, ad superiores dentes: alij caluariam subintrant per ea foraminula, quæ ibi sunt sita: & arboris instar per duræ mēbranæ latera explicantur vnà cum iis venis, quæ in membrana cōspiciuntur sunt, propterea quòd sinciput ibi excauatū videbis. Postquam autem hæ arteriæ ad palatum, dentesque eos ramos diffuderunt, vt suprà diximus, assurgunt in cranium ipsum per id foramē, quod inter sphenoïdem, & os temporis situm est: quo loco pars tertij neruorum paris descendit: quāuis Vesalius hīc Galenum acriter mordeat: idque meherclè iniuria. vbi verò fellam, quam dicunt sphenoïdis supergressæ sunt, binas arterias ad oculos mittunt post neruos opticos appellatos, vt vitam oculis præbeant: neque oculis solū vitam subministrant, sed etiam oculorum musculis, iisq; à quibus maxilla referatur: maxilla in quā superior: propterea magnas multasque harum sectiones obseruare poteris. quod reliquum est harum arteriarum carotidum, suprà dictā fellā ascendit tenui membranæ cohærens, & post callosum corpus posteriora versus, variisq; modis

*Cal. iniuria à
Vesalio reprehenditur.
Sphenois sella.
Arteria ad oculos.*

dis per tenuē meningem dispergitur suprā, intrāque, necnon ad latera. nonnulli etiam sunt earum rami à tenui ad duram meningem deducti; alij à tenui ad cerebri substantiam. Post tot distributiones saporiferarum arteriarum suprā sellam cunealis, illæ ventriculos cerebri superiores subeunt, cū primū tenuem mēbranam perforarūt, qui ventriculi anfractuosi sunt: & cum primo duæ esse viderentur, in exiguas, easque innumeras scinduntur. itaque perpulchrum rete ex arteriis contextum cōspicaberis: quæ omnes iuxta deductum eorum ventriculorum, quos suprā memoravi, eò vsq; progrediūtur, donec veniant cum postremis, vti diximus. Hæ arteriæ socias habent venas: & in earum finibus adest glandula pinealis. has Galenus descripsit pro retiformi plexu, quasi secundinam præ se ferat. Ego verò, si rete mirabile vsquam est, hoc esse affirmare audeo. nusquā enim tam admirandum arteriarum minimarū, innumerabiliūque plexum, perplexūque & intertextum videre poteris. Sed Galenus suum rete mirabile supra sphenoidem describebat: vbi glandula illa adest omne id excrementum suscipiens, quod in cerebro gignitur: huic enim muneri fuit à natura dicata. Sed nōne impium quid piis hominibus videri potuisset, grauitérq; accusanda fuisset natura: si natura, quæ prudēs, & oculatissima in hominis fabrica esse solet, ac debet, tam nobilē plexum, tā insignem,

Pinealis glandula.

Diuerſa opinio de retis mirabilis ſitu.

Glandula excrementa a cerebro ſuſcipiens.

támque admirabilem in loco non modò humi-
 li, sed tot excrementorum sentina, ne cloacam
 dicam, collocauisset? Quamobrem nequeo fa-
 tis mirari, quí fieri potuerit, vt Galenus vir dili-
 gēs suprà quàm dici possit, rerúmque naturalium
 acerrimus speculator, in tam graues errores in-
 ciderit: veríque; retiformis plexi situm ignoraue-
 rit, perperámque; descripserit. quòd si cuipiam di-
 ligenter inuestigare libeat reticularem plexum,
 vbi illum Galenus describit: nã is fine suo fra-
 strabitur. Nihil enim ibi comperies nisi quasdã
 arteriolas illis partibus, sphenoidíque; ossi vitã mi-
 nistrantes. Eadem arteriæ, ex quibus rete cõfi-
 citur, quod mirabile appellatur, per cerebri sub-
 stantiã arteriolas mittunt: quod nemo ex Ana-
 tomicis ante me, quod sciã, hætenus scriptum
 reliquit. Atque hic finis est descriptionis trunci
 superioris: nisi illas arteriolas describendas du-
 ceres, quæ ad dexterarum costas superiores deman-
 dant. Hic pulchrum est adnotatu, nullam arte-
 riam ad pulmonem tendere, quæ vitales spiritus
 à corde suscipiat, quòd ad pulmonem deferat.
 propterea verú hoc est axioma in re Anatomic-
 ca, cùm à pulmone discesseris, reliquas humani
 corporis partes pulsatilib⁹ arteriis præditas esse.
 Qua ratione probare acutus aliquis, atque; acer in
 disputando posset, ne in corde quidem ipso vi-
 tales spiritus gigni. Sed de hoc aliàs. Arteriæ
 magnæ, quam ἀορτήν sæpe nominauimus, trun-
 cus maior, qui deorsum tendit, sinistrorsum
 flectitur,

*Galenus error de
 mirabilis resis
 sede.*

*Cerebri arterio-
 le aliis adhuc i-
 gnoræ.*

*Nulla arteria
 ad pulmonem
 tendit.*

*Maiores arterie
 aortes truncus.*

flectitur, vertebrarumque corpori adhærescit, quod in superiori trunco non contingit. nam ille non secus atque vena caua, à vertebrais distat. Truncus igitur hic inferior dum descendit è parte sui posteriore arterias profert costarum interuallis dicatas: atque hæ rursus alias mittunt tum ad spinalem medullam, tum ad vertebrais, tum ad musculos, qui in posteriore thoracis parte sunt siti. At ubi ad septum transuersum descendit duas pares arterias, dexteram, inquam, & sinistram, proferens, quæ ad septum ipsum distribuuntur, sub ipso transit quidem, sed nullo pacto perforat, penetratque: sed vertebrarum corpori adhærens progreditur ad penultimam usque lumborum vertebrais. Sed quum primû septum, vt dixi, præterit, arteriam profert, quæ ad hoc par secatur, ingrediturque, vnde venam portâ exire suo loco diximus: ibique distribuitur. alia properat ad bilis vesiculâ, alia ad lienem, alia ad ventriculum, omentumque: ramuli alij ad pancreas, alij verò ad colon intestinum. sub hac alia emergit, cuius plurimæ, maximeque diuisiones sunt tum per mesenterium, tum ad intestina tenuia. multisque mesaraicis venis se socias præbent. deinde paulò inferiùs duas gignit arterias, easque adnotatu dignas, quas emulgentes appellant, quæ renes ingrediuntur. sub emulgētibus venis paulò etiam decliuiùs geminas producit arterias seminales, quæ à corpore magnæ arteriæ ortum habent,

*Maioris trunci
aortes arteria
distributio.*

*Arteria emul-
gentes.*

*Seminales ar-
teriae.*

Y iij

non autem à sinistra emulgente, vt Galeno visum est, per paucos tamen excipio: hæc descendentes implicantur cum venis seminariis tum in mare, tum in foemella ad testes vsque, & in foeminis vsque ad vteri corpus, & ad internam partem matricis: & ab his arteriæ vmbilicales foetus originem trahunt. sub hisce seminariis arteriis medio trunco alia emergit arteria, quæ ad recti intestini mesenterium defertur, & ad partem eius intestini, quod colon appellamus: quæ per sinistrum ileon deorsum fertur. at recti intestini arteriæ vnà cum mesaraicis venæ portæ venis ad extremum podicem vsque descendunt, quare fiunt tum venæ, tum arteriæ hæmorrhoidales, posteriore in parte ab hac eadem arteria sub transuerso septo arteriæ egrediuntur ad vertebrae, ad spinalem medullam, necnon ad dorsales musculos, atque ad abdominis musculos delatæ. Cum verò ad penultimam vertebram lumborum prouentum est, & in nonnullis ad ultimam vsque, primum in duos ramos, eosque insignes diuiditur, qui dextrum, sinistrumque eius adeunt, superant autem cauam venam in ossis sacri regione. Hi duo rami subdividuntur, descendentesque amplius ramificantur, & ad vesicæ latera, & ad vteri ceruicem, & ad musculos in concauitate abdominis residentes: duæ verò aliæ transeunt per foramina sita in osse pubis, coxendicisque, è quibus, quum primum abdomen ipsum egressæ sunt arteriæ, mittuntur ad

Vmbilicales arteriæ.

Recti intestini arteriæ.

Hæmorrhoidales arteriæ.

ad duo corpora penis, quæ à summo ad imum
feruntur, in iisque in ramos abeunt; atque hæ
illæ, illæ inquæ sunt arteriæ, quibus erectio mē-
tulæ accepta ferēda est: quam rem nemo, quod
sciam, nostris temporibus, neque ex antiquis
cognovit, aut scripsit. Quod reliquum erat ha-
rum arteriarum, per eos musculos dispergitur,
qui in interiore femore positi sunt: neq; tamen
genu prætereūt. ab illis arteriis quas vesica ex-
cipit, aliæ quoque proficiuntur arteriæ, quæ
ad internam ossis sacri partem delatæ, per quæ
eius foramina tum ad ipsum tendunt, tum ad
spinalem medullam, extra verò ad musculos fe-
mori deseruientes: quemadmodum à magna
quoque arteriæ diuisione arteriæ exeunt, quæ
musculos femoris, qui sunt in abdomine, vitali
sanguini nutriunt. ex illis autem arteriis, quæ
iuxta sacrū os, coccygēmque descendunt, non-
nullæ ad σφιγκτήρα musculum perueniunt vnà
cum quibusdam cauæ venæ venis, quæ & ipsæ
hæmorrhoides dici possunt. Ex magna magnæ
arteriæ diuisione duæ insuper oriuntur arteriæ,
quæ sursum reflectuntur, & peritonæum præ-
tereunt, sub rectōsque musculos ascendunt su-
pra vmbilicū vsque: & in ramos plures finiuntur
per abdominis musculos. In hac diuisione
duæ arteriæ implantantur, quas vmbilicales ap-
pellamus, quæ primæ sunt, quæ in fœtu ipso gi-
gnantur. Etenim hæ ab vmbilico postquam e-
merferint: progrediuntur per peritonæum quæ

*Arteria penis.
penem ipsum e-
rigentes, qui v-
sus huiusque
fuit ignotus.*

Vesicae arteria.

*Post umbilica-
lem arteria ge-
neratam gene-
ratur cor ipsum*

*Diuisio magna
arteriæ ad cru-
ra.*

*Ossa arteriis nõ
carere.*

duplex est ad vesicæ latera, hæcque arterias gignunt, de quibus paulò antea dicebamus. post umbilicalium autem arteriarum ortum cor ipsum gignitur, quemadmodum tunc latius, & apertius explicabimus, cùm de fœtu dedita opera agemus: sed ad umbilicales arterias redeamus. hæc postquã in lucem proditi sumus excantur, duorúmque ligamétorum munere funguntur. Duo autem magni trunci rami, qui ad crura deferuntur, transeunt supra quintum musculum lumbalem femur flectentem, & supra os pubis iliúmque versùs abdomen exeunt, & hoc loci cum venis internis socias iunguntur, quæ inter musculos incedunt: & quemadmodum venæ illæ diuiduntur: ita has arterias diuidi conspicias ad omnes scilicet musculos tibiæ, pedis, digitorúmque: ad eorum enim extremitatem perueniunt. Mittunt insuper arteriolas tum ad inguinis glandulas, tum ad scrotum, tum ad penem sub cute. Illud insuper adnotabis ossa suis non carere arteriis, vt & ipsa calore vitali non deficerent. Atque hæc de arteriis dicta sint satis: nolo enim inutilibus verborum phaleris, & circuitione lectorem fallere, & diutius sine fructu detinere.

REALDI

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber Octauus.

De Cerebro, eiúsque membranis: de spinali
Medullai. tem de Neruis. CAP. I.



CEREBRVM inter hu-
mani corporis partes
principem locum obti-
nere nemini dubiũ esse
debet, quidquid cum A-
ristotele philosophi sen-
tiant: quod ita esse quin-
que rationibus probare

*Cerebrum pri-
mas tenet con-
tra Arist.*

facile possum. Primò mihi situs cerebri nobili-
tatem, atque illius in cætera membra principa-
tum apertè ostēdit: quòd illud in altissima cor-
poris parte Deus opifex collocauit, quasi in mu-
nitissima arce, vt minus esset iniuriis obnoxiiũ.
Secundò inducor à figura ipsius, quæ rotunda,
oblongaq; est: rotunda magis, oblonga minus:
quam figuram nunquam temerè effingit natu-
ra prudēs rerum omnium architectonica. Ter-
tiò me mouet ratio munimentorum, & ingens
apparatus, quibus cerebrum vndique stipatum
est. nam priusquam ad cerebrum ipsum pertin-

*Prima ratio
principatus ce-
rebri.*

Secunda ratio.

Tertia ratio.

*Cerebri que sint
propugnacula.
Aristoteles er-
tor de cure ca-
pitis.*

*Facilius lædi-
tur cor quam
cerebrum.*

Quarta ratio.

Quinta ratio.

gas, quasi ad principis alicuius maximi penetra-
lia, bone Deus, quot atria, porticus, thalamique
pertranseundi sunt. Iam primum adsunt capilli,
deinde curis crassissima (licet hanc Aristoteles
falsò tenuissimam esse scribere non vereatur)
deinde pinguedo, deinde carnea mēbrana , pe-
ricranionque & periostion, & caluaria duplex,
sub qua adhuc binæ meninges à seipsis distan-
tes pro cerebri tutamento constructæ sunt. Ossa
verò capitis, vt proprio capite dictum est, ita an-
tè composita sunt, vt diuelli, atque abstrahi nisi
magna vi possint, neq; cerebrum nisi ab ingenti
violentia lædatur. De corde autem quid attinet
dicere , quàm facile per interualla costarum ad
ipsum lædendū vel minimo quouis instrumē-
to perueniatur? vt videas naturam adedò accura-
tè cor ipsum non vallasse vt cerebrum . Quarta
ratio qua adducor, vt credam membrorum prin-
cipatum cerebri deberi , est cerebri vsus mirifi-
cus quòd scilicet tum sensus , tum motus prin-
cipium existit : absque vsu enim cerebri homo
esset instar statuæ cuiusdam motus , sensusque
expers. Præterea sedes est animæ ratione prædi-
tæ. A cerebro visus , auditus, gustus, odoratus-
que , & locutio proficiscuntur : his enim actio-
nibus quantam cerebrum vtilitatem afferat, vel
idiotæ ipsi norunt. Quintam demum rationem
ex huius ipsius artis quam tractamus partibus,
& considerationibus sumo : quibus Anatomi-
carum rerum instructissimus minimè refragari
posse

posse confido: ea verò talis est. In hominis generatione iecur gignitur medio, & ope venæ umbilicalis (vt in tractatu de fœtu latius explicabimus) cor verò medio umbilicalis arteriæ. atque hæc tum vena, tum arteria umbilicales à vasis vteri oriuntur: at nerui, quos sensus, motusque instrumenta esse nemo dubitat, à fœtus cerebro oriuntur. Iure igitur cerebrum nobilius est membris omnibus, & vt ita dicam, principum Rex. Quamobrem magna illud arte natura condidit: quam si Aristoteles nouisset, nunquam cordi hanc nobilitatem ascripisset: quæ cerebro propria est: neque à corde tot actiones prodire existimasset: neque cerebrum ob cordis refrigerationem factum esse, vt scilicet cordis calorem ingentem attemperaret. Sed dimisso Aristotele, cuius in hoc explosa sententia est, ad institutum redeamus. Natura circa cerebri substantiam duas apposuit membranas, crassam inquam, & tenuem, quæ vniuersam illius substantiam circundant. Ex quibus crassa meninx, quam & duram matrem vocant, à cerebro ipso distat, quemadmodum à pericardio cor. huius autem distantia causa est, vt cerebri diastole systolæque locum habeat. Vt enim vidimus, non modo cordi perpetua adest diastole, ac systole, sed cerebro quoque. quod licet paradoxon videatur, tamen si diligens eris anatomicus, & recentia capitis vulnera complura obseruabis, tam verum esse deprehendes, quàm quod verissimū.

Aristotelis error.

Cerebri vsus nō est caloris cordis attemperatio.

Crassa & tenuis meninx circa cerebrum.

Dura meninx, distat à cerebro vt pericardium à corde.

Diastoles, & systoles in cerebro

Dura mater futuris adheret. Pericradium unde oritur.

Dura mater duplex est.

Cur exterior tunica dura materis interiore minus sentiat. Vbi reduplicatur.

Figura falcis vbi.

Vbi dura membrana sit quadruplex & cur. Quatuor cavitates sanguine plenas, inter quadruplicatam dura matris. Iugularum venarum ingressus. Vesalii error.

idcirco dura hæc membrana caluariæ cōnectitur futurarum ope, caluariamque egressa pericranion creat: ita dictum quòd exteriorem cranij partem circundet. cuius interiori parti dura, quam diximus, membrana validissimo nexu colligatur. Neque vnica est membrana, veluti qui ante me de Anatomicis rebus scripsere, omnes vno ore prædicant: sed duplex, vel, vt apertius dicam, duæ sunt membranæ dura meninx: quarum vnā internā voco, quæ cerebrum spectat, alterā externā caluariam versus, quæ minori sensu meritò prædita fuit: quippe cui offis durities attingenda erat. Altera verò, quam internā dixi, magno sensu pollet. Hæ itaque membranæ in capitis vertice sub recta sutura reduplicate descendunt cerebri dexteram partem à sinistra seiungentes: non tamen ad imum vsque, sed ad dimidium cerebri quasi ad sphaeræ centrum dixeris: vbi corpus adest callosum dictum. Hæc membranarum duplicatio, quam supra memoravi, posteriore sui parte versus cerebrum latior est, quàm in anteriore frontem versus. Figura eius est falcis in modum. at posteriore capitis parte hæc membranæ quadruplicantur: hoc est quadruplex hoc loco dura membrana cernitur, neque iniuria. nam cerebrum à cerebello seiungit. Inter has, quatuor sinus, seu cavitates potius adsunt sanguine refertæ, in quas tamen venæ iugulares internæ ingrediuntur (quæ ingressum Vesalio in hoc parū accurato ignotum fuisse

fuisse eius scripta legens facile perspicies) & ad extremum usque progrediuntur: propterea non adest hoc loco sanguis extra propria vasa. Quod si essent, quemadmodum Vesalius sensit, dura mater venarum, principium esse diceretur. quod quid absurdius dici, aut cogitari possit non equidem video. Sed ad prædictos sinus reuertamur. Ex his duo primi ad basim siti sunt, ubi aditus patet venis iugularibus internis, quarum incessus est iuxta occipitium, sursumque ad apicem future lambdoïdis assurgunt, atq; hinc dextra cum sinistra coniungitur, tertiumque sinum efficiunt, qui iuxta vniuersam capitis longitudinem progreditur, & in id foramen desinit, quod in nasi summitate inter frontem, atq; os ethmoides positum est. Non est hic tertius sinus orbitalis infra. nam latera illius trianguli speciem sunt: pars superior semicirculum imitatur, cui rotunditati atque eminentiæ sinciput cedit. illa etenim cauitas sub recta iacet sutura. Ab hoc sinu, vel potius à vena, quam in sinu positam esse dicebamus, venæ aliæ complures tum à lateribus, tum infra exoriuntur, quæ per tenuem membranam dispersæ vagantur: cuius membranæ tenuis descriptionem mox habebis. hæ quas diximus, venæ innumeræ efficiuntur: à quibus cerebrum alitur vniuersum. supra hunc sinum venulæ quoque exoriuntur, quæ, ut ossa nutrant, per suturas transeunt. Quartus sinus quadruplicatæ duræ matris inter cerebrum, cerebellumq;

Deducit Vesalius ad inconueniens.

Duo primi sinus inter meningem duram quadruplicem ubi.

Tertius sinus ubi.

Tertij sinus figura qualis.

Ortus venarum quæ per tenuem membranam disperguntur.

Cerebrum à quibus alatur venis.

Ossa capitis quibus venis nutrantur.

Quartus sinus

dura matris duplicata.

Linon seu torcular quid.

Venarum a torculari deductus

Descriptio pia matris.

Pia mater cerebri immediatè tangit.

Chorion.

Cerebri substantia qualis.

Figura cerebri dempta pia matre.

Cuius tot circumvolutiones in cerebro causæ duæ.

Tertia causæ.

Reprobatæ tertiæ causæ.

positus est : quem locum linon , torcularue appellant Anatomici : à quo venæ ortum ducunt per substantiam cerebri delatæ , pèrque tenuem membranam , à qua cerebellum inuoluitur : reticulari plexui se socias præbent . Sub dura matre , quam accuratè , quantum in nobis fuit , descripsimus , adest pia mater tenuis meninx dicta , à qua cerebrum , & cerebellum induitur . horum enim substantiam immediatè tangit . dicitur etiam chorion , id est , secūdina , tenuis , plena venarum , atque arteriarum , sub tenui dicta meninge cerebri substantia latitat alba , mollisque , & medullaris quoq; nuncupata , licet à substantia medullæ , quæ in ossium cauitatibus reperitur , non parum discrepet . Figura totius cerebri substantiæ , dempta pia matre , tenuium intestinorum spiris , dempto omento , nō absimilis est . harum circumuolutionum causæ quærenda est . Ego tum ob leuitatem , tum ut cerebrum in diastole , systolèq; faciliùs moueretur , hos gyros factos fuisse opinor . Non desunt scriptores , qui aliam causam tot cerebri circumuolutionum se inuenisse putent , ut scilicet cerebrum intelligeret . At si hæ circumuolutiones in cerebro intellectiōis causæ existunt , asini quoque , ceteraque bruta animantia , quorum cerebrum hisce gyris præditum est , non intelligere non possent . Quod quàm ridiculum sit , nemo non videt . Igitur causam , quam ego attuli , leuitatis cerebri , & motus promptioris veriolem puto . Animaduert

maduertendum interim est, quemadmodum hæ profundiores sunt magis, minúsue, ita piam matrem illas inuestire: substantia cerebri totam caluariæ internam cavitatem occupat antè, retrò, atque à lateribus: licet Aristoteles, qui in rebus Anatomicis plerûque labitur, partem capitis posterioré cerebro carere falsò affirmauerit. Sed posterior capitis pars, vt unicuique pater, non est inanis: nam non modò cerebrum adest, sed cerebellum quoque. Ad huius substantiæ medietatem plus minus, duæ occurrunt cavitates, hoc est ventriculi duo; dexter inquam, & sinister, oblongi, anfractuosiqûe, ab anteriori parte ad posteriora tendentes. Hos ventriculos sunt qui anteriores vocant: ego verò superiores potiùs appellarem, nam alios omnes supererminent. Hi ergo satis ampli sunt, tenuiqûe membrana induuntur: quâuis id Vesalius perneget, qui si sensui in hoc aduersari proficitur: ego nihil moror, ipse viderit. Per hos superiores cerebri ventriculos feruntur plexus coriformes, quos reticulares appellauimus. Vfus autem horum est animalium spirituum generatio. Atque hoc quod nunc dicam, quoniam meum inuentum est: obsecro, diligenter attende. Horum ventriculorum origo est supra os sphenoides ethmoides versus: aër autem per nares attractus in frontis, cunealisqûe cavitare aliquandiu conseruatur: alteratus deinde ad hos binos ventriculos, quos ego superiores appellauim per

Situs substantia cerebri.

Aristotelis error.

Cerebri pars posterior non est inanis.

Duo ventriculi cerebri.

Qui anteriores ventriculi vocantur superiores rectius dicuntur.

Vesalii error.

Plexus coriformes. Vfus.

Inuentum Realdis ubi & quomodo generantur spiritus animales.

foramina ethmoïdis ascendit. at in his ventriculis ob assiduam tum cerebri, tum huius reticularis plexus motum, miscetur cum vitalibus spiritibus aër : itaque spiritus animales euadunt ex aëre eo , quo diximus modo præparato , & ex vitalibus dictis spiritibus . quæ res à nemine ante me obseruata fuit . de his loquor qui suos de

Vsus animalium spirituum.

Tertius ventriculus cerebri.

Nervorum spinalis medulla eritua.

Quartus ventriculus cerebri ubi.

Anatomicis rebus cōceptus in vulgus edidère. Animalium verò spirituum utilitas , non vnica est : sed ad omnes sensus extenditur : in dictis nanque ventribus , & cauitatibus geniti ad basim cerebri descendunt : vbi tertius adest ventriculus, cauitas scilicet longiuscula , rectaque ab anteriori ad posteriorē tendens cerebri partem. Non procul autem ab hoc ventriculo nervi spinalis medullæ oriuntur . propterea facile est hisce animalibus spiritibus nervos adire & penetrare, aut certè per eos ad organa sensuum deferri atque illis opem ferre iuxta vniuscuiusq; actiones, quemadmodum per nervos opiticos in oculos delati his actiones videndi subministrāt. idem de auditu , de gustūque dictum puta , & de quavis actione, quæ à cerebro profisciscatur. Præter hanc tertiam nuper descriptam in cerebro cauitatem, quartam quoque obseruare licet inter cerebellum , spinalēque medullam: quæ loco exiguum adest foramen, à tertia ad quartam, quam dixi, cauitatem permeans . ne existimes tamen adeò exiguum esse hoc foramen quin peruium non sit animalibus spiritibus, quæ

pe

per id à tertio ad quartum ventriculum facile admodum transeunt. Atque hic est locus, in quo memoriam contineri aiunt. quartus ventriculus non est admodum capax: atque à tenui membrana continetur. ibi spinalis medulla, ut suo loco dicam, cavitare pedita est instar calami scriptorij, quasi foramen esset, per quod contentos spiritus ad spinalem medullam facile peruenire posse non dubito. supra tertium ventriculum cerebri portionem illi supereminentem videbis satis candidam, quæ callosum corpus appellatur. huic subest alia cerebri portio fornix, & psalloïdes dicta semicirculi figura, vel pontis potius, qui posteriore parte duobus cruribus, anteriore verò vnico duntaxat innitatur. neque inutiliter callosum corpus, fornicemque natura efformauit: sed ne tertiam hanc cavitatem cerebri moles obrueret, atque repleret. inter has autem particulas cerebri, callosum inquam corpus, & cameratum continetur speculum. ita verò dicitur, quòd diaphanum sit. est autem diaphanum, quoniam nihil aliud est, quàm tenuis cerebri membrana hoc loco duplex. hac duplicatione, ut ita dicamus, tenuis membranæ ventriculi superiores circundantur, qui hinc deorsum redeunt. quod nisi hoc speculum præstò esset, quo pacto dextrum, & sinistrum ventriculum diceres: non equidem video: nam huius vnus membranæ ope diuiditur. Post fornicem in extremo cerebro cerebellum versus, atque in

Iter spirituum animalium à tertio ad quartum ventriculum. Locus memorie

Cavitas in spinali medulla instar calami scriptorij.

Callosum corpus. Fornix, & psalloïdes.

Vfus corporis callosi, & fornicis.

Speculū ubi sit in cerebro cur ita dictum.

Speculum quid sit in cerebro. Pie matris duplicata vfus.

Testes in cerebro.

Clunes.

Foramen ano simile.

Vulva muliebris imago in cerebro.

Glandula pinealis.

Glandula pinealis usus.

Error Anatomicorum in usu conarij.

Pelvis et infundibulum ubi sit & usus eius.

finibus superioris partis tertij ventriculi quadā partes eminentes natura finxit, quæ superiore sui parte testium imaginem referunt, & testes ab Anatomicis vocati sunt: prope quos duæ alia particula paulò maiores cernuntur ob earū figuram clunes appellatæ: inter quas foramen illud iacet, quod à tertio ventriculo ad quartum progredi diximus, & ano simile videri potest. In anteriore præterea testium parte ad tertium ventriculum tendenti pars alia cerebri tibi occurret, quæ muliebris pubis, vulvæque speciem non inconcinnè, immò verò pereleganter exprimit. Apud hoc corpus glandula visitur duriuscula colore à cerebri substantia diuerso, hoc est aliquantulum luteo, tenui quadam membrana obducta. hæc glandula conarium, pinealisq; dicitur: torculari affigitur, & penis figurā perbellè reddit: ita vt in cerebro testium, clunium, ani, vulvæ, penis figura nō desit. Vfus huiusce glandulæ mea quidē sententia fuit ob vasorum diuisionem, quamuis quibusdam Anatomicis secus videatur: quòd scilicet factum fuerit conarium, vt spiritus quarti vetriculi clauderet. quod mihi nullo pacto verisimile videtur. In anteriore parte tertij ventriculi cauitatem profundiorē cernes, quæ supra sphenoïdis sellam tandē euadit. hæc cauitas pelvis, & infundibulum appellatur: facta vt excrementa in hisce ventriculis genita excipiat, & ad glandulam in sphenoïdis sella positam trāsmittat. quæ glandula crassa est

est satis extra duras membranas posita, ad cerebri excrementa suscipienda à Diuino opifice fabricata: atque hic est locus ille, vbi tenuis assurgit membrana, vt hos ventriculos induat. Quàobrem valde miror admirabilem Vesalium, qui *Vesalij error.* quamuis optimè nouerit peluim, quam dixi, nihil aliud esse quàm tenuem membranam: ignorauerit tamè hanc ascendentem ventriculos cerebri inuestire. Sed ille tantoperè exoptabat Galeno contradicere, vt nil mirum sit, si is ab illa incredibili rerum nouarum, & populi gloriola captanda raptus nonnunquam longa errat via. Sed antequam ab humano cerebro describendo discedo, hoc adnotes velim, in vniuerso cerebro quatuor duntaxat enumeratas cauitates *Quatuor duntaxat sunt ventriculi cerebri.* reperiri, præterea nullas, licet aliqui sex esse asseuerent, qui faciunt ne intelligendo, vt nihil intelligant. *Cur quidam Anatomici sex putarint esse ventriculos cerebri.* Causa erroris horum est, quòd anfractuosum deductum duorum primorum ventriculorum non sunt ad finem vsque persequuti, atque ita eo deductu imprudèter præterito existimarunt binos alios ventriculos anteriore in parte reliquos esse: qui profectò nihil aliud sunt, quàm portio primorum. Sed posteaquam cerebri historiam absoluimus, consequens videtur, vt de cerebello loquamur. Hoc in posteriore caluaria sub duris membranis collocatur, à quibus, *De cerebello. Situs.* & à tenui quoque vndique circundatur eius tamen circumuolutiones dissimiles admodum apparent his, quas in cerebro supra adnotaui. *Indumentum. Circumuo- lutiones.*

*Substantia.**Vermes in cerebello.**Nullū par nervorū oritur ab cerebello contra Galenū.**Substantia cerebelli non est durior substantia cerebri.**Processū mammillariū ortus.**Progressus.*

substantia cerebelli (quidquid Galenus dicat) minimè dura, existit. suisque gyris tandem deorsum definit in processus binos, quorum figura similis est albis, breuibúsque vermibus iis, qui in lignis cariosis sæpe cernuntur. quorum usus fuit ut prohiberent, ne quartus ventriculus à cerebelli pondere pressus illius substantia obstrueretur. Sed hoc quod dicam de cerebello admirabilius videbitur: cum tamen verissimum esse non semel, sed sæpius magna cum voluptate in frequenti doctorum corona publicè observaverim. Nullum nervorum par à cerebello exoritur, sed à cerebro solùm, quidquid Galenus opinetur, à quo non sunt omnia accipienda, tanquā ab oraculo. Ipse rationem reddit cur cerebellum durius, quàm cerebrum natura efformaverit, ut scilicet nervi duri, spinalisq; medulla inde exorirentur. Sed cerebelli substantia durior nullo pacto est, neque nervus ullus à cerebello originem ducit. itaque ratio Galeni sensui aduersatur, qui in rebus Anatomicis rationibus verisimilibus est præferendus.

De Organis odoratus, & Nervis.

C A P. II.

IN anteriore cerebro circa ipsius basim exortus duorum organorum cernitur, quæ olfactilia Græcis, aliis processus mammillares appellantur: oblongi, tenuésque sunt, & ex ipsa mater cerebri substantia constant, tenui duntaxat membrana inuoluti. Inter cerebrum, os sphenoides, atque

atque os frontis hæc organa deferuntur : supra hæc duræ membranæ occurrunt intuenti , de quibus suprâ abundè meminimus. Desinunt odoratus organa in duas crassiusculas partes , atque hæ in os ethmoides ad latus processus cuiusdam sui eminentioris. ad hæc organa odores per nares attracti ascendunt : itaque distinguimus, quæ bene, quæ malè oleant, propterea odoratus instrumenta meritò appellari possunt.

De Nervis. CAP. III.

SED quoniam de cerebro proximè locuti sumus, quod tum nervorum , tum spinalis medullæ principium existit , ut sensus contra Aristotelis dogma vociferatur, consentaneum est, ut nervorum Anatomem , quo pacto se habeat, subiiciamus . Sed priùs quid sit nervus describamus. Nervus itaque organum est , per quod sensus motusq; ad vniuersum corpus defertur: quæ nanque nervis carent , sensu quoque destituuntur. Figura nervi oblonga, sphaericâque est: substantia mollis : porosos namque fieri nervos oportuit , ut animalibus spiritibus aditus pateret. Tenui, & crassa membrana induitur substantia nervorum, ut tutior sit. Deductus eorum per corpus varius est, atque instar riulorum per telurem. Nervorum origo est à cerebri basi prope tertium vètriculum. ex his dexteri dextrorsum, sinistri sinistrorsum feruntur. omnes qui de nervis cerebri scripsere , illos per paria descripsere, atque omnes vno ore septem aiunt nervorum

Cerebrum est principium nervorum & spinalis medullæ. Cur post cerebrum agat de nervis.

Nervi descriptio.

Figura nervi.

Substantia nervi qualis.

Cur talis.

Cur nervos ambiat dura & tenuis membrana cerebri.

Deductus.

Origo nervorum.

Nervorum septē paria.

*Primum par ner-
uorum cerebri.
Substantia.
Exortus.*

coniugia : quo ordine nos quoque de ipsis age-
mus. Primum ergo neruorum par , siue coniu-
gium , sunt nerui bini crassi satis , mollésque,
quorum exortus ab anteriori cerebri basi non-
nihil distat , & supra sphenoïdis sellam vniun-
tur quidem , sed non in crucis morem , quemad-
modum multi falsò opinati sunt , qui quòd in a-
uibz fortè fortuna viderant hos neruos incru-
ciari , in hominibus quoque reperiri existima-
runt. Vbi ij , quos diximus , nerui aliquandiu cõ-
iuncti permansere , separantur denuò , & ad dex-
trum oculum dexter , ad sinistrum sinister de-
fertur neruus. Sed de horum inuolucris pul-
chrum est scitu , illos ab origine , quam dixi , ad
foramen in oculi orbita situm , per quod præter-
eunt , tenui duntaxat membrana inuolutos esse :
inde tamen ad oculum vsque , in quem terminã-
tur , retinãque dictam membranam efficiunt ,
tum hac , tum dura membrana inuestiri. Hi ner-

*Erymologia
nominis.*

*In neruo optico
nullus porus
manifestus.*

Galeni error.

*Nerui visui in
bone non sunt
perforati.*

*Spiritus puri
possunt transire
per substantiam
rarum neruorum
opticorum.*

ui optici hoc est visui , seu viscrij nuncupantur :
quoniam virtutem visuam ad oculos ferunt.
Substantia constant cerebri spongiosa quidem ,
sed nullus in illa porus manifestò cernitur : quã-
uis id Galenus asseueret , immò verò non modò
in homine meatus nullus est in neruo optico
perspicuus , sed neque in bobus ipsis , aut qui-
busuis grandioribus animalibus. Non est tamen
villo pacto negandum , cùm substantia horum
rara sit , mollisque , quin spiritibus transitus pa-
teat , præsertim purioribus. atque hæc de primo

neruo-

neruorum pari. Nunc de secundo verba faciamus. Secundum neruorum par, primo proximum, fertur per propria foramina, nec non per rimam orbitæ ad quinque musculos oculo famulantes, & ad duos palpebram recludentes, & in quibusdam huius secundi paris ramuli præter dictum iter in musculus temporalem inferuntur. propterea sæpenuerò obseruare poteris mirum consensum oculi, temporalisq; musculi, vt læso temporali musculo oculus quoque lædatur, & è conuerso. Tertium neruorū par ortum ducit retrò magis versus lateralem partem: duo habet principia, quorum alterum maius est, alterum minus: caluariam penetrat deorsum descēdens per id foramen, quod tum huic, tum quarto neruorum coniugio commune est, in varios furculos scinditur, variæque est illius propterea distributio. Alter namque ramus ad musculus temporalem reptat, alter ad orbitam oculi, per supercilium ad frontem, musculūque palpebram constringentem, & ad musculus, qui nasum dilatat: deinde ad nasum quoque, infinitosque propemodum ramulos procreat. Alius ramus tertij neruorum coniugij, per eandem quidem orbitam iter habet, sed inferius. transit autem per tertium os maxillæ superioris, per id foramen, quod circa faciei medietatem positum diximus in tractatu nostro de Offibus. quò postquam ventum est, in multos insuper neruulos diuiditur, qui per labrum superius

De secundo pari neruorum.

*Situs.
Vfus, & iter.*

Læso musculo temporali læditur oculus & contra.

*Tertij paris neruorum ortus.
Progressus.*

Tertij paris diuisio in ramos & usus.

Foramen media facie.

disseminantur, necnon per musculum massetera dictum, p̄rque musculos buccæ: & ipsorum neruulorum portio nasi quoque cauitatem ingreditur. Alius ramus ad superiorum dentium radicem tendit, alius ad inferiorem descendit maxillam, atque huius rami portio ad inferiorum quoque dentium radicem distribuitur. quod reliquum est, prope mentum præterlabitur, vt labrum inferius sentiat. Quartum neruorum par adeò proximè accedit tertio neruorum pari, vt quarti origo, tertij portio esse videatur. Tertio minus est, cum quo descendit versus os, & in quatuor ramulos secatur, qui per foramina quinti ossis maxillæ superioris transeunt, & per palati tunicā anteriora versus progrediuntur. Duo alij ramuli prætereà apud *πρόσθια*, styloidisque processus descendunt ad linguæ radicem, p̄rque illius superiorem tunicam distribuuntur. Vfus quarti neruorum paris, hic fuit, vt gustus organum esset. Tu verò interim adnota Galenum, Vesaliūque in neruorum distributione deceptos, quippe qui quarti coniugij munus, quod diximus, tertio ascripserint. Erroris verò causam tertij, quartiq; paris viciniam fuisse opinor. nam nisi oculatissimus Anatomicus illorū ductus diligentissimè persequatur, facile decipi poterit. Quintū verò neruorū par & ipsum ad basim cerebri, & à laterali parte exoritur circa medietatē, foramenq; cæcum ingreditur, labyrinthūq; in osse tēporali situm,

*Quarti paris
neruorum situs.*

Diuisio.

Vfus.

Galeni & Vesali error.

Causa erroris.

*Quinti paris
neruorum situs.*

firū qui labyrinthus in aures ipsas definit. Sed de *usus.*
 hoc labyrintho quo se habeat pacto, in tractatu
 de ossibus latiū explicauimus. huius quinti ner-
 uorum paris adminiculo audimus. Sed illius hi-
 storiam persequamur. Cū ad labyrinthi di- *Progressus.*
 midium peruenit, crassius redditur, & tantū
 non membranam constituit. hic illa est cauitas,
 quam nos diligentissimē descripsimus, in qua
 illa tria officula admirabilia auditui deseruien-
 tia continentur: ex quibus duo Carpus primus *Ex tribus officu-
lis auditui ser-
uientibus Car-
pus primū Re-
aldus tertium
inuenire.*
 inuenit, tertium meum inuentum est, vt in li-
 bro de ossibus legere est. In acutum processum
 illius officuli, quod femoris similitudinē refert,
 neruulus definit ab hoc quinto pari deriuatus:
 à quo item neruulus tortuosus in hunc labyrin-
 thum inseritur: exit autem per id foramen tem-
 poralis ossis, quod ad radices styloïdis positum
 est. hic neruulus versus anteriorem partem fle-
 ctitur, & serpentis instar temporalem muscu-
 lum ingreditur. Causam huiusce rei Galenus
 assignat, vt scilicet neruus durior euaderet, &
 magis resisteret. hoc eodem loco neruulus alius
 inuenitur, qui & ipse tortuosus incedit. Sextum *Sexti paris ner-
uorum situs.*
 autem par neruorum ad posteriora basis cerebri
 retrōque magis conspicitur variis furculis, radi-
 cibū sue: & per illud foramen descendit, quod
 inter occipitium, atque os temporale situm est, *Distributio.*
 vbi inquam vena iugularis interna ad caluariā
 ascendit. hæc sexta neruorum coniugatio va-
 rio modo distribuitur, ad omnia namque tho-

*Dextri nervi re-
currentis histo-
ria.*

σληττίς quid

*Sinistri nervi
recurrentis hi-
storia.*

** γάμυ*

racis, abdominisq; viscera sensum defert. Post-
eaquàm igitur dexter nervus sexti paris à loco,
quem suprà diximus, egressus est, quosdam ra-
mulos ad musculos hyoïdis, & ad nōnullos la-
ryngis musculos mittit: postmodum descendit
inter venam iugularem, atq; arteriā καρτίδα pe-
nes asperam arteriam ad iugulum vsq; in cuius
regione neruulus mittitur sub arteria axillari
dextra, qui versus caput reflectitur, & trachæ
lateribus adhæret, in laryngisq; cavitatem sese
insinuat, & in γλωττίδα (est autem γλωττίς for-
mandæ vocis organum) implantatur tandem:
atq; hæc est dexteri recurrētis, seu reuersui ner-
ui brevis, fidelisq; descriptio. sub iuguli regione
neruulum à se emittit, tum ad πλεύραν, tum ad
radices costarum: alium rursus neruulum mit-
tit ad pulmonem dexterū. quod superest descē-
dit œsophago affixum vsq; ad superius vētriculi
orificium. sinistri autem recurrētis nervi histo-
ria prolixior erit aliquantulum. Sinister nervus
recurrens, quum primū à suo fonte scaturit,
ramulos promit ad eosdem musculos, ad quos
dexter: descendit quoq; eodem itinere, in si-
nistriq; iuguli regione ramulos mittit ad πλεύραν,
ad costarū radices, & ad pulmonem sinistram:
deinde descendit adhuc, donec * βρόγχον maio-
rem arteriæ aortes penè attingat: quo loco mit-
tit neruum, qui sub hac arteria reflectitur, &
sursum denuo vertitur versus originē suam, as-
peræ adhærens arteriæ: atq; item ingreditur in-
ter os

ter os innominatum, & scutalia dicta in parte laryngis interna, & in glottidem ingreditur. Atque idcirco hi sunt nerui celebres, quos tanti facit maximus Galenus per quos virtus efformandæ vocis defertur, propterea vocales etiam vocatur. Hunc vsum in viuâ canis sectione planè perspicere vnicuique licet. Si quis enim alterum ex his præscindat, semiuocalis redditur: sin ambo, prorsus obmutescere cogitur. Gal. vij. li. de Vsu Part. causam inquiri, quamobrem natura sinistrum recurrètem neruum ad arteriam axillarem sinistram non conuerterit, eumque in huiusce rei æquilibrio inuenio sibi omnino non satisfacere, nam hoc argumento dimisso glottichomij organi descriptionem aggreditur. Non est tamen vlllo pacto à Græcis hominibus Galeno detrahendū, præsertim in hac materia de recurrentibus neruis. Quamuis enim veram causam supradictæ rei non attigerit, sua tamen diligentia, & incredibili cupiditate iuuandi, posteris primus neruos reuersiuos ostendit: in qua inuentione, vt Græcis hominibus mos est, se subinde effert. Ab hoc sinistro recurrente alius oritur neruulus, qui sequitur radices magnæ arteriæ, & per cordis tunicâ distribuitur: sed ob sui exiguitatem ad illius substantiam minimè penetrat: & hæc vera causa est, cur natura sinistrum reuersiuū neruum sub magna arteria reflexerit, non autē sub axillari, ne scilicet neruus iste adeo tenuis, atq; exilis in cordis motibus, qui perēnes

Vsus nervorum reuersiuorum in viuâ sectione canis cernitur.

Gal. in reddenda causa cur sinister nervus recurrens non conuertat ad arteriam axillarem sinistram nō satisfacit sibi.

Galenus primus inuenit neruos recurrentes.

Alia distributio.

Vera causa cur sinister recurrens non reflectatur sub arteria axillari.

*Alia distribu-
tio.*

*Cur os ventriculi
sit sensu adeo
exacto.*

*Cur os ventriculi
li appellatur
καρδια.*

*Alia distribu-
tio.*

*Alia distribu-
tio.*

*Septimi paris
neruorum situs.
A cerebro nō a
cerebello oritur
septima neruo-
rum conjugatio.
Galenus error.*

sunt, dum animal spirat, disrumperetur. Quod
superest huius recurrentis nerui, descendit œso-
phago adhærēs vsque ad superius ventriculi ori-
ficiū. Quā primū autem tum dexter, tum
sinister recurrens neruus ad hoc, quod dixi, ori-
ficiū ventriculi superius peruenit, in multos
neruulos quasi retis in morem diuiduntur, &
hoc orificiū amplexantur, & hanc ob causam
tam exacto sensu præditum est, vt in oris ventri-
culi doloribus cor ipsum dolere videatur: hinc
cardiacus dolor dicitur, quod καρδια Græci ve-
teres os ventriculi appellauerint: quoniam ipso
læso eadem penē symptomata, eadē animi de-
liquia consequantur, quæ ad cordis læsionem
consequi consueuerunt. Dexter itaque ex hoc
loco ad membranam iecur inuoluentem tendit
& hic neruulum parit, alium quoque præter
hunc ad bilis vesiculam designatum, alium in-
ferius ad sinistrum renem, & præterea ad supe-
riorem omenti partem. mittit insuper ramulos
ad mesenterium. Eodem pacto à sinistro recur-
rente mittitur neruus ad lienem, ad inferiorem
omenti partem, ad renem sinistram, & ad vesi-
cam: atque hic est finis neruorum recurrētium
in maribus, in fœminis autem præter dicta loca
ad vterum quoque delegantur. Septima neruo-
rum conjugatio versus occiput magis originem
habet suam: sed à cerebro & ipsa, non à cere-
bello, vt Galenus voluit: variis radicibus, per-
exiguīs referta est, illi propriū foramen dica-
tum

tum est obliquum in occipite: vbi verò caluariam egressa est, versus anteriora primùm repit: deinde scinditur in neruulos complures ad musculos linguæ, hyoïdisque & laryngis delatos: quorum maior sub maxilla inferiori discurret, nec non sub lingua vsque ad eius extremum, vt illam sensus in vniuersum, motusq; participem reddat. Quartum verò par, vt diximus, gustandi sensum illi priuatim defert. linguæ enim munus inter reliqua est saporum discretio. Atq; hæ sunt breui descriptæ septem neruorum coniugationes, de quibus tum veteres, tum recentiores meminere. Tamen duo alij neruuli adhuc restant in caluaria, & ipsi describendi, ex quibus alterum olfecit Vesalius noster, alterius (quod sciam) nemo ante me quicquam meminit. Inquit itaque Vesalius neruū hunc esse quinti paris radicem, fortè ne ab aliorū Anatomicorum placitis facilè abscedere velle videretur, aut neruorum historiam confundere. Mihi verò octauum par neruorum cerebri videtur esse, quod vnus Vesalius vidit quidem: sed inter quintæ coniugationis radices adnumerauit. Sub basi cerebri versus anteriora incedit, & per propriū foramen in sphenoidē collocatū transit ad musculum temporalem, latitantēq;, & massetera, & à quinto neruorum coniugio illius distat origo. Nonum par neruorum, cuius neque Vesalius ipse verbum fecit, quòdq; ego primus inueni, est neruorum exilium par, ortum ducens à

Duo nerui præter septē paria.

Vesalius excusatur.

Descriptio octauī paris neruorū cerebri.

Noni paris neruorū descriptio.
Nonū par neruorum cerebri.

binis illis cerebri processibus, qui nates appellantur penes testes: tenues satis sunt, & exiles, ut dixi: faciem versus accedunt, transeuntque apud tertium, & secundum par, atque in tertium palpebre musculum inferuntur. ramulus tamen huius noni paris ad quintum musculum oculi deferretur. Sed si quis rei nouitate commotus, hac duo paria neruorum non admittat, sed aliorum radices esse contendat, nihil moror. Mihi sat est locum admonuisse, digitumque fontem ostendisse, ne aliquis in cerebro nervus prætermisus negligentia nostra videatur. Animaduertendum præterea est Galenum velle nervos sensum deferentes ab anteriori cerebri parte exoriri, motiuos verò dictos à posteriore. Sed pace Galeni dixerim (quem tamen semper maximi feci) sensus dictat, motiuos, durosque quoque ab anteriore parte originem ducere, ut secundum, tertiumque coniugium. Adde nervos omnes, cum à visoriis, & sensum deferentibus discesseris, non modò sensum, sed motum etiam deferre. Sed cum historiam neruorum cerebri, breui, & dilucidè abso-uerimus, tempus est, ut de spinali medulla pertractemus, quæ elongatum cerebrum videtur esse.

De Nervis medullæ spinalis post caluariam.

C A P V T IIII.

Continuatio huius tractatus cum superiore.

C V M Cerebrum hætenus descripserimus, & à cerebro exorta nouem coniugia neruorum quanta potuimus breuitate, ac minori quo fieri potuit, vel nullo potius contradicendi studio,

dio, iam illi sunt nobis nunc nerui describendi,
 qui à spinali medulla post caluariam exoriūtur :
 sed antea dicam⁹ quid ipsa sit medulla spinalis. *Medulla spin-*
 hæc nihil aliud est, quàm cerebrū oblongū illud *lis quid.*
 quidem per vertebrae & sacrum os deductum.
 Est autem eadem cum cerebro substantia: quare
 nihil mirum est, si quemadmodū cerebrū ipsum
 absq; vlla Anatomicorum controuersia frigidū
 est, ita frigida ipsa quoque sit, quidquid dicat *Spinalis medul-*
 Peripatericorum princeps Aristoteles, qui cū *la frigida est.*
 frigidissimum esse cerebrum asseueret, calidissi- *Aristot. error.*
 mā esse inquit spinalem medullam. quæ senten-
 tia ita absurda est, vt tanto philosopho indigna
 non esse non possit. Sed ad rem redeamus. licet
 spinalem medullā perpetuò dicamus eadem à
 summo ad imum nomenclatura vtentes, scito *Substantia me-*
 tamen substantiam eius in homine ipso nō esse *dulla spinalis*
 quemadmodum in brutis ad extremum vsque *qualis sit in ho-*
 medullarem, sed in homine ad lumborum ini- *mine.*
 tium vsque duntaxat medullam refert. Differt *Differētia cere-*
 spinalis medulla à cerebro in duobus. nā primò *brī, & spinalis*
 cerebrum diastolen & sistolen habet instar cor- *medulle.*
 dis vt suo loco explicauimus, at spinalis medul-
 la motu caret: secundò per ossa quæ mouentur
 deferri medullam hanc conspicietis. stabilia
 autem sunt cerebrum ambiētia cranij ipsius os-
 sa. duplex igitur est spinalis medullæ princi- *Spinalis medu-*
 pium, ex quibus hoc maius, illud minus exi- *la principium*
 stit: maius à cerebro emanat, à cerebello minus. *duplex.*
 quod à cerebro deducitur vnicū est, quod autē

Principium spinalis medullæ maius.

Ortus spinalis medullæ unde.

Error nonnullorum.

Spinalis medulla ubi crassior.

Galenus & Vesalii error.

Inuolucrum spinalis medullæ.

à cerebello bifidum, itaq; tum in dextrum, tum in sinistrum diuiditur. sed ad maiorem spinalis medullæ originem reuertamur. ita à basi cerebri proficiscitur, vt ipsa cerebri basis videatur esse. si enim originem illius vt circumscribitur verè consideretur, à neruorum optidorum origine parum distare comperietur. Oritur igitur, vt apertius dicamus, spinalis medulla ab anteriore cerebri parte. hîc enim candide lector eius origo sumenda est, non autè, vt nonnullis placet, cùm vertebrae ingreditur, quo loco nulla donatur circumscriptione. Cùm itaque tam excelsa in loco eius origo cõstituenda sit, ita enim verè exoritur, adnotandum est cogi nos fateri, tertium, quartum, quintum, sextum, septimum atque octauum neruorum par nō à cerebro, sed à spinali medulla exoriri. Dum hæc perforamen occipitij egressa, vertebrarum foramen primum ingreditur, in hoc primo descensu crassior est aliquantulum, quàm in reliquo itinere. Cùm verò ad summum thoracem peruenit vsque ad summitatem ossis sacri, equali crassitie cernitur, licet Galenus & post ipsum Vesalius in hoc mirè decipiãtur existimãtes spinalis medullæ substantiam neruis gignendis absumi. est enim ratio ipsorū voluntaria potius verisimilissq;, quàm vera, cùm sensu oppositum pateat, quòd scilicet in sacro dūtaxat ossē tenuior existit. Caluariam egrediens medulla spinalis tum pia, tum dura matre circundatur, itaq; neruos quos ex se promit

mit circundat, cūque illi per ossa quæ mouentur transeundum esset, quod cerebro minimè vsu venit, natura aliam membranā tenuem superinduit, ne ab ossis duritie læderetur. In quā membrana tota errat via Galenus noster, in hoc *Galenus error.*

parum anatomicus. nam hanc, quam tertiam tuniculam Libro de Ossibus appellat, ligamentum esse existimauit, quo vertebræ vnā concterentur. quæ sententia falsa admodum est. nā vertebrę propriis ligamētis nullo sunt pacto destitutæ, quemadmodum in nostro tractatu de ligamenti fusiū explicauimus. quis enim non videt tuniculam hanc tenuem colligandis ossibus, quæ tātopere mouentur (sæpe namq; multūque mouentur vertebræ ipsæ) idoneā nullo pacto fuisse? Spinalis igitur medulla ad extre-

Spinalis medulla cum progreditur fit neruea

rum vsque thoracem duntaxat medullosa est, sed cum progreditur neruosa euadit, hoc est funiculorum instar, cuiusmodi ipsius neruos cernes. hoc autem ob ipsius diuisionem factū putata. Ex hac historia causam faciliè venaberis, quid sit quamobrem materia per spinālē medullam descendente læsio maior inferiore parte præfentiatur. In promptu causa est. quoniam hoc loco neruea est spinalis medulla, cū in aliis partibus medullam præ se ferat. Medullosi autem vocē huic substantiæ improprie (ni fallor) adscribimus, cū illi medullæ qua ossa ali dicuntur, nihil certè simile habeat, sed cerebri potius substantiæ affinis esse videatur. præterea fal-

Cur læsio in inferiore parte spinalis medullæ sit maior.

Galenus error.

sum illud quoque esse palàm prospicies, quod Galenus secundo de Temperamentis libro scriptum reliquit, spinalem scilicet medullam ea medulla qua ossa nutriuntur, molliorem esse.

Spinalis medullæ usus.

Creavit illam altissimus rerum omnium opifex, humanæque fabricæ admirabilis architectus, ut ab ea nervi exorirentur, qui tum sensum tum motum ad reliquas corporis partes deferrent, quæ omnia, motum inquam & sensum cerebrum

De primo pari nervorum medullæ spinalis.

suppeditat. Igitur posteaquam è calvaria exiit hoc nervorum coniugium, inter occipitiū primūq; cervicis vertebram primum nervorum par adeò clanculum emittit, ut mirabile videatur esse spectantibus, atque adeò naturæ miracula speculantibus & introsipientibus, quo pacto exeat ne in motibus capitis læderetur. Exit

*Mira naturæ providentia.**Primum par nervorum spinalis medullæ.*

itaque hoc primū nervorum par (cur enim hoc quod est pulcherrimum nō repetemus?) à posteriore capitis parte inter occipitium primūque vertebrā. quod ut fieret facilius cavitatem quandam parvam observato à natura factā tum in occipitio tum in primæ vertebræ parte illa, quam in spinam desinere oportebat. Post exitum hæc nervorum cōiugatio in nervulos spargitur ramulosque perexiguos, neque id mirum est enim ipsa quoque exigua. ad illum musculorum chorū distribuuntur, quos parvulos esse, capitique deferuire suo loco diximus. oriebantur autem à prima vertebra atque ad occipitium deferrebantur, rursus ab occipitio ad vertebram secundam.

secundam . sed ad primum neruorum par redeamus. prius quàm exeat supra spinalem medullam reflectitur , quæ res spectatu pulcherrima est, & iucundissima . At secundum neruorum coniugium seu par, cùm per vertebrarum latera egredi nequeat , binis principiis insignitur. Ex quibus quod maius existit per posteriora emergēs fertur hinc atque hinc per latera spinæ secundæ vertebræ . vbi egressum est in surculos cōplures diuiditur, qui sursum reflectuntur & ad capitis cutem, ad aures & ad nonnullos musculos tendit. alterum eius principium, quod est minus , per anteriora egreditur inter primam secundamque vertebram à dentis lateribus (scitis autem nomine dentis quid sit audiendum cùm de secunda vertebra ceruicis fit mentio). Distributio verò huius est ad quintum musculum laryngi atque œsophago communem . Tertium par neruorum spinalis medullæ exit per foramen secundæ & tertiæ vertebræ commune ab earum lateribus , vt de aliis audistis, deinde in quatuor surculos primò diuiditur, postmodum in alios complures , adeò pulcherrima fiat huius tertij neruorum cōiugij distributio tum in nonnullos capitis musculos, tum in oblongum illum quadrangularem à carnea membrana profectum, qui labrum obliquè deorsum trahit. distribuitur etiam ad longum illum musculum scapulam sursum trahentem : & ad cutem colli disseminatur . Quartum par

De secundo pari neruorum spinalis medullæ.

De tertio pari neruorum spinalis medullæ.

*De quarto pari
spinalis medul-
le.*

inter quartam tertiámq; vertebam exire vide-
bis per foramen vtriusq; cōmune. quod de sub-
sequentibus quoque omnibus intelligendū est,
quod memoriæ mada. nolo enim hoc idem de
exitu neruorū per foramen duabus vertebis cō-
mune ampliū in hoc tractatu repetere. Vbi exi-
uit secatur in furculos multos, ex quibus aliqui
ascendūt descēduntq;, alij per posteriorem par-
tem reflectūtur. Hæc summa est magnā esse hu-
ius quarti neruorū paris distributionem. neruu-
li insuper ab hoc mittūtur ad musculos ceruici
deseruiētes, necnō ad musculū cucullarem di-
ctum. Ex anterioribus autem nōnulli in muscu-
los stomacho substratos inferūtur, & vnus ex his
tenuis admodū vnitur cum ramo quinti paris,
& quintus cū sexto, ex quibus tribus principiis
nerui illi cōstituuntur, qui ad septū trāuersum
proficiscuntur descendentes iuxta mediastinū,
ac supra pericardium. Quinti paris exitus est
inter quartam & quintā vertebam hoc in mul-
tos neruos diuiditur, tum anteriores, tum po-
steriores. ramus anterior qui magis est conspi-
cuus vnitur cū ramo quarti paris, & in quibus-
dam ramulum à subsequētibus suscipit. hic ner-
uus nunc à tribus constructus descendit ad la-
tus œsophagi per anteriora vertebrarum colli,
descenditque semper ad nerueā vsq; septi trans-
uersi partem, in qua parte huius nerui terminus
adeſt. Sed in nonnullis (vt iam suprā attigi)
exoritur à quarto pari. Sed hoc rarò videbis,

nam

*De quinto pari
spinalis medul-
le.*

*Diuisio & di-
stributio.*

nam sapius oritur à quinto. Quum primùm autem ad thoracis cauitatē peruenit, natura prudens, ne ob assiduum pulmonum motum disrumperetur, membranis illum colligauit suprā infrāque, & vt dixi transit supra pericardium. Huic neruo vena se comitē præbet. At inquires cur summus rerum opifex Deus tantā arte hunc neruum muniuit? ego verò respondebo illud ob septi transuersi nobilitatem factum fuisse: est enim musculus rarus ac nobilis, immò verò musculorum omnium humani corporis nobilissimus existimatur. Quod reliquum est huiusce quinti neruorum paris variè distribuitur, ramū namque vena atque arteria comitante per medium illud mittit foramen, quod in posteriore scapula situm est, ibiq; ad musculos disseminatur è scapula exortus, quiq; humero dicantur. Alius ramus descēdit per colli latera, vt ad *ἐπωμίδα* & ad cucullarem musculos distribuatur. Alij rami tendunt ad humerum, alij ad quadratum musculum labra obliquè deorsum trahentem, item ad quartum musculum hyoïdis. alij rami cauitati scapulæ mandantur, vbi ad musculum in eius cauitate latitantem disseminantur, & ad secundum thoracis musculum, nec non ad cutem ibi positum. Et quoniam quinta hæc neruorum coniugatio ad musculos humero deferuientes disseminatur, placuit Vesalio illam inter brachij neruos connumerare. Ego verò quoniam nō transit vnā cum quinque neruis

Septum transuersum.

*Vesalius excusatur.
Opinia propria.*

manus, illam inter manus neruos nullo pacto adnumerabo. qui manus nerui quoniam eorum Anatome fidelis & perspicua exoptata admodum est, atque expetita, quippe quæ scitu digna sit, ego de illis mox priuatim agam capite peculiari, vt omnia faciliora reddantur, & perspicua magis.

Cur de neruis manus particularim agat.

De Neruis manus. CAP. V.

Manus est organum organorum. Manus est organum ante organa.

Cur tot organa in manu.

Cur tanta arte constructa.

Cur quinque paria neruorum in manu.

Ortus quinque parium neruorum.

Vbi unisuntur.

Vbi separantur.

Cur vulnera ad scapula præcessum internum sunt lethalia.

MANVS, vt diuino Aristoreli rectè videtur, organum est organorum, atque organum ante organa, quæ eo quo cernitis artificio fabrefacta est, vt liberis minimèq; impeditis organis prædita esset, & vt sensu tactus acerrimo polleret, quinque neruorum paria natura ad manum ipsam relegat, tria nimirum ad extremos digitos, duo ad extremam vsque manum. quæ quinque memorata paria neruorū à spinali medulla ortū ducunt, egressa per cōmunia foramina vertebrarū colli subsequentiū & à prima thoracis. vniūtur hæc adeò postquā egressa sunt, vt hoc ab illo neruorum coniugiū distinguere difficillimum sit vel illi qui magnos progressus in Anatome fecerit, separātur tamē deinde, videnturq; rete quoddam cōstituere, vel quid simile cordulis illis & infulis, quæ in Cardinaliū galleris Romæ cernūtur. Hæc quinque paria neruorū eodē itinere sub clauicula incedūt, nec non ad scapulæ processum internū, quo loco sociæ quæque trāseūt vena basilica, & axillaris arteria, propterea ne mireris si Anatomes peritus medicus vulnera

vulnera hac in parte accepta formidosa esse & timoris plena assistētibus prædicet. Sed de singulis separatim agamus. Primū igitur par nervorum manus quod inter quintam ac sextam vertebra[m] fertur, vbi ventum est ad cavitatem sub alis neruum emittit ad primū thoracis musculū, alium ad secūdum scapulæ, ramum quoq; alium ad primum & secundū cubiti musculum, à quibus flectitur: trāsit deinde (si eius progressum persequare) sub primo musculo bicipiti per internam humeri partē, sed post cubiti flexurā venæ cōmuni se socium præbet, atque vnā secū ad extremam manum deducitur, interim variis in locis ramulos ad cutem ipsam mandat. Secundi paris transitus per eundem est locum de quo in primi paris itinere verba fecimus, tres nervos ad musculos humero famulantes mittit, ex quibus vnum per illud scapulæ foramē exit, quod sub ala latitat, variè primò distribuitur, deinde recta fertur ad flexurā vsque, parte humeri anteriore, inter cubitum ac radium præterriēs, in flexura verò ramulos mittit ad quartum musculum, quintū ac sextum, à quibus vniuersi quinque digiti flectuntur. at vbi radij medium prætergressum est, neruulus emittitur satis apparens, profundus, qui incedit adhærens ligamento illi, quod inter cubitum radiūmq; situm est, tandem in musculum quadratū implātatur, qui, vt nostro de musculis tractatu explicauimus, penes brachiale sitū manū agit in pronum,

*De primo pari
nervorum manus.*

Post cubiti flexuram nervus cum vena cōmuni.

De secūdo pari.

Vesalij error.

quamuis Vesalio nostro secus esse videatur. Maior huiusce nerui truncus cum magis descendit atque inferiora petit, transit sub ligamento brachialis interno, quo loco ramulos parit musculis pollicis dicatos, & alios ad portionem eorum musculorum quos oblongos esse diximus, & à quinti musculi tendinibus exoriri: alios insuper ramulos mittit ad partem illorum musculorū, qui à postbrachiali exorti, primos articulos digitorum flectunt. hoc itinere peracto in ipsa manus vola in quinq; nervos, quod plurimum est, sed quandoque in septem secatur, horum quinque duo per latera pollicis ad illius extremum usque pergunt, interim ad cutim furculi ex illis pullulant: duo alij ad indicem vel potius ad indicis extremitatem usque mittuntur, cutim interim propaginibus subeuntes. quintus verò per internam digiti illius partem graditur, qui medius appellatur, sed in quibus septenario numero donatur (donatur enim in nonnullis) sextus per externam regionem medij digiti, septimum per internam auricularis iter habet. Tertium par neruorum qui manui addicti sunt, per eundem locum iuxta internum humerum & inferiorem cubitum fertur, deinde supra articulum inter olechranon atque internum humeri tuberculum, ubi furculos profert, qui per primum musculum à quo fit latus tendo, disseminantur, item ad secundum tertiumque brachialis musculum, deinde progreditur iuxta longitudinē cubiti

*In vola manus
nunc quinque
nerui nūc septē.*

De tertio pari.

cubiti internam , cuius dimidium , & amplius
 ubi præteriit in duos ramos inæquales finditur:
 alter nanque maior est, alter verò minor, & eo-
 rundem alter introrsum fertur, extrorsum alter.
 Interior transit sub ligamento brachialis inter-
 no ibique ramusculos producit ad primum illū
 musculum , quem ego primus obseruavi latum
 tendinem dilatantem: deinde ad sextum à quo
 minimus digitus ab aliis deducitur. surculos itē
 profert aliis musculis dicatos qui digitos exten-
 dunt, quos à tendinibus quinti musculi tertium
 digitorum articulum flectentis oriri suo loco di-
 ximus. mittit præterea ramusculos alios ad reli-
 quos musculos primum internodium flectētes,
 quique ossibus postbrachialis adhærēt, hoc per-
 acto in tres nervos disseccatur , & nonnunquam
 in quinque , qui in extremos digitos terminum
 habent, per latera auricularis, & anularis delati,
 licet in quibusdam in medio digiti medij sistat.
 mittit insuper ramusculos ad cutem , atque ad
 volam ipsam. quamobrem pars interna manus
 adeò acuto atque exquisito sensu tactus præ-
 dita est . minor ramus per exteriora illius tran-
 sit, & suprà brachiale reflectitur , in trēsque ra-
 mos finditur : & nonnunquam in quinque per
 superiora postbrachialis , & per latera auricula-
 ris atque anularis, nec non per medij dicti digiti
 medietatem, ad quorum extremum vsque defe-
 runtur , quemadmodum de internis diximus.
 In hoc tamen differunt , quòd interni externis

*Musculū à quo
 latus tendo di-
 latatur primus
 inuenit.*

*Cur interna ma-
 nus adeò sen-
 tiat.*

multò maiores existunt : fuitque hoc prudentis : naturæ optimum consilium , quippe quæ non ignorabat externa internis facilius lædi posse : atque hætenus de tertio pari neruorū manus :

*De quarto pari
neruorū ma-
nus.*

nunc de quarto . Quartus neruus, seu quartum coniugium , omnibus neruis qui in manu ceruntur maius existit, eodem cum aliis exitu atq; itinere, sed cū ad humeri dimidium plus minus deuentum est, ad exteriora illius ac superiora reflectitur, atque ex hoc loco paruuli neruuli emanant ad binos musculos cubitum flectentes , deinde ad alios musculos exteriores, & ad humeri , cubitūque cutim . delitescere quoque comperies inter alias musculos quartum hunc quem nunc describimus neruum, & per cubitū ac radium tendere ramulos ad illos etiam musculos emittentē qui à medio cubito exorti pollicis suam operam præstant. Sed cū ad brachiale prouenit illico quasi truncus in quinque ramos scinditur , ex quibus bini ad pollicem relevantur ad indicem bini, quintus autem ad medij digiti extremum vsq; instar aliorum. Ex illis autē quos ad pollicem proficisci dicebamus furculi paruuli exiliunt ad musculum qui inter pollicem & indicem locum habet: illud etiam præter hætenus dicta obseruato , magnā esse huius quarti nerui ad exteriores cubiti musculos distributionem . At quintus tenuis admodum est & cutaneus, cuius ramuli humeri, cubitūque cutem sensu præditam reddunt: mittit quoque ramos

*De quinto pari
neruorū manus*

mos sub ala. quod reliquū est venam basilicam comitatur, propterea huius nerui idem est cum basilica deductus, è quo furculi variè per cutim ipsam distribuuntur, & tandem ad extremā manum desinit. ab hoc eodē neruo quinto sub iugulo mittuntur nerui ad septimum capitis musculum, ad primum & quartum hyoïdis, ad primum & secundum thoracis, ad septimū humeri, necnon ad binos musculos cervicem in latus trahentes. atque hic est locus è quo neruuli ad membranam carneam demādantur, deinde ad colli cutem. Itaque se habet neruorum manus distributio cuius historiam breui profecuti sumus. sed anteaquam ab hoc argumēto discedamus scito furculos & propagines exiguas nervorū manus eodem pacto in omnibus hominibus non distribui, licet in truncis ipsis rarò admodū varietas notatu digna reperiatur. si enim in hoc per medium musculum tenderet in illo prope latera, nihil est quod in re Anatomica veratos in admirationē trahat, & quoniam in illis qui vulnerātur quandoq; sensus amittitur, licet motus integer maneat, in aliis cōtrā motu amisso sensum permanere cōplures existimarūt duas neruorum differētias ubiq; reperiri, vel ut apertius dicamus vbi nervos adesse oportuit, duplex adesse neruorū genus, alterū motum afferre, ab altero sensum afferri, sed hæc opinio in illis meaquidem sententia locum habuit, qui veram nervorū distributionē ignorabāt: tu verò scito ner-

Cur in vulneratis quandoque sensus, quandoque motus amittatur, quandoque uterque.

nos ad cutim desinentes, quoniam cutis motu caret, sensum duntaxat afferre, eos verò qui musculis additi sunt, sensum motumque illis impertiri. Quocirca si nerui cutis fauciantur, aut si illos noxia materia laceffit & detinet atque pre-occupat, quid mirum si cutis ibi non sentiet? & quoniam nos dum cutim tangimus cutis nobis duntaxat sensus occurrit. neque enim sunt in superficie musculi, si illi nerui lædentur, qui in musculos inferuntur, illis illæsis qui feruntur ad cutim amitteretur quidem motus, sed perstabit sensus: quòd si vtrique noxa illata fuerit, & sensus & motus peribunt. hæc autem noxa intelligitur illata neruo priusquam musculum in loco qui retrahi possit & contrahi, quo facto vniri & coalescere nullo pacto possit. si enim nerui læsio contingat in ea parte quæ iam musculum ingressus erat, vniri potest, neque sensus motusve amissio perseuerabit, quemadmodum ego sæpenumero expertus sum in multis ægris, qui mihi in dies innumerabili multitudine curandi proponuntur, quod etiam Ludouico Philippino viro docto familiari meo Anatomen studioso lubens ostendi.

*Lesio neruo quæ
non amittitur
neque sensus
neque motus.*

De Neruis thoracis. CAP. VI.

*Cur nerui thoracis
sint minores
neruis manus.
Nerui thoracis
sunt paria undecim.
Error Vesalii.*

THORACI nerui multò minores contigere, quàm manui, neque enim tantos esse necessarium fuit. sunt autem vniuersi paria undecim, non duodecim vt Vesalio placuit, quem miror non animaduertisse, cum tamen oculatus simus:

simus fuerit, vertebrae licet duodecim numero sint, tamen foramina undecim habere, non plura, totidemque esse costarum intervalla. *Oritur.* Oriuntur hi quoque à spinali medulla: exeunt verò è foraminibus vertebrae thoracicae còmunibus: neque tamen ab his ut à nervis manus rete constituitur. & ne longam adeò prolixamque de nervis thoracis historiam texamus (quo enim pacto possemus prolixitatem effugere, si unumquemque sigillatim & seorsum describeremus) de omnibus simul hæc audito. Post eorū egressum è foraminibus vertebrae bipartitos cernes, non tamen æqualiter. etenim ex his alter maior, alter minor existit, & alterum anteriora versus, alterum versus posteriora reflecti secando facillè cernes: anteriores igitur sub costis progrediuntur per partem inferiorem, ubi sinus ille per costarum longitudinem cernitur, de quo in libro de Ossibus proprio capite loquuti sumus. atque hoc comitantur rami venæ sine pari, nec non rami arteriæ magnæ, quæ tria vasa, nervus inquam, vena, atque arteria, per eundem locum transeunt, nimirum sub succingente membrana à vertebrae ad sternon usque, iuxta longitudinè costarum atque earum cartilaginum, tanquam lineæ paralelæ & æquidistantes prope musculos intercostales incedunt: in quos externos inquā, atque internos ramulos mittunt. qui musculi numero sunt sexaginta octo, ut in nostro tractatu de Musculis latius explicauimus, præter hanc

Cur de nervis thoracis agat in uniuersum.

Dimissio & distributio.

quam hæcenus descripsimus neruorū thoracis distributionem, alij sexto thoracis musculo sensum afferūt in parte eius interna collocato, quique anteriora ipsius constringit. A superioribus autem nerui fluunt per primum humeri musculū, nec non per secundum scapulæ: deinde ramuli alij proficiscuntur ad mammillas & ad mammillarum papillas deducti ex his neruis, qui ordine consequuntur, deinde deorsum magis à neruis qui in media thoracis regione collocantur pululant nerui qui ad musculos abdominis obliquos descendentes demittuntur, in quo magna horum fit distributio. à postremis autem thoracis neruis alij deciduntur, quibus gaudet septi transversæ pars carnea. Quod restat horum anteriorū neruorum tum ad cutem thoracis, tum ad partem cutis abdominis distribuuntur. Neruos item mittunt ad musculos œsophago substratos, & ad radices costarum. cum his autem neruis sexta neruorum cerebri coniugatio implicatur. Altera horum thoracis neruorum diuisio ad posteriora ipsius reflectitur, & à superioribus enixi nerui sensum deferunt primis, secundisque capitis musculis, ad musculos cervicis ad quintum sextumque humerum circumagentē, ad primum & quartum scapulæ, ad thoracis tertium, & ad scapulæ cutem: alij proficiscuntur ad musculos dorsales, & ad quartum thoracis ad cutem dorsi distribuitur illud tamē animaduertendum est, hanc cutaneam neruorum distribu-

Cutanea distributio neruorum

tionem

tionem non esse in omnibus æquatā, propterea
 neque alibi in aliis corporis partibus superficia- *non est in omni-*
 riis certo ordine atque examussim describi ab *bus eadem.*
 Anatomico quātumvis accurato potest aut de-
 ber: nam neque certum ordinem, neque nume-
 rum certum obseruare possumus, quoniam nūc
 in plures ramos, nunc in pauciores sese trunci
 exerunt atq; explicant, & nunc aliū, nunc de-
 cliuius eorum fit distributio atque iter.

De Neruis lumborum. CAP. VII.

QVONIAM Lumborum regio, vt in libro
 de Ossibus dicebamus, thoracem imme- *Cur post nervos*
 diatē sequitur, post historiam de neruis illius, *thoracis agat de*
 lumborum neruos describere operepretiū duxi. *neruis lumborū*
 Sunt lumborum nerui thoracis neruis maiores. *Nerui lumborū*
 & quamuis ratione superiūs adducta, dum de *maiores neruis*
 numero neruorum thoracis loqueremur, cū *thoracis.*
 in quinque vertebra lumborum quatuor dun- *Cur sint quin-*
 taxat foramina reperiuntur, quatuor neruorum *que paria ner-*
 paria solū, non quinque esse deberent, sunt ta- *uorum lumbe-*
 men coniugia neruorum huius partis quinque *rum licet qua-*
 numero, quoniam inter extremas thoracis ver- *tuor tamen sint*
 tebras & primam lumborum incedit primum *foramina in ver-*
 neruorū par, quod cū ab vltima costa recedat, *tebris lumborū.*
 inter lumborum neruos potiūs quā thoracis
 adnumerandū est. adde quod vētri inferiori de-
 seruiunt nō thoraci. Hæc itaq; prima cōiugatio
 neruorū, qui lumbis addicti sunt, egreditur per
 foramen illud cōmune, quod est inter duodeci-
 mam thoracis vertebram, & lumborū primam,

De primo pari
neruorum lum-
borum.

tenuis est satis & sub peritonæo progreditur; post egressum finditur in ramos binos, quorum alter altero maior existit. qui maior est ad anteriora quidem fertur, sed prius ramusculos parit in principia septi transversi: quod septum à corporibus vertebrarum lumborum exoriri suo loco diximus. alios insuper ramulos mittit ad principia quinti femoris musculi cognomento lumbalis, & alios ramos ad musculos abdominis. qui verò est minor nervus ex hac prima coniugatione ad posteriora reflexus in musculos dorsi terminatur. Secunda coniugatio exit inter primam secundamque lumborum vertebram, sub peritonæo graditur, & sub quinto femoris musculo, in quem ab hoc quoque coniugio ramuli immittuntur. assurgit deinde, sub peritonæo tamen, & à summo ossis ilij ramus deciditur, qui abdomen exiliens primis femoris musculis & tibiæ sexto sensum motumq; afferunt. at ramus alius mittitur ad sextum musculus femoris & ad tibiæ primum, superatâque parte superiore ossis ilij ad femoris cutem. ab hoc eodem secundo pari exoritur nervus tenuissimus, & oblongus, qui vasa seminaria comitatur, & tandem in testiculum desinit. quem neruulum nonnulli *νευρας ἰσχειας* appellant, qui mirè decipiuntur: neque enim neruulus hic quem nunc describimus, neque vasa seminaria cremasteres dixeris, sed fibras illas carneas in darto collocatas: illæ fibræ carneæ, carneæ inquam illæ fibræ darti, cremasteres

De secundo pari nervorum lumborum.

Error nonnullorum.

Quid sit cremasteres.

steres verè sunt, nō vasa seminaria aut neruulus in testem immissus. Exit tertia neruorum lumborum coniugatio inter secundam tertiāque vertebram, sub peritoneo defertur, necnon sub quinto femoris musculo. Primus ramus qui ab hoc coniugio deceditur, trāsīt sub os pubis prope ilium os, atque hīc bifurcatur (cur enim voce in scholis nostris trita non vtamur?) atque eius pars altera per superiora fertur cute tenui in genu ipsum desinens, altera comitatur venam sapphenam nuncupatam, reliquam portionem huius nerui post dorsales musculos cutēmq; reflecti videbis. Quarta coniugatio è tertia quartāq; vertebra emergit (est autem lumbalium neruorum maxima) fertur sub quinto musculo femoris, & sub pubis os, comitērq; comitatur venam atq; arteriam in ipsum inguen: quo loco neruulos profert qui tum peni, tum scroto deseruiant, sed cutanei sunt, neque profundiora petunt. in hac eadem inguinis regione in septem postmodum ramos secatur, qui ad omnes anteriores musculos distribuuntur, qui partim tibiæ, partim femori famulantur. Ex his ramis nonnullos ad genu vsque descendere obseruatote. Quinti paris egressus est inter vertebrae quartam ac quintam, deinde in duas partes instar aliorum diuiditur. iter maioris nerui est sub peritoneo versus anteriora trāsīens per foramen situm inter os coxendicis pubis, atq; ilij, atque hinc neruuli deciduntur ob nonum decimūque mu-

*De tertia pari
neruorum lum-
borum.*

*De quarto pari
neruorum lum-
borum.*

*De quinto pari
neruorum lum-
borum.*

sculum femoris, quod in gyrum mouet. nec nō alios ad septimum & octauum femoris eiusdē, & alios ad penis musculos, item ramos alios ad vesicam mittit, & in mulieribus non modò ad vesicam, sed ad vterum quoque: cui præter sextum par neruorum cerebri, ab hac etiam quinta lumborum coniugatione neruuli obtrigere atq; hætenus de prima parte. Secunda verò reflectitur post musculos dorsales, & ad cutim, quod à quarto quoque coniugio fieri dicebamus. Atque hîc sunt quàm breuissimè descripta quinque paria neruorum lumbalium, à quibus prius quàm discedo adnota illa posteaquam exiliere, primum par cum secundo connecti, secundum cum tertio, tertium quarto, quarto quintum eodem prorsus pacto: quæ implicatio similis est brachij neruorum implicationi. Notandum insuper est licet hæc quinque neruorum coniugationes descripserimus, non inueniri tamen in omnibus hominibus totidem: cùm quandoque quatuor duntaxat inueniantur: proptereà cùm quartum & quintum par in nōnullis vniantur, ex hisce duobus vnum duntaxat par resultat, & efficitur.

De Neruis ossis sacri, & Pedis.

C A P. V I I I.

ORTUS.

C V M hi nerui particulatim & accuratè describi consueuerint, nos eundem ordinem sequentes, de his distinctè quantum in nobis erit agere conabimur: qui nerui, pedis etiam
nerui

Quomodo hæc paria neruorum lumborum connectantur.

Lumborum nerui non sunt semper quinque paria.

nerui nō iniuria dici possunt. Sciendum itaque hosce exilire inter vltimas lumborum vertebrae & ossis sacri summitatem : item à primo , secundo , tertioque ipsius ossis sacri foramine. at quum primū hāc quatuor neruorum principia exiire , vniuntur , maximum nostri corporis neruum constituentes , qui sub peritoneo ab interna abdominis parte ad externam repit versus clunes , transitque inter coxendicem & coccygem supra quartum musculum illum , à quo femur circumagitur . vbi exiit prope maiorem trochantira nonnullos mittit neruulos ad tres musculos à coxendice exortos tibiam flectentes , alios quoque ad octauum liuidum dictum musculum , qui & ipse oritur à maiori trochantere , deinde rectā pergit per posteriora femoris inter quartum , quintūque tibiæ musculum , penē ad flexuram ipsam genu : quo loco in duos insignes ramos diuiditur , ex quibus alter maior , alter minor cernitur . maior posteriorem , minor anteriorem tibiæ partem occupat : maior rursus sub flexura genu neruulos mittit ad primos musculos extremi pedis . A minori autem trunco neruulum exortum conspicies , qui in musculum sub poplite latitantem inseritur , & alium in tertium musculum ab exteriori femoris capite exortum . Sed postquā maior truncus flexuram genu præterit , in alios neruos subdiuiditur , quorum ramus vnus tendit sub duobus primis musculis

Nervus nostri corporis maximus.

Musculus liuidus.

pedis, quorum parte carnea prætergressa sub cutem repit, in qua per posteriora tibiæ properat ad extremū vsque pedem. ab altero ramo emanant surculi ad quartū muscolum, qui inter posteriores tibiæ musculos maior existit, deinde per posteriora interioraque tibiæ delatus iter habet sub interno malleolo, tendēs sub pedis plantam, nervos ad cutim emittens, primò ad primum, secundum, & tertium pedis extremum musculū, deinde ad omnes illos musculos paruos in ipsa planta delitescētes. deinde diuiditur adhuc in nervos decē, ex quibus duo per vnumquemque digitum ad eius extremum vsque deferuntur, ramusculos interim ad cutim illorum spargentes. Alter verò ramus profundiora penetrat, & permeat inter tibiā fibulamque, ligamēto illi adhærens, quod inter tibiā ac fibulam situm esse proprio tractatu audistis (quo ligamēto posteriores muscoli ab anterioribus diuiduntur) mittit quoque nervulos ad quintū, sextum septimūque pedis muscolum. Alter truncus minor sub fibulæ appendice præterlabitur, ad anteriorem partem delatus, quo loco nervulos profert, qui musculis tum à tibia, tum à fibula exortis dedicantur: truncus verò deorsum descendit per ipsius fibulæ anteriora. Quāobrem hic maximoperè animaduertas velim lector candidissime, hoc enim scitu est tam necessarium quàm quod maximè, si cauterium fieri oporteat, vt ne ad fibulā accedat, sed ad tibiā dunda-

*Vsus ligamenti
inter tibiā &
fibulam.*

*Cauterium in
crure ubi faci-*

duntaxat, neque hoc sat est scire quo loco sit faciendum sed addito dum fit causticum, primū *dum, & quantum profundū.* musculum prætereat cautio est : nam si magis penetraret hic nervus quàm nuper diximus læderetur, quo læso grauia symptomata consequi solent. vel saltem cauterij locus nunquam pene dolore aliquo destituitur. Reliqua portio nerui huius dorsum fertur sub ligamento, partēque pedis anteriore transit sub externo malleolo per extremi pedis superiora : & ex hac sede furculi mādantur decimo octauo pedis musculo. quod superest in decem neruulos separatur, qui in extremos digitos inferuntur, & desinunt. ab hoc eodem trunco neruulus alius cutaneus proficiscitur, qui ad extremum pedem vsque progreditur : Post tria foramina ossis sacri, sequitur quartum, & quintum in quibusdam, quæ diuersitas à vario ossium sacrum constituentium originem ducit: neque enim in omnibus idem est, nam in aliquibus quinque ossibus constat os sacrum, in aliis sex, licet nunquam inuenire possis os sacrum ex tribus tantum ossibus constructū, vt Galenus falsò existimauit si hominem descripsit, sed simiam non hominem descripsit. In cadauere igitur cuius sacrum os quinque ossibus constet quatuor aderunt foramina. quod senario numero constet quinque foramina videbis, quæ sita sunt inter os & os, vt abundè suo loco dictum à nobis est. Igitur ex duobus foraminibus subsequētibz egrediuntur duo alia ner-

Os sacrum non constat in omnibus totidem ossibus.

uorum coniugia, quæ post egressum ipsa quoque vniuntur neruum gignentia, qui reflectitur & ad musculos natiui distribuitur, necnon ad cutem illarum: in internam quoque abdominis partem mittit neruulos ad musculos recti intestini, & in nonnullis non modò ad hos, sed ad vesicæ quoque musculos, immò in nonnullis foeminis ad vterum quoque atque ad vteri ceruicem, item ad earum vesicæ musculos. alij quoque surculi ad perineum atque ad scrotum deferuntur. E posteriore verò parte ossis sacri per ea foramina neruuli profiliunt parui admodum breuesque, qui ad musculos dorsales ad nates ad posterioremque cutem delegantur. Et quoniam Galenus aliique Anatomici de neruo quodam loquuntur, quem inconiugatum vocant, secundum ipsorum sententiam, si vera est, in extrema spinalis medullæ parte deprehenderetur. Ego vt ingenuè fateor, hunc celebrem neruum inconiugatum hoc loci nūquam comperire potui, licet accuratè secauerim huius vnus gratia sæpe numero, sed in omnibus quos hactenus secui penè innumerabiles, comperi extremam spinalem medullam in surculos complures dextros ac sinistros distribui, qui deinde per quartū femoris musculū disperguntur, & per cutem quæ inter nates & ad anum vsque procedit. De illis autem neruorum coniugationibus sub coccige prætereuntibus, quas Galenus somniauit, nihil attinet dicere, propterea quod nusquam in homine

Nervi posterioris partis ossis sacri.

Neruus inconiugatus secundum Galenum ubi esset.

Neruus inconiugatus non datur.

Galeni error.

Coniugationes neruorum sub coccige in brutis non in hominibus.

mine reperiri possunt, cum nō adsint. sed priusquam à neruorum historia discedamus illud adnotes rogo, in quouis humani corporis musculo quamuis minimo suum neruum adesse, quod minimum est. nam in aliquibus neruos duos, in aliis tres, quatuor, ac nonnunquam quinque videre poteris, neque iniuria. Si enim neruis carent, musculi neutiquam essent, quamuis oppositum Vesalio nostro videatur. cuius opinio in hoc imaginaria potius quàm vera existit, fortè is alioqui indefessus in neruorum distributione, quæ mihi admirabilis esse videtur, cum secando defessus esset, scriptum reliquit musculos aliquos absque neruis reperiri. Quoniam verò nos in nostra historia de fabrica Humani Corporis cerebrum ipsum neruorum originem diximus, vt reuera existit, cor autè arteriarum originem, & venarum iecur, non defuturi existimo qui huic nostræ opinioni aduersentur probâtes neruos arterias venâsque spermaticas seminariâsque nostri corporis partes neque à cerebro, neque à corde, neque à iecore exoriri posse, sed à semine duntaxat. Sed nos, qui solidam Anatomien profitemur, sensûq; vegeti vti in humanorum corporum dissectione conamur, has futiles & apparentes ratiunculas cū rei veritate nequaquam consentientes, & medico futuro inutiles, tanquam nullius pretij, bona lectorum venia reijcimus.

In omni musculo adsunt nervi unus vel plures

Vesalij error.

Vesalius excussatur.

Negligenda sunt quædam argumenta, & argutiola me dico viro.

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber Nonus.

DE GLANDVLIS.

*Substantia glā-
dosa qualis.*

GLANDVLA nihil aliud
est (vt ad eius descriptio-
nem immediatè deuenia-
mus) quàm corpus rotun-
dum, oblongumq; quod
plurimum est rarum, &
poris refertum. diuersis in
locis varias ob causas po-

*Vsus glandula-
rum multiplex.*

fitæ fuere adenes, siue glandulæ. est enim earum
multiplex vsus, alię venis, & arteriis instar lectu-
li sternuntur, vt illas detineant, néve lædantur.

*In natura non
datur vacuum.*

aliæ vt sedes vacuas repleant : non enim datur
in natura vacuum: aliæ vt humiditates suscipiāt,
& contineant: ne ob motum loca exiccarentur:
aliæ vt excrementa suscipiant. atque id genus
glandulas, siue adenes in variis corporis nostri
partibus reperias. Primæ in caluaria hoc pacto,

*Primæ in cal-
uaria.*

vna in cerebro, hoc est inter cerebrum, cerebel-
lúmque, quam conarion pineale appellant, de
qua in tractatu de cerebro verba fecimus: hæc
sphærica est, oblonga tamen : alia in sella sphen-
oïdis

noïdis extra crassam membrana iacet, in quam peluis, siue infundibulū desinit. Quid autem sit sella cunealis, dictum à nobis est in lib. de Offibus. & hæc illa est glandula cerebri excrementa suscipiens, quæ postmodū ad nasum, palatūmq; transmittit. In oculi verò orbita quatuor adsunt glādulæ, duæ scilicet singulæ orbitæ, dextræ sinistræque, duæ inquam suprà, infrà reliquæ. quo loco posite sunt à natura, vt humiditatem superuacua ad oculos tendentem susciperent, illòsque humectarent, atque irrigarent, ne eorū motu adeò frequenti nimis exiccarentur; itaque moueri deinceps desinerent. hæ illæ sunt, quæ mœrore, aliâue causa cōstrictæ lachrimas excutunt, atque effundunt. Binas alias glandulas habet pharynx paristhmias dictas cerebri humiditatem suscipientes, partēsque illas humectantes, qua humectatione maximè indigent, cūm continenter laborēt nobis nunc loquentibus, nunc edentibus, aut inspirantibus, aut expirantibus. Alias insuper sub radice linguæ comperies, quæ in nobis paruulæ sunt, quarum eadem est cum prædictis vtilitas. duæ aliæ hærent laryngi, asperæq; arteriæ, quæ scēminis sunt, quàm viris crassiores: hinc laryngis pars prominentior in paucis mulieribus conspicua est: nam ab harū glandularum crassitie occupatur, & sub ea latitat. sub iugulis item, vbi vena caua in axillarem, & iugularem secatur, aliæ adsunt, in nobis tenues, crassæ verò in brutis, quæ lactes dicuntur, & thy-

Glādula in sella sphenoidis suscipiens excrementa cerebri.

Glandula circa oculos usus duplex.

Lachryma unde fluant.

Paristhmie in pharynge cur posite sint.

Glandule sub lingua.

Cur larynx videatur prominere magis in viris quàm in famellis.

Thymus siue lactes sub iugulis.

mus. Rursus in thoracis cauitate duæ aliæ conspicuntur medio œsophago adnixæ, vt ab eo continenter œsophagus humectaretur. ita enim cibis facilius pertransit, delabiturque : at in abdominis concauo, non duæ sed propemodum innumerabiles reperiuntur per mesenterium dispersæ, ob diuisionem tum venarum, tum articularum. inter quas insignis quædam est sub ventriculo, tum ob venæ portæ diuisionem, tum vt ventriculi propugnaculum foret, ne is spinâ cõttingens læderetur. his nomen est *παγκρέας*, hoc est affusio. Ad radicem penis, vesicæque extremum, hoc est ad vesicæ collum binæ adsunt glândulæ crassiusculæ, quæ *παράσάται*, hoc est, assidentes vocantur. hæc semen suscipiunt, & continēt:

Glandula circa œsophagum cur. Cur tot glandula per mesenterium.

Affusionis & pancreas maior portio inter ventriculum & spinam.

Parastates & assidentes.

Testes mulierum & marium inter adenes possunt connumerari.

Cur sint post aures glandulae.

Parotides unde fiant.

si quisquæ est, cui testes tum marium, tum foeminarum inter glandulas connumerare libeat: huic per me adnumeret licet: nam substantia testium à glandularum substantia parum differt. Nunc, posteaquam internarum glandularum historiam expediuimus, operæpretium videtur de externis quoque meminisse: de quæ illis primum, quæ post aures sitæ sunt. Sciendum itaque est penes aures, necnon sub maxilla inferiore multas adesse glândulas, quæ tum venarum, tum articularum diuisioni, tum quibusdam cerebri superfuitatibus suscipiendis deseruiūt: propterea emunctoria cerebri appellantur. hæc sunt satis insignes, & crassæ satis: in quibus frequenter fit illud genus abscessus, quod à loco *παρωτίδας*

Græci

Græci vocant. Præterea sub axilla non paucæ
 adfunt easdem ob causas genitæ, quas suprà me-
 morauimus: qui locus cordis emūctorium ap-
 pellatur. In inguine etiam inter abdomen scili-
 cet, & femur multas glandulas obseruare pote-
 ris iisdem rationibus, atque vsibus fabrefactas:
 & hanc regionem iecoris emunctorium vocāt.
 Nec defunt glādulæ in flexura tum cubiti, tum
 genu, sed paruæ, ob vasorum diuisionem factæ:
 atque has glandulas in omnibus passim compe-
 rires: sed in quibusdam præter has in collo, bra-
 chiis, cruribúsq. Sed quoniam hoc rarò eue-
 nit, harum historiam prætermittendam duxi.
 Penis autem extremitas licet glandis nomē ob-
 tineat: tamen glādulæ substantiam nequaquam
 obrinuit. Sed mammillarū substantia tota glan-
 dulosa est, ac pinguis, præter papillam, quas
 glandulas natura cādidas esse voluit, vt sangui-
 nem rubrum in album lac vertere facillimè pos-
 sent. etenim in humano corpore quodcunque
 transmutatur, in colorem transmutantis trans-
 mutatur. Positæ autem sunt mammæ glandu-
 losæ, vt diximus, in anteriore thoracis parte tum
 ob venustatem, cuius ratio habenda erat, tum
 vt lac commodiùs infanti præberetur: & inter
 cutem, membranámque carneæ positæ sunt.
 Atque hæc hætenus de glandulis humani cor-
 poris.

*Emunctorium
cordis.*

*Iecoris emūcto-
rium.*

*Glans penis mi-
nimè connume-
randa inter glā-
dulas.*

*Substantia mā-
millarū qualis.
Omne quod trās-
mutatur in cor-
pore, in colorem
transmutantis
mutatur.*

*Cur mammillæ
in thorace.*

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber Decimus.

DE OCVLIS.

Oculi nobilissimi.

Oculi organa visionis.



Cur in loco excelsio sint sit.

Situm.

Quae & quot sint oculorum propugnacula.

CVLI in homine magnæ sunt, atque adeò ingentis nobilitatis, cū insignis, & dilectæ ab omnibus visuæ virtutis organa existant, maximo propterea artificio à Dei optimi maximi maiestate,

ac sapientia creati sunt, & in sede satis rita fiti, eaque nostri corporis eminentiore, vt instar boni custodis essent, & tanquam speculatores, quos videmus dum ciuitates arque oppida custodiunt, altiora loca ascendere, vt longius prospiciant. Penes cerebrum verò locatos fuisse oculos quid mirum? cum à cerebro ortū ducant. Animaduertendum itaq; est naturam binas cavitates in capite, maxillâq; superiore exculpfisse, vt tuto in loco collocarentur, multisque illas propugnaculis circumscripsisse: suprâ namq; os frontis, superciliâq; collocavit, infrâ os primum superioris maxillæ, nec non os malæ, hinc nares, &

res, & iugale os, præterea palpebras cartilagineas, musculos ipsas constringentes, ciliæque ut ipsa visui dirigendo deseruirent. oculorum forma in homine verè sphærica est, idque diligenter obseruato, nihil enim in homine, cum ab oculo discefferis, verè sphæricum est. At aliorum animalium oculi non sunt vndique orbiculares, sed vel obliqui, vel depressi: neque id mirum est, cum hominis figura tanto interuallo à reliquis distet animantibus. Scito præterea neminem ante me hominis oculum descripsisse, sed omnes beluinum oculum descripsere, magno & turpi errore, in quem ipse quoque Vesalius incidit, in eius vniuersa pene formatione cum aliis Anatomicis deceptus. quod verum esse facile perspicias, si Galeni, Vesalij, aliorumque Anatomicorum historiam de oculo cum nostra contuleris. & profectò non leuiter hi homines accusandi sunt, Galenus præsertim, & post ipsum Vesalius, qui tantam rem, tam illustrem, tam optatam, tam negligenter scribendam putarent, beluinum oculum pro humano disseccantes. quo loco oculi siti fuerint & cuius vsus gratia, visionis scilicet, nemo est qui ambigat: quomodo autem visio fiat, non est facile explicatu, & adhuc sub iudice lis est: aliis nanque videtur visionem fieri per emissionem, alij verò per immissionem existimarunt: quod argumentum nunc non est disputandi locus. Illud ad præsentem tractationem scire sat est, oculos videndi causa

*Cilia visum dirigit.
Oculus hominis verè sphæricus.*

Alij Anatomici brutorum oculos describere.

Galenus & Vesalius in oculi fabrica decepti.

Quomodo fiat visio difficilis est questio.

*Oculis capti
sunt infelices.*

Videndi facultas unde.

*Nervi optici
qualis sit substantia.*

Inuolucrum.

Origo.

Progressus.

Insertio.

*Oculi constituunt
membranam retinam.*

*Ex quibus constet
humanus oculus.*

De musculis oculorum.

*Quatuor primi
musculi.*

Exortus.

Fibrae.

*Membrana retinosa
quatuor musculorum
insertio.*

*Usus uniuscuiusque
ex quatuor.*

*Usus quatuor
musculorum simul
operantiū.*

factos, quæ res ita est homini necessaria, ut qui illa vel natura, vel casu, vel ægritudine orbi sunt, se infelices appellitent. Videndi autem facultas à cerebro proficiscitur, à visuiis spiritibus per opticos nervos ad ipsos delata, quos nervos crassos esse, molles, porosos rarâque textura esse diximus, necnon à membranarum dura, tum tenui inuolucro, qui ab interiore cerebro ad basim exoriuntur, & sphænoïdes os per sua ipsorum foramina orbicularia penetrantes, in internam oculorum cavitatem desinunt, ibique membranam ἀμφιβλυστροειδῆ nuncupatam constituunt.

Oculi itaque ex multis partibus constant. Ex quinque musculis nimirum, membranarum sex, tribus humoribus, ex nervis, venis, arterijs, glandulis multâque pinguedine circumquaque. Ex musculis oculo deferuentibus, quos in nostro tractatu de musculis quinque esse diximus, quatuor ita dispositi sunt, ut in quatuor angulos distribui videantur, suprâ, infrâque à dextris & à sinistris, quorum exortus à sphænoïde, durâque matre oblongi sunt, fibrisque rectis constant, & substantiam ipsorum in finibus explicantes, tendineam membranam constituunt, quæ in corneam post iridem desinit, quorum unusquisque cum seorsum & absque reliquorum ope suum officium facit, oculum trahunt, vel sursum, vel deorsum, vel dextrorsum, vel lævorsum: at si eodem tempore in agendo coeant, tunc oculum sistunt: cum verò non vnâ agunt tempore eodem

dem, sed successiue ab iisdem, quos diximus musculis quatuor, oculus in gyrū vertitur, quā motuum dispari tēpore diuersitatem in illis quoq; quatuor musculis obseruabis, qui brachiali mouendo addicti sunt. Itaq; ab iisdē motoribus diuerso modo se habētibus varios edi motus nullo pacto absurdū esse videri debet. Quintus verò oculi musculus, quem ego primus inueni, oculi dimidiū & amplius amplectitur, transfuerso situ, qui tamē nullo pacto despiciendus erat, cū nobilissimæ actionis gratia sit à diuina providentia cōstitutus. nam, vt inquit Poëta ille,

*Pronaque cum spectent animalia cætera terram,
Os homini sublime dedit, cælumque videre
Iussit, & erectos ad sydera tollere vultus:*

At huius musculi beneficio cælum ac beatas cœlorū mentes intueamur, opificémq; vniuersi purē sancteq; veneremur: cuius nutu machina tanti operis cœpta perfectaq; est, cuiusq; bonitate mouetur, seruatúrq;: neq; solū attolli oculus ab hoc quinto musculo potest, sed etiā sisti, & in gyrum verti, & in sua sede immotus contineri, ne huc atq; illuc temere flectatur. Illud præterea meminisse oportet, secundū neruorum coniugiū in hos musculos distribui, quos inter, & oculum neruūmq; opticū magna pinguedinis portio collocaretur, ne assiduo & perpetuo ferē motu ocul⁹ exiccaretur, atq; tabesceret. Ad sunt etiā binę glādulæ, quarū altera suprà est, infra altera, per quas lacrimas misericordia ducti

Vsus quatuor musculorū successiue agētū. Comparat quatuor primos oculorum musculos quo ad usum cū quatuor musculis brachialibus Idem motor diuerso modo se habens potest motus diuersos edere. Quintum musculū oculi Realdus primus inuenit.

Vsus quinti musculi oculorum.

Secundum par neruorum in oculorum musculos inferitur. Pinguedinis usus in oculi fabrica. Glādularum in oculi fabrica situs.

*Lachrima unde
exprimantur.*

*Glandularum
oculo seruiensium
usus.*

*De membranis
oculorum.*

*Prima oculi mē-
brana nomina.*

*Cōiunctiua mē-
brana descri-
ptio.*

*Iris in oculo
quid sit.*

*Aristotelis er-
ror de Iride ocu-
li.*

*Vuea non est in
omnibus conco-
lor.*

*Iridis oculi ethi-
mologia.*

*Pupilla quid sit
Pupilla non est
atra.*

*De secūda mē-
brana oculi.*

*Secunda mem-
brana incognita
aliis anatomi-
cis.*

*Origo & infer-
tio.*

*De membrana
tertia.*

Ortus.

*κερατοειδής
constituit for-
mam oculi.*

effundimus, vel callidæ mulierculæ oculos ex-
terendo exprimūt, vt ab amatoribus aurum ex-
rorqueant. hæ glādulæ vt oculum ipsā quoque
irrorent factæ fuere. Ex sex oculi mēbranis pri-
ma exterior est, pluribus nominibus insignita:
nam adnata, alba, adhærens, & cōiunctiua ap-
pellatur. hæc tenuis est & candida à pericranio
ortum ducens, & in maiorem iridis circulū de-
finat: est autem iris in oculo circulus ille variis
coloribus refertus. quæ colorum varietas (quic-
quid hac de re Aristoteli videatur) vueæ mem-
branæ, non humoribus (vt ille voluit) accepta
ferenda est: quæ vuea non est in omnibus ho-
minibus cōcolor. nam in hoc nigrior est, in illo
magis albicat, in alio cærulea, aut varia cerni-
tur. Iridis verò nomen in oculo, à cœlestis iri-
dis similitudine translatum fuit. at quod in o-
culi centro vides instar puncti pernigrum, pu-
pilla nuncupatur, cuius ope videmus. licet au-
tem pupilla nigra admodum appareat tamē ne-
que ipsa, neque quicquam, quod eidem subsit,
attrum est, sed pellucens atque perspicuum. Se-
cunda oculi membrana nomine caret: neq; id
mirum est, cum hætenus incognita fuerit. hæc
à nerueis musculorum oculi tenuitatibus gigni-
tur, & sub adnata terminatur prope iridē. mē-
brana tertia κερατοειδής, id est cornea, duraque
dicitur. dura etenim crassaq; existit, cum à du-
ra matre exoriatur. ab hac membrana ceratoide
forma oculi constituitur. vnāque est sui exortus
ratione.

ratione. Arabes autem Anatomici vnica fidelia duos parietes dealbantes partē anteriorem corneam, quod instar cornu pelluceat, posteriorem sclirorica à duritie appellarunt, sed vna duntaxat est, non duæ: & à dura membrana vt dicebam proficiscitur. Ceratois anteriore in parte *suapzns* est, perspicua, & instar cornu lucens, & subtilis, quo loco iris necnon pupilla sita est, hæc oculum sistit, neruum opticum inuestit, & oculum: intus concaua est. & in ea tres humores, trësque aliæ mēbranz continentur. Quarta oculi mēbrana vuea dicitur: dicitur & chorion, hoc est secundina & choriformis: à tenui meninge ortum ducit, primúmque; neruum opticum inuestit, deinde sub cornea dilatatur & ad anteriora vsque porrigitur, verùm oculum vniuersum non ambit quemadmodû corneam facere diximus. postea verò quàm ad pupillæ locum peruenit, quam vuea format, atque effingit, versus posteriorem partem reflectitur, & ad iridis principium progreditur, ibiq; duplex efficitur atq; à cornea toto illo interuallo, quod diaphanum est, abscedit, licet in aliis partibus non parum illi connectatur. Vueæ nomen sortita est, eò quòd vuæ granum videatur esse, cui capulus ademptus fuerit. in hac, vt dicebā, magna colorū varietas spectatur. in hominis nāq; vuea nigrum colorem cernes, puniceum, ceruleum, rubrum: at in boue, præter hos viridem & cianeum. Ex qua colorum varietate defessi

Arabum error in cornea.

*Cornea unica est
Cornea qualis sit.*

Corneæ mēbranz utilitates.

In cornea quid contineatur.

*De quarta mēbrana oculi.
Nomina.*

*Origo.
Progressus.
Insertio.
Quarta mēbrana nō ambit totum oculum.*

Vbi quarta mēbrana sit duplex.

Cur vuea dicitur quarta mēbrana.

Colores in vuea varij in homine

In boue colores vueæ plures quàm in homine.

Cc

Vfus varietatis colorū in vvea. oculi recreantur : propterea oculos claudimus, vt spiritus visuī ad hosce multiplices colores conuersi recreentur . Quinta oculi membrana amphiblistroides , hoc est retina dicta , ex ipsa met visorij nerui substantia elicitur, sed si propriè magis loqui volumus, retina hæc non est membrana, sed res mollis , & alba , quam si colligas, atque vnà positam spectes, cerebri substantiam iudicabis . hæc intrò magis quàm vvea iacet, & paulò vlteriùs progreditur ad oculū dimidium. Penes vitreum humorem natura vveam collocauit , vt alimentum ad ipsū deferret . Sexta mēbrana ἀράχνης Græcè, Latinè arāea dicitur. nam aranei telam præ se ferre videtur. Oritur & ipsa à tenui meninge : tenuissima splendensque est, illis pelliculis simillima quæ in ceparum interuallis cernitur. vsus eius est vt humores vitreum, & cristallinum complecteretur. Vesalius alioqui magnus Anatomicus in hac araneiformi membrana describēda perplexus est, & nullo pacto perspicuus. nam & ipsam temerè diuidit, deinde ignorare videtur ab hac vitreum humorem circundari . In eadem membrana ipse quoque Galenus dormitauit : nam ab ea partem illam separauit , quæ ante cristallinum sita est, quam idolum , & simulacrū visionis appellat . Ego verò vnicam esse assero, licet ea parte, quæ ante cristallinum locatur , paulò crassior sit, quàm in reliquis partibus . Atque hæ solæ sunt veræ oculi membranæ. quare ne expectetis

Cur desessis oculis, claudamus. De quinta membrana oculi.

Retina origo et substantia qualis.

Situs.

Situs retina ratio redditur.

De sexta membrana oculi.

Nominis ethimo.

Orrus.

Substantia.

Quibus comparata sit aranea.

Vfus aranea.

Vesalius in aranea membrana obscurus.

Galeni error in aranea membrana.

Idolum visionis Galeno quid.

Membrana aranea unica est.

Membrana inter ciliarum de

tis dum ego de illa loquar membrana instar ci- qua Vesalius nō
est quid distin-
ctum à mēbra-
nis descripris
hactenus.
 liorum, quam Vesalius somniauit. nam lineæ
 illæ, quæ humorem cristallinum circumsunt, in
 hac quam paulò antè descripsimus aranea col-
 locantur. Humores in oculo tres sunt, aqueus, De humoribus
oculi.
 cristallinus & vitreus. Aqueum, qui & albugi- Aquei humoris
situs.
 neus quoque dicitur, natura anteriore in parte
 locauit inter membranam vueam, vbi duplex
 & inuersa redditur, corneamque: qui humor
 paucus admodum est, & in eo suffusiones fiunt,
 quas cataractas recentiores appellat. Hoc quod
 dicam obsecro lector ne excidat, me certa con-
 iectura deprehēdisse humorem hunc instar ex- Humor aqueus
est excrementū.
 crementi esse: nam ego bis hisce oculis vidi to-
 rum prorsus effusum esse ob vulnera, tamē spa-
 tio temporis renatum, ita vt eodem oculo cer- Humor aqueus
potest renasci.
 nere deinceps potuerit. Secundus humor oculi
 cristalloïdes cristallinusve nūcupatur, eo quod
 ita splendeat, vt lumine, & perspicuitate cri- Cur secundus hu-
mor oculi dica-
tur cristallinus.
 stallum referat: situs quoque eius est anteriora Situs cristalloi-
dis.
 versus, penè in centro oculi, eumque humor vi-
 treus posteriore in parte amplexatur, neque vlla
 inter ipsos membrana interiacer, antè tamen
 ab aranea obtegitur. Figura cristallini humoris Cristallini figu-
ra.
 sphærica quidem est, sed depressa anteriùs: quæ
 humorem aqueum respicit, lentis formam re-
 fert. Huius substantia duriuscula est, quam si Substantia cri-
stallini qualis.
 è sua sede dimoueris, & ad scriptos caracteres
 accedat, maiores esse videntur, & faciliùs con-
 spiciuntur, suspicorque hinc specillorum inuen- Specillorum in-

*uētio unde ini-
tium sumpserit.
Cristallini hu-
moris usus.*

*De tertio humo-
re oculi nominis
ethimologia.*

*Situs humoris
vitrei.
Cur vitreus hu-
mor sit cōcauus*

*Aranea mem-
brana inuoluit
humorē cristal-
linū & vitreū.
Retina alit hu-
morē vitreum,
humor vitreus
alit crystallinū.*

*Epilogus partiū
oculi, oculūque*

tionem originem duxisse. vsus cristallini humo-
ris permaximus est, atque extollendus, nam
præcipuum est, ac penè princeps videndi in-
strumentum, propterea idōlum simulachrumq;
visionis non iniuria appellatur. Hanc partem
libentissimè contemplantur auditores in thea-
tro, nam oculos atque animum delectat, pul-
chra res est scitūque digna. Tertium hialoīda,
hoc est, vitreum vocāt Anatomici, eò quòd vi-
trū fufum specie præ se ferat, posteriore in par-
te collocatur: neq; ibi solū sed anterioris quo-
que non exiguam portionem, ita vt ex quatuor
oculi partibus tres occupet hialoīdes. partem
autem cū dico concauam intelligo. hic hu-
mor concauus in medio factus est, quoniam si-
bi cristallino cedēdum erat, ipse quoque splen-
didissimus est, spectatūque iucundus. hunc vnā
cum cristallino inuoluit aranea membrana, pe-
nes quem retina iacet, à qua vitreus humor ali-
tur, at vitreus vicissim alit cristallinum, itaque
nil mirum est si vitreus humor pellucet, cū a-
limentum immediatum futurum sit cristallini
prælucentis, & in nutritione gignitur humor
ille, qui aqueus appellatur. Hi sunt tres humo-
res in oculo visioni opitulantes: nam horū ope,
nisi quid obster, medio proportionato existente,
visibilique in interuallo decenter locato fa-
cilè, & rectè cernimus.

Præter musculos quinque oculo deseruien-
tes, præter sex membranas, tres humores, glan-
dulas

dulas binas, neruum opticum, secundum ner-
uorum coniugium, pinguedinēque, venę ad-
sunt, & arteriæ per musculos pinguedinēque
disperiæ, necnon per membranas, in quas mul-
tæ ipsarum distribuuntur, item per corneam at-
que vucam.

Et hæc est vera germanaque fabricæ huma-
ni oculi explicatio. quam si cum re ipsa contu-
leris, tu quoque huic historiæ subscribes, quam
ego purè scripsi absq; verborum circuituionibus,
& sine fucō. Errorēque Vesalij in historia de
oculo nullo negotio deprehendes: quem mi-
rum est in mēbri adeò nobilis descriptione tan-
topere lapsū esse: nam non modò in muscu-
lis & membranis, sed in humoribus quoque
decipitur, & tota errat via, existimans
cristallinum humorem in centro
oculi exquisitè sitū esse: item
tantum humoris aquei,
quantum vitrei
reperi.

deseruiantur.

Peroratio.

*Vesalius errat
in oculi historia*

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber Vndecimus.

DE VISCERIBVS.

De Vnea, Tonfillisque, necnon de Tunica vestiente
 te nasum, palatum, os œsophagum, ventriculum,
 intestina & asperam arteriam.

CAPVT I.

*Cur hic non agit
 de iecore, corde,
 & cerebro.*



*Cor, cerebrum,
 iecur instar tri-
 um fontium.*

*Cur vena geni-
 ra.*

Cur totum vna

VANQVAM Iecur, &
 Cor, & Cerebrum visce-
 ra sunt, deq; his in tracta-
 tu de Visceribus agendū
 videtur: tamē de his hoc
 loco non agā, quia de his
 separatim egi, quod sint
 instar trium fontium, à

quibus varij proficiscūtur riuuli, qui vniuersam
 hominis fabricam irrigant: absque his ceu lapi-
 deam, atque inutilem futuram. Propterea, vt
 alimentum per singulas corporis partes fluere-
 venæ genitæ sunt, quæ naturalem sanguinem
 in hepate, tanquā in proprio fonte elaboratum
 deferrent, qui ad superiora non secus atque ad
 inferiora labitur. Quamobrem natura vnā cum
 sanguine

sanguine lorij partem deferri voluit, tum vt vehiculū sanguinis lorium foret, tum vt ne sanguis alicubi sisteret, & instar gelu rigeret at eius ope sanguis à magnis venis ad mediocres, atque ab his ad minimas vsque properat. Item à corde vitalis sanguis vnà cum calore ad omnes corporis partes per arterias communicatur. Eodem pacto cerebrum per neruos, spinalémque medullam sensum, motumque ad vniuersum corpus transmittit: etenim absque neruorum distributione, neque sentire, neque moueri vilo pacto posses. Dimisso igitur cerebro à superioribus inchoantes consentaneum est, vt de illa tunica dicamus, quæ os ambit, linguámque, laryngam, & œsophagum: de gargareone, & paristhmii: ne quicquam intactum prætermittamus. deinde loquemur de thorace, postremò de abdomine. Sciendum itaque est tunicam illam, à qua nares intus, palatum, linguáq; circūdatur, me iudice: duræ matris portionem esse quæ postquā caluariam exteriorē præcipuè egressa est, amplificatur, crassior, & pene carnea redditur: à qua cū vniuersum palatū internè, & os ipsum inuoluitur, ad palati extremitatē duplex euadit, elongatâque aliquantulum partem gignit rotundam, oblongam, crassiusculam, pendulam, varijs nominibus insignitam: etenim vua dicitur, vuula, columella, gargareon. Vsus eius est, vt humiditatem à cerebro præcipitantem detineret: idq; non temere, sed vt detēta partes illas, quarum

cum sanguine deferatur.

Arteriarum utilitas.

Neruorum usus

Proponit agēda.

De tunica nares, palatum & linguā circumdante.

Substantia & origo. & deductus.

Substantia vuæ

Nomina vuæ varia.

Vsus vuæ primus.

Secundus.

motus penè perpetuus est, humectaret. Voci etiam, & pronuntiationi non parum confert: ut illorum exemplo eleganter, facileque discere possumus, qui sæuo gallico morbo diu laborarunt, quibus cùm dira morbi lues columellam

*Raucedo ob
morbum galli-
ci exesa vna.
Tertius.*

exedit, rauci admodum sunt: & crocitare potius, quàm humano more loqui videntur. Tertia est insuper gargareonis utilitas, ne scilicet pulvis, qui iam nobis inuitis quãdoq; os ingres-

*Paristhmia, ubi
sint, quid sint.*

surus erat, ad asperam arteriam præceps progresseretur. Vtrinque duæ adsunt glandulæ, quarum altera à dextris est gargareonis, à sinistris altera: paristhmia dicuntur, tonsillæ, amygdalæ, faucis-que: earum substantia glandulosa est. factæ

*Vsus paristhmi-
arum.*

hæ quoque fuerunt, ut cerebri humiditatem suscipiendo essent, idque propterea quòd regionem hanc, quæ Græci φαρυγγά, latini fauces appellat, humectando essent. his autem finibus continetur pharynx. Basis capitis, palatique, necnon corpora anteriora vertebrarum colli: quo loco cõ-

Pharynx.

*Complura orga-
na.*

plura organa cernes laryngã nimirum, os hyoides, eiusque musculos, linguæ radicem, eiusque musculos, sextum neruorũ par, iugulares venas internas, carotides arterias, columellã, maxillam inferiorem, eiusque musculorũ portionẽ, styloïdis processus, & œsophagũ. propterea cũ glandulæ, quas dixi, tam angusto in loco versentur, paristhmia veteres appellauere. Teguntur autem ab eadem membrana, à qua os, & palatum inuolui diximus: quæ descendens œsophago

occurrit:

*Cur dicta sint
paristhmia.*

*Inuolucrum pa-
risthm.*

occurrit: eiúsque interiorem tunicam cōstituit: item ventriculi, & intestinorum tunicam internam, & deorsum magis lata post linguam epiglottida ambit, laryngémque, & asperam arteriam, ad extremos vsq; illius ramos per pulmones delatos. Extrema autem tracheæ regio vestitur à succingente membrana. hac igitur parte satis accuratè perpenſa, reliquum est, vt de pulmone verba faciamus.

*Pleura inuestit
extremam tra-
cheam.*

De pulmone. C A P. II.

PULMO in thorace ipſo ſitus eſt, cuius cauitatis maiorem partem occupat, corporibus vertebrarum, cordi, aſperæque arteriæ adnexus. Diuiſus eſt pulmo in duas partes dextram nempe, & ſiniſtram, propterea nonnulli ſunt, qui binos eſſe aiunt pulmones. Eius figura extrà ſphærica eſt, intrò verò caua: itaque factum oportuit, quòd ſibi tum cordi, tum pericardio cedendum erat. Præter eam, quam diximus pulmonis diuiſionem, in quatuor lobos, pinnaſue, aut fibras, (nihil enim nunc intereſt, qua ex his voce appelles) pulmo diuiditur, vt agiliùs moueri poſſit, & cor ipſum faciliùs amplexari. Scribit Galenus pulmonem quinque lobis præditum eſſe, ex quibus tres in dextro latere eſſe autumat. quod verum eſſe in brutis quidem animantibus comperies: at in homine nequaquam. Cauſa diuerſitatis illa eſſe poteſt, quòd hepar à corde plurimum diſtat. quamobrem cum vena caua à vertebris diſtet, ſtrato opus erat, quo fulciretur.

Situs.

Annexus.

Diuiſio.

Figura.

*Cur pulmones
intro cani.
Cur pulmo diuiſus
datur in lobos.*

Galeni error.

*Cur plures lobis
ſint in brutis
quàm in homi-
ne.*

*Hominis pulmo-
nis lobi sunt qua-
ruor duntaxat.*

*Cur pulmonis lo-
bus sit cœcauus.*

*Galenus non se-
cunt homines.*

*Pulmonis sub-
stantia qualis.*

Inuolucrum.

*Vasa in pulmo-
nibus.*

*Arterie asperæ
descriptio.*

Vfus.

*Arteria vena-
lis.*

Natura igitur prudens lobo vno voluit homi-
nis pulmonem à brutis superari, quem lobum
venæ cauæ in illis substrauit. Concauus autem
est, vt Galenus optimè dixit, quia cedit venæ
cauæ rotunditati: at quoniam in hominibus in-
ter cor, & hepar septum transuersum duntaxat
interiacet, quinto lobo nihil opus fuit. Quare
nihil erat, quamobrem Galenus ob hoc tanto-
pere in veteres Anatomicos inueheretur. Ve-
rùm ex hoc, vt ex aliis compluribus locis, apertè
conuincitur Galenum nunquam in homine a-
natomen exercuisse. Pulmonis substantia rara
est, leuis, porosâque spongiæ instar, colore ru-
bello, quod genus substantiæ *παρίχημα*, hoc
est, affusio à veteribus appellatur. Inuoluitur à
membrana pleura, quam describemus, tenui sa-
tis, atque admodum porosa. Per substantiam pul-
monis hæc disseminantur, arteria aspera, arte-
ria venalis, venâque arterialis. Aspera quidem
arteria per colli longitudinem anteriore in par-
te sub larynga fertur, quæ ex anulis constat, at
non perfectis omnino, vt suo loco diximus, ex
cartilagine quæ in dextrum, ac sinistrum diui-
ditur: deinde pedetentim magis, magisque di-
uiditur, atque attenuatur ad pulmonis extremũ
vsque. Vfus eius est, vt aërem intrò, forâsque fe-
rat: atque hæc è supernis in inferiora procedit.
ex infernis autem penè sursum fertur venalis ar-
teria, quæ ipsa quoque in dextram, sinistram-
que partem diuisa est: deinde variis modis ra-
mificatur,

mificatur, ad asperæ ramos accedens, idémque facit vena arterialis. hæc verò tria vasa à substantia rara, porosa, leuèque amplectuntur, itaque pulmo gignitur: cuius vsus est, vt rectè Anatomici scribunt, ob cordis refrigerationem: quod efficit, aërem ad illud frigidum deferens. factus prætereà fuit pulmo ad inspirationem, atq; expirationem, & vt voci deferuiat. Atque hos omnes pulmonis vsus nouerunt, qui ante me scripsere. præter quos ego alium addo maximi momenti, de quo ne per transfennam quidem meminere. Est autem præparatio, & penè generatio vitalium spirituum, qui postmodum in corde magis perficiuntur. Aërem namque per nares, & os inspiratum suscipit: nam asperæ arteriæ vehiculo per vniuersum pulmonem fertur, pulmo verò aërem illum vnà cum eo sanguine miscet, qui à dextro cordis ventriculo profectus per arterialem venam deducitur. Vena enim hæc arterialis præterquam quòd sanguinem pro sui alimento defert: adeò ampla est, vt alius vsus gratia deferre possit. Sanguis huiusmodi ob aspiduum pulmonum motum agitatur, tenuis redditur, & vnà cum aëre miscetur, qui & ipse in hac collisione, refractionéque præparatur: vt simul mixti sanguis & aër, per arteriæ venalis ramos suscipiantur: tandémque per ipsius truncum ad sinistrum cordis ventriculum deferantur: deferuntur verò, tam bellè mixti, atque attenuati, vt cordi exiguus præterea labor supersit: post

Vena arterialis.

Vsus pulmonis.

Novus vsus pulmonum generatio scilicet animalium spirituum.

Quomodo generentur spiritus animales.

Ex vena arteriali amplius vsus inuestigatur.

*Vitales spiritus
in corde perfecti
per aortam arte-
riam ad omnes
partes corporis
feruntur.*

*Corroboratur o-
pinio quod spi-
ritus vitales in
pulmonibus gi-
gnantur.*

*Arterialis vena
vssus reperitur.*

*Quomodo iudi-
cent medici san-
guinem ferri e
pulmone.*

quam exiguam elaborationem, quasi extrema imposita manu vitalibus hisce spiritibus, reliquum est, ut illos ope arteriæ aortæ per omnes corporis partes distribuat. Non vereor quin novus hic pulmonum usus, quem nemo Anatomicorum hactenus somniauit, incredulis, atq; Aristotelicis paradoxon videri debeat, quos oro, rogoque, ut pulmonis magnitudinem contemplantur, quæ absque vitali sanguine permanere non poterat: cum nulla sit tam minima corporis particula, quæ illo destituatur. Quod si vitalis hic sanguis in pulmonibus non gignitur: à qua parte transmitti poterat, præterquam ab aorta arteria? at ab aorta arteria ramus nullus, neque magnus, neque paruulus ad pulmones mittitur. Nam quo pacto per venam, aut per arteriam venalem deferri sanguis vitalis ad pulmonem potest, cum neutra pulset? hæc igitur candide lector, quam dixi, arterialis vena constructa fuit, ut sanguinem eo, quo diximus, pacto elaboratum intrò afferret ad cor ipsum: non ut à corde eliciat & extra ferat. Ad hæc, quæ diximus, illa etiam accedit ratio, Medicos tunc è pulmonibus manentem sanguinem coniectare, atque adeò certò scire, longo rerum usu edoctos, non modo quod cum tussi eliciatur, sed etiam quia floridus est, tenuis, & pulcher, ut de sanguine arteriarum quoque dicere consueverunt. Quas rationes qui sincero animo considerare voluerit, acquiescet, sat scio, veritatique locum dari patietur. At Galenus

lenus magnus philosophus , medicorúmque princeps, cum ab Hippocrate discessimus: hunc pulmonis vsum ignorasse verisimile non videtur. Esto, magnus est philosophus, maximúsque

Galeno & Hippocrati licet ob veritatem con- dicere.

medicus: neque hæc, aliáque multa hominem latuisse admirabile est. Verùm, est quoddam hominum genus adeò vecors, & rude, vt neque inuenire ipsi noui quicquam velint, aut possint: propterea quidquid magni nominis medicus scripsit, illi statim subscibunt, neque ab eius dogmatibus, vel tantillum discedunt. Tu verò candide lector doctorum hominum studiose, veritatis autem studiosissime, experire, obsecro, in brutis animantibus, quæ viua vt feces, moneo, atque hortor: experire inquam, an id, quod dixi, cum re ipsa consentiat: nam in illis arteriam venalem illiusmodi sanguinis plenam inuenies, non aëre plenam, aut fumis, vt vocant, si Deo placet, capinosis, illi duntaxat pulsus deest. Nam hic à corde proficiscitur: quemadmodum per optimè maximus Gal. probat eo libello. An sanguis in arteriis contineatur contra Erasistratum. Pulmonis tunicam parui neruuli attingunt, vt diximus, qui intrò nō penetrant: propterea pulmo exiguo sensu præditus est: tamen membrum est maximè vtile, atque adeò necessarium. sed hæc pulmonis tunica, cū porosa sit, nihil mirum est, si in Pleuritide & peripneumonia sanguinem suscipere valeat.

Pessimum hominum genus.

Arteria venalis sanguine plena est nō aëre.

Neruli pulmonis tunicam attingunt non penetrant.

Cur pulmo parum sentiat.

Cur pulmonis tunica.

De Pleura, & Mediastino.

CAP. III.

Quid in thorace contineatur.

IN thoracis cauitate præter cor, pericardion, arteriam aortam dictam, cauam venam, venamque tum arteriosam, tum sine pari, præter arteriam venosam, venas, arteriasque axillares, item eas, à quibus aluntur costarum interualla, præter illas, quæ sub sternò discurrunt, ac præter illas iuxta mediastinum deorsum tendentes, præter neruos, œsophagum, arteriam asperam, pulmones, glandulasque, membranæ quoque adfunt, pleura scilicet succingens appellata, mediastinumque. Est autem pleura membrana similis, tenuis, nerueaque, quicquid in thoracis concauo continetur complexa. hæc vertebrarum corpori admodum hæret, & sub costis labitur: septum transuersum supernè inuestit.

Pleura quid sit.

Vfus & deductus.

Pleura non est simplex.

Vesalii error. Galenus non erat reprehendendus.

Pleura est duplex ubique.

Vene arterie et nerui feruntur inter pleuram internam & externam.

Membrana hæc pleura nequaquam simplex est, licet Vesalius simplicem esse, scriptum reliquerit, qui in hoc Galenum iniuria accusat, cum ipse, vt parum diligens, non accusari non possit. quòd si adeò diligens in hac re fuisset, vt in aliis plerisque, comperisset pleuram duplicatam esse. Cum duplicem hanc succingentem membranam dico, ne existimes me dextram illam tantum, & sinistram appellare, sed vbique duplicem esse pleuram aio, duas scilicet esse membranas, quarum altera interna est, externa altera, inter quas venæ, arteriæ, neruique præterlabuntur: quæ omnia inter costarum interualla

ualla ducuntur. atque hîc sæpe fit pleuritis. Si
 causam quæris, quare duplicem hanc membra-
 nam natura genuerit, ob ossium duritiem opi-
 nor, ne interna pleura, quæ adeò sentit, vt ni-
 hil suprâ, ob pulmonis continentem morum læ-
 deretur. Hæc membrana, vel potius hæ mem-
 branæ, iuxta latera sterni deorsum repit, spinam
 versus, atque inter se dextra à sinistra distat: il-
 læque spinæ affiguntur, vt thoracem in duas ca-
 uitates, pulmonemque duas in partes secarent:
 neque id temerè factum putes, sed mira naturæ
 diligentia, vt læsa altera parte, ita vt fit, illæsa
 saltem altera, immunisque relinqueretur. hæc
 verò pleuræ reduplicatio, vt ita dicam, hoc loco
 mediastinum appellatur: quoniâ thoracem me-
 diat, & à summo thorace ad imum ducitur. In-
 ter mediastinum, id est hanc duplicem pleuram
 thoracem in duo secantem, materia aliqua col-
 ligi potest, quæ perforato sternò tutò satis extra-
 hi potest à diligenti Chyrurgo, reique Anato-
 micæ peritissimo. Præter has membranas costæ
 perioftio quoque præditæ sunt. in superiore tho-
 racis parte subiugalis, vbi tum venæ, tum ar-
 teriæ, diuiduntur, glandosam partem adesse
 conspicias, quam *θυμὸν* vocant. Estque *θυμὸς* in
 vitulis, & id genus animalibus esu suavis. Ad
 medium œsophagum binæ adsunt paruulæ
 glandulæ, illius humectandi gratia à natura eo
 loco collocatæ. Quid autem sit œsophagus
 mox audies.

*Vbi sæpe fiat pleuritis.
 - Cur pleura sit duplex.*

*Interna pleura est sensus exquisitissimi.
 Progressus pleurae.*

Dextra pleura à sinistra distat.

Cur pleura ope thoracis in duas partes diuidatur.

De mediastino quid sit.

In mediastino materia colligi potest & extrahi.

Costæ habent perioftion.

θυμὸς glandula ubi.

Thymus in vitulis esu suavis.

Vfus glandularum ad medium œsophagum.

De œsophago, & ventriculo.

CAP. IIII.

Œsophagi nomina.

Quod sit in vniuersum origo & situs.

*Œsophagi descriptio.
Iter œsophagi.*

Cur ad leuam reflectatur œsophagus.

Terminus œsophagi.

*Tunica œsophagi.
Fibræ tunice interioris quales, & cur.*

Tunica externa œsophagi quales & eorum usus.

Œsophagus est continuus ventriculo.

OESOPHAGVS, stomachus, gula, vel meri, vt Arabes vocant, est via potus, cibique. origo eius est in ima pharyngis cauitate, post laryngem, cui adnectitur, neque illi solum, sed etiam anteriori corpori vertebrarum colli. Est œsophagus membranea pars, nerueaque & exanguis, cuius terminus est superius ventriculi orificium. Iter œsophagi est inter vertebrarum corpora, arteriamque asperam, rectâ, quousque cordi accedit, nam ibi, vt cordi cederet, vt par erat, dextrorsum tendit: deinde prope transversum septum ad leuam denuò reuertitur, neque enim illi per iecur progredi recto itinere licebat. ob iecur itaque, quod obstat cogitur œsophagus supra spinam, sub vena quidem concaua, at supra ἀορτήν arteriam descendētem præterire, septumque transversum penetrat, perforatque & in superius ventriculi orificium, vt dixi, implatur. Duabus propriis tunicis præditus est œsophagus, externa, internaque. Est autem interna crassior multò, quàm externa. Interiori fibræ sunt rectæ, quæ manuum vice funguntur in cibi attractione, quem ab ore susceptum ad ventriculum deferant: propterea à summo ad imum feruntur. externa verò gulæ tunica transversis fibris prædita est, vt cibus potusque faciliùs deorsum trudatur. Est autem œsophagus non modò ventriculo contiguus, sed continuus: quemadmodum

admodum ventriculus intestinis, quæ ad podicem definunt. Ventriculus, qui & venter dicitur à Latinis, à Græcis γαστήρ, & κοιλία, situs est in abdomine immediatè sub transuerso sepro, ad eò descendit, vt penè ad vmbilicum perueniat. propterea à medio penè corpore inter vtrumque hypochondrium transuersim collocatur: maior tamen eius pars sinistrum præcordium occupat, licet Galenus secus sentiat: idque sapienter factum est, quoniam ob iecoris magnitudinem, lienisque paruitatem, spatium maius in sinistro latere, quàm in dextro relinquebatur. Eius figura cucurbitæ oblongæ, rotundæque eleganter respondet. Sphæricus etenim est ventriculus, licet oblongus. hac autem figura membra tum magis capacia sunt, tum ad perpetiendum minus idonea. Duobus orificiis insignitur, dextro, sinistroque, seu maius superiore, atque inferiore. sinistro potum, cibumque suscipit: dextro verò iter præbet cibo, quem ipse cōfecerat, & in chylum conuerterat. Bina hæc, quæ nunc describimus, ventriculi orificia, ne cibus vel incoctus elaberetur, vel retrocederet, crassiora facta sunt, fibrisque orbicularibus, à quibus rectè detinetur. natura verò iubente dilatantur, permittuntque cibos tum ingredi, tum egredi. Illud interim adnotes velim, inferius orificium ventriculi in decliuiori regione situm neutiquam esse, quemadmodum aliqui pinxerunt: sed superiora versus spectat, neque glandulam illud circumple-

Ventriculus est continuus intestinis.
De ventriculo.
Nomina.

Situs.

Maior pars ventriculi occupat præcordium sinistrum.
Galeni error.

Cur maior pars ventriculi sit in sinistro hypochondrio.
Figura ventriculi qualis.

Redditur ratio figura ventriculi.
Ventriculi orificia duo.
Vsus utriusque orificij.

Cur orificia ventriculi sunt crassiora.
Fibræ orificiorum quales & cur.

Error quorundam de situ inferioris orificij.
Situs verus orificij inferioris.

*Galenus error de
gland. inferioris
oris officio.*

*Tunica ventriculi
quot et quales.*

*Vnde oriatur tunica
communis ventriculi.*

*Fibrae primae tunicae
quales & cur.*

*Fibrae secundae
quales & cur.*

*Fibrae tertiae tunicae
ventriculi quales & cur.*

*Galenus & Vesalius
error.*

*Ventriculus praeditus
est quatuor virtutibus
naturalibus.*

*Galenus error.
Quid regat ventriculum.*

Ventriculi usus.

*Cur ventriculus
sit amplius.*

atentē videbis, licet à Galeno describatur. Tri-
bus tunicis, illisq; nerueis praeditus est, quarum
vna aliquantulum carnea est: ex his tunicis duae
propriae ventriculi sunt, alia communis, quae à
peritonæo proficiscitur, estque fibrarum expers.
Primae obliquae fibrae contigere, ut cibum, po-
tūque tam diu contineant, quam diu coqua-
tur. Secunda transuersis fibris constat, ut post-
quam confectus fuit, extrā propellatur. Tertia
fibris caret, ut dixi, & inuolucris duntaxat vice
fungitur. Galenus, & post illum Vesalius rectas
fibras internae ventriculi tunicae inesse credide-
runt, ut attrahendi munere fungeretur. Verūm
oesophagus, quaecunque deuorantur, ad illum
deducit: propterea rectis fibris non eguit. Non
est tamen negandum, quin quatuor illae natu-
rales virtutes, quae reliquis membris adesse con-
sueuerunt, ventriculo quoque adsint, attractrix
scilicet, retentrix, concoctrix, atque expultrix.
Præterea secunda tunica, quam carnosam ali-
quo pacto dicebat, non est tamen in fundo car-
nea magis, quam in superiori parte: quidquid
Galenus scripserit. Tegitur ventriculus à ieco-
re, lienēque: & eiusdem particulam omentum
contegit. Usus eius est cibum, potūque in al-
bam substantiam lacti similem, quam chylum
vocant, immutare. Estque nostri corporis cu-
lina: idcirco amplius, capaxque rerum multa-
rum effectus est, praesertim in heluonibus, vora-
cibusque hominibus, quorum aliqui consumen-
dis

dis frugibus nati, quorum Deus venter est, tantum cibi vorant, tantū potus ingurgitant, quantum quatuor viris satis, superque esset. Præter orificia, tunicasque hætenus descriptas, nervos habet ventriculus à sexto pari deductos, venas à porta, arterias à magna, vt iam dictum est, arteria: neque id inutiliter. Etenim à nervis sensum, ab arteriis vitalem calorem sortitur, venæ verò tum illi nutrimentum deferunt, tum chylo suscepto illum ad iecur deferunt. Qui verò existimant ventriculum chylo nutriri, decipiuntur. Nulla enim corporis pars præterquam à sanguine alitur: propterea venarum copia exuberat. Quandoque euomit, sed motus ille violentus est, & contra naturam, tunc autem obliquæ, transuersæque fibræ vnà, magnòq; conatu propellunt, & rectè œsophagi opposito motu agūt, quàm natura postulet. Cùm enim natura deorsum pellere oporteret, in eo nixu deorsum trahunt, atque hæc de ventriculo sat sunt.

Nervi ventriculi.

Ventriculus nō nutritur chylo.

Cur ventriculus abundet venis.

De Intestinis. CAP. V.

CV M Intestina sint ventriculo continua, quemadmodum suprà dicebamus, consentaneum est historiæ, quā de humani corporis fabrica scribimus: vt nūc de intestinis loquamur. Intestina igitur à vētriculo exoriuntur, eadēq; penè substantia videntur: licet aliquantulum tenuiore. Situs eorum est ab inferiori ventriculi orificio ad anum vsque, abdominisq; maiorem partē occupant. Veteres Anatomici intestina in

Continuatio.

Intestinorum ortus.

Situs.

Dd ij

Disiſio inteſti-
norum ſecundū
veteres Anato-
micos.
Disiſio propria

ſex partes diſtinxere, diſtinctiſque ſingulas no-
minibus appellauere. Ego verò, ſi poſt tot ſecu-
lorum recepta vocabula noui aliquid in mediū
proferre fas eſſet, inteſtina duo eſſe dicerem,
quorum alterum tenue eſt, craſſum alterum.
Sed vt aliorum veſtigia ſequamur: neque enim
temerè à veterum placitis diſcedendum eſt, ſex
eſſe dicemus inteſtina, duodenum inquam, ie-
iunum, ileon, cœcum, colon, rectūque. Duo-

Duodenum.

Cur duodenum
dicatur.

Nomina varia
duodeni.

Progreſſus inte-
ſtini duodeni.

Ieiuni inteſtini
origo.

Cur ieiunum di-
catur.

Cur ieiunū ſem-
per ſerè vacuū
videatur.

Cur bilis ad iei-
num transmi-
tatur.

denum, vt ab hoc incipiamus, nam ventricu-
lum ſubſequitur, ita appellatur, quoniam longi-
tudinem eius duodecim digitorū apicibus me-
tiri poſſumus: Græcè dicitur *δωδεκαδάκτυλος*, di-
citur & ianitor, portanarius, *πύλωρος, ἐκφυσις*: quæ
nomina nonnulli ad inferius oriſficiū ventri-
culi transferunt. Duodenum poſt ſuum à ven-
triculo exortum, ſpinam verſus deſcendit, quò
poſtquam peruenit, aſſurgit, & gyris initium
dat, ibique terminum habet, vnde eſt origo ie-
iuno inteſtino, quod longum admodum eſt, ſed
duodeno tenuius. Ieiunum dicitur, quoniam in
cadauerum diſſectione vacuum ſemper reperi-
tur. hoc autem contingit, propterea quòd chy-
lus hâc præteriens adhuc fluidus eſt ſatis: dein-
de ob bilis veſiculæ meatum, qui in huius prin-
cipia deſinit. transmittitur autem bilis, ad eū-
locum naturæ prouidentia, vt vis expultrix ad
ſuum munus excremētorum eiiciendorum ex-
citetur. hiſce itaque duabus de cauſis hoc inte-
ſtinum ieiunum antiquiores appellauere. cui
ileon.

ileo succedit ob varias spiras ita nuncupatum: *Ilei firmus.*

etenim satis longum existit. sed illud scias velim ilei principium, nec non ieiuni fines non

ita cuique in Anatome peruios esse: nam eadem

substantia, colore eodem conspiciuntur. Neque ego alia via discrimen horum inuestigo, quam quod venæ mesaraicæ in ieiunio ipso tum maiores, tum frequentiores, quam in ileo spectantur: cuius ilei fines à coli principiis excipiuntur.

Atque hæc tria intestina, quæ hactenus memorauimus, tenuia omnia sunt. Tria verò alia, quæ consequuntur, crassa sunt, cæcum inquam, colon, & rectum.

Cæcum monoculum quoque dicitur, & saccus: vno namque foramine duntaxat donatū est, quod foramen coli ipsius pars esse videtur, cui sua adest appendix longiuscula, tenuisque, ob quam Vesalius cæci nomen huic intestino impositum fuisse arbitratur.

Mihi verò secus videtur, vereres scilicet, cæci intestini nomine intellexisse, quicquid à tenuiorum intestinorum insertionem ad colon usque porrigitur. sed hoc intervallum in bobus, suis, gliris, sciurisque adnotatu dignum est. à cæco igitur in dextro ileo colon exoriri videbis: deinde ad dextrum renem deorsum flectitur, cui adnectitur: deinde conuoluitur, sursum reuertitur, & ad abdomen sub ventriculo transuersum fertur, non supra ventriculū, ut Mundino parum Anatomico visum fuit, qui callide commentus erat, dum excrementa in hoc inte-

Quomodo distinguatur fines intestini ieiunii & principium ilei.

Quæ dicantur intestina tenuia & quæ crassa.

Cæcum quibus nominibus donatum.

Appendix cæci

Vesalii opinio suspecta.

Quid verè intelligendum sit nomine intestini cæci.

Observatio pulcherrima.

Colon intestinum.

Iter coli intest.

Mundini error.

Celi distributio.

stino detinentur, ventriculi coctionem adiuuari. Vbi ad sinistrum latus colon peruenit, versus sinistrum renem descendit, cui item colligatur. Deinde rursus inflectitur, & descendit, & cum ad sinistrum ileon accedit, duos gyros efficit, & in rectum tandem intestinum in summo osse sacro finem habet. Colon hoc, quod diximus, oblongum est satis, crassumque & cellulis hinc, atque illic refertum. quare cum amplum admodum futurum esset, natura illi duo ligamenta parauit instar duarum zonularum, quarum vna superius est, inferius altera. At extremum intestine,

Cur colo duo obtigerint ligamenta.

Longaon & rectum.

quod & longaon etiam appellatur, rectum dicitur ob situm ipsius. etenim à summo osse sacro ad extremum vsque coccygem deferitur: atque in ano terminos habet, à quo constituitur. Sunt autem intestina (si naturam illorum in vniuersum scire cupis, postquam historiam didicisti) corpora oblonga, teretia, & concaua, quarum situs is est, quem supra vnique assignauimus. Eorum substantia neruea est, ventriculi substantiæ non dissimilis. Tunicæ illis binæ existunt, illæ inquam intestinorum propriæ, & peculiare, quibus tertia accedit communis, quam à peritonæo mutuo accipiunt: prior interna obliquis fibris prædita est, ut continendum obire possent: secunda transuersis, ut propellerent. rectas autem fibras aut nullas, aut paucas quidem certè in intestinis conspicaberis. Chylus namque fluidus in eorum inanitatibus,

Intestina quid sint.

Substantia. Tunicæ quor & quibus fibræ prædita, & cur.

Cur in intestinis aut pauca aut nulla sint recta fibræ.

ribus, spatiisq̃ue discurrit, atque pererrat: at fibra transuersa manuum instar comprehendūt.

Varia illis conuolutiones, spiræque contigere naturæ beneficio non vulgari: vt cibus in illis diutius moraretur: neque nostris negotiis, si recta sira essent, impedimento forent. Propterea

Cur intestinorū circumuolutio- nes varie. Causa prima.

obseruare poteritis animantia omnia, quorum intestina paucis gyris abundant, subinde fame- scere, & ad cibum capiendum non modò in- uitari, sed etiam cogi. Secunda vtilitas est ob chyli distributionem. Tertia, vt feces conti- neant. Neque neruis destituuntur intestina à

Cur animalia quedam citò fa- mescant.

sexto pari ad ipsa delatis, neque venulis, quas

Secunda causa. Tertia causa.

vena porta subministrat, quas mesaraicas ap-

Nerui unde in- testinis.

pellant. arterias itidem habet intestina. Quam-

Vena.

obrem ipse quoque sanguine aluntur, vimque

Arteria.

habent coquendi, si quid à ventriculo incoctū

Intestina alun- tur sanguine.

exciderit. propterea natura, quæ nihil frustra

Intestina coquē- di vim habent.

condidit, omento intestina ipsa obtexit. Sed

Cur intestina o- mento tegatur.

priusquam hunc de intestinis sermonem absol-

uamus, rem admirabilem adnotes volo, lector

candidissime, naturam crassa intestina vndique

Crassa sunt val- lum intestinū tenuibus.

in abdomine valli instar collocasse, tenuia verò

in medio crassorum, vt ab externis iniuriis faci-

lius tuta euaderent.

De Mesenterio & Omento,

C A P. VI.

MESENTERIUM, siue mesaræon (qua voce vsus est Cicero lib. secundo de Nat. Deorum, licet perperam mesenterij naturam

Ciceronis error. Mesenterion quid propriè si- gnificet.

D d iiii

intellexerit. non enim medium intestinum significat mesenterium, sed membrum est, quod inter intestina medium collocatur) exortum dicit à spina: neque si introspicias, aliud quicquā est, quā peritonæum ipsum duplex inter hanc igitur peritonæi reduplicationem, quam hoc loco mesenterium appellamus, venæ adsunt, arteriæque mesaraicæ, adsunt & nervi, & glandulæ complures hîc appositæ ob magnam horum vasorum diuisionem, quibus robori sunt, & tutamento. sub ventriculo præsertim harum glandularum non aspernanda copia visitur, non modò ob vasorum diuisionem, sed etiam ne ventriculus spinæ contactu læderetur. hæ glandulæ πεινκρεὸς, siue πεινκρέας, & χυλικρέας, & affusio, & lactes quoque appellantur. Vfus mesenterij est, vt intestina contineat, ne vel temerè implicita eua-derent, vel deorsum delaberentur. Viderur in tres partes diuisum hoc, quod dixi, mesenteriū, quorum pars colon detinet, quod transversum fertur, atque hæc omenti penè portio existit: alia continet intestina tenuia, tertia verò crassa. Sed si cui libeat mesenterium vnum dicere, vel in duas partes secare, ego nihil moror. Omentum Latinis, Græcis ἐπίπλοον, Arabibus Zirbus in anteriori parte omnium intestino- rum, necnon supra lienem quoque situm est, licet secus scripserit magnus Hippocrates, hoc à ventriculi fundo iuxta eius longitudinem ex- ortum, & à colo insuper intestino, in duas scin-

Exortus.

Substantia.

*Venæ & arteriæ
mesaraicæ.*

*Glandularum
vfus in mesente-
rio.*

*Cur multa glon-
dula sub ventri-
culo.*

*Gland. sub ven-
triculo nomina
varia.*

Mesenterij vfus

*Mesenterij diui-
sio in partes tres*

De omento.

Nomina.

Situs.

Hipp. error.

Exortus.

scinditur partes, superiorem nimirum, & inferiorem, quæ uniuntur, & sacculi, vel marsupij potius figuram præ se ferunt. Vt rem in pauca conferam: omentum nihil aliud est, quàm peritonæum, in quod tum venæ, tum arteriæ, tum nerui, tum adeps disperguntur, intestinorū tutamenti gratia factum est, estque non exiguo coctioni conficiendæ adiumento.

De Liene.

CAP. VII.

SPLEN, seu mauis lien, membrum est in sinistro hypochondrio sub costis septo adhærens transuerso, cuius innata figura oblōga est, instar plantæ pedis: suprâ gibba est aliquantulum, at quâ interiorem partem spectat, concauam speciem refert: idque non temerè, sed vt ventriculo cederet. ibi linea adest, in quâ eius vasa inferi videbis, propterea nonnullis eminentiis ibidem prædita est. Color lienis subliuidus est, eius substantia poris, & inanitatibus referta spongiæ in morem, vt humori melancholico crasso, terreoque ad illam transmissio suscipiendo esset. In lienis substantia, quâ dixi, tum venas, tum arterias, illasque perspicuas nullo negotio deprehendere poteris: licet Galenus oppositum senserit in hoc mirè deceptus, ita vt nullus excusationi locus relinquatur. hæ autem venæ, quas in liene conspicaberis, à vena porta deriuantur, cuius sunt rami, arteriæ item ab aorta sub septo transuerso. Circundatur lien à tenui peritonæi membrana, in quam neruulus inseritur à sexta

*Diuisio.**Figura.**Omenti descriptio.**Vfus.**Situs lienis.**Figura.**Cur concauus.**Linea in liene.**Color.**Substantia.**Vfus.**In liene videtur arteria & vena contra Galenū. Vena lienis unde.**Inuolucrum lienis unde.*

Nervus lienis
unde.
Vfus lienis.

neruorum coniugatione deductus. lienis utilitas est, vt melancholicus sanguis ab illa attraheretur, cum præsertim eodem alendus esset In qua nutritione (est autem hoc obseruatu pulcherrimum) acidus quidam humor seiungitur, & per venæ portæ ramum ad ventriculum delatus famem dormientem excitat, quæ utilitas nullo pacto spernenda est.

Succi acidi lienis utilitas.

De Vesicula bilis. CAP. VIII.

Nomina.

Situs.

Figura.

Substantia.

Vena vesicæ bilis unde.

Arteria.

Nervi.

Vfus vesicæ bilis

VARIIS nominibus, vt pleraq; alia nostri corporis referta est hæc bilis vesicula. nam aliqui ita appellant, aliis Græca vox magis arridet, *χύσις* fellis, alij rudiore voce dicunt, bursam cholerae citrinæ. hanc naturæ industria sub iecore parte dextera, eaque concaua collocavit. Figura huius vesiculæ, si quæris, oblōga est: substantia verò membranæ. venas à porta sortita est, arterias verò ab ea mutuatur, quæ ad iecur tendit, nervos demū à sexto pari. Hæc bilē suscipit, continet, atq; expellit, & hic est eius vsus. quæ bilis à vesicula expulsa ad intestina propellitur, vt virtutem eorum irritaret, atque ad feces excernendas excitaret, compelleretque. Propterea natura nunquam satis laudata meatū vnum duntaxat, (seu porum, seu ductum dicas, nihil interest) prudenter effecit, qui bilem flauam ad intestina, & ieiuni summitatem deferat. Equidē ingenuè fateor, me nunquam meatum vidisse, qui ad ventriculi fundum, vel cavitatem à bilis vesicæ feratur: licet non semel, sed sæpius diligenter

Meatus vesicæ bilis ad intestina & summitatem ieiuni.

A bilis vesicæ non deferatur meatum ad fundum

genter intuitus fuerim, non negauerim tamen cum huiusce bilis flauæ magna adest copia, eam ad ventriculum regurgitare cõsueuisse. Sed hoc præter naturam euenit, non secũdum naturam. Si enim hic meatus à cysti fellis ad vētriculi capacitatem daretur, in causa esset, vt is quicquid continebat, dictum, ac factũ propelleret. itaq; nulla prorsus coctio in ventriculo confici posset. Immediatè sub iecore sita fuit hæc vesicula, vt bilem susciperet, quæ per vniuersum corpus delata plurimũ obesse poterat, prodesse nihil: cum præsertim ignea virtute prædita sit. Igitur à iecore ad bilis vesicam meatus perducitur, qui ab eo ad hanc bilem deriuat. scito tamen inter venæ cauæ, portæq; ramos, ramulos complures dari, qui licet per iecinoris substantiam dispergantur, omnes tamen in dictũ meatum desinunt, qui cum bilem suscepit, illam ad propriam vesiculam defert. Est autem bilis, vt omnes norunt, tenue sanguinis excrementum: vt atra bilis crassum eius excrementum existit.

ventriculi, vt fama est.

Cum bilis regurgitat ad ventriculum præter naturam est.

Probaturnõ debere dari hunc meatũ cysti fellis ad ventriculum.

Cur vesica bilis sub iecore sita sit.

Ramuli complures bilem suscipientes & ad eius vesicam deferentes.

Quid sit bilis;

De Renibus. CAP. IX.

RENES duo numero sunt, dexter scilicet, & sinister: quorum vterque, tum dorso, tum nothis costis annectitur. Illud scitu pulcherrimum est, Galenum diu multũq; laborasse causam anxie quærentem, cur renem dextrum natura superiorẽ sinistro collocauerit, ita vt dexter ren altiũs, quàm sinister sit situs. sed profectò nimis accuratè, ne dicam inutiliter,

Renēs duo.

Connexus renēs.

Cur ren dexter sit superior sinistro.

hoc inuestigauit Galenus noster, cùm sensu cō-
trarium prorsus facillimè cuius constare pos-
sit. Est autem intellectus imbecillitas, teste A-
ristotele, sensui ita palàm repugnare, adeò vt
verisimiles Galeni rationes inspecta hominis
Anatome falsæ appareant, statimque corruant.
Tamen si bruta feces, hæc non temerè Galenum
scripsisse comperies: in quibus sinister à dexte-
ro rene superatur: in homine verò oppositum
omnino cernitur. Cur autem in hominibus se-
cus contingat, vt sinister sit dextro superior, po-
tius ob hepar, quàm ob lienem euenit. Etenim
hepar in nobis permagnum est, lien paruus: at
in brutis deorsum vergit. Quare cùm renes ie-
core, lienéq; inferiores admodum existant, cō-
sentaneum est, vt illis optimo iure de habitatio-
ne accommodent. Integūtur renes peritonæo,
eoque crasso satis: non deest tamen præter per-
itonæi velamē propria renibus tunica, ad quam
paruus neruulus, à sexto neruorum coniugio
peruenit. Renum figura fæcoli vulgo dicti spe-
ciem imitatur. spinam versus gibbi, caui quæ
viscera spectant. at substantia eorum dura, den-
saque est, cordi substantiæ similis, color subru-
ber. In renes venæ, & arteriæ emulgentes in-
feruntur, pèrque eorum corpus disperguntur.
Creati fuerunt renes, vt serosum sanguinem at-
traherent, itaq; iecur expurgarent. Tu verò ca-
ue existimes serosum duntaxat sanguinem à re-
nibus trahi. nam cùm hoc vnà boni quoq; san-
guinis

*Est imbecillitas
intellectus repu-
gnare sensui.
Galenus ratio cur
dexter ren sini-
stru superet in
brutis locum ha-
bere potest.*

*In homine ren
sinister est supe-
rior dextro.
Cur sinister ren
superet dextru.*

*Inuolucrum re-
num.*

*Neruulus pro-
pria tunica re-
num vnde.
Renum figura.*

*Substantia.
Color.*

*Vena & arteria
emulgentes.
Vfus.*

*Renes præter
serosum, bonum
sanguinem tra-
hant.*

guinis portio aduehitur, qua ipsi aluntur. In renibus lotium à sanguine segregatur, quod deinde in aliam cavitatem emittitur: quæ cavitæ instar cribri nullo pacto efficta est, vt aliqui falso putarunt, & ab hac cavitæ, quam dicimus, vretes, hoc est, vrinaria vasa nascuntur. Vasa inquam concaua, alba, crassaque, arteriarum instar, neruea admodum, à renibus ad vesicam vsque progredientia. progressus autem huiusmodi est: Sub peritonæo etenim lumbis adherentes discurrunt, & vrinam ad vesicam deferunt. insertio vretum sub vesica est collum versus, in quorum vasorum finibus natura duas membranas affabrè apposuit illis similes, quas in foliis quotidie intuemur. Earum membranarum structuræ vsus est, vt, posteaquàm vrinam ingrediëntem vesica benignè suscepit, hæ membranæ claudantur, ne denuo retrocedens elaberetur, magno mortalium incommodo, magno sanitatis detrimento: cùm lotium post sanguinis distributionem inutile pondus corpori existat. Non desunt, qui harum membranarum ignoratione ausi sint asseuerare, vrinam per resudationem in vesica colligi. at isti, si vesicas, quibus loco pilæ ludunt subinde pueri in triuis, diligenter introspeciant: aërem in illis vesicis reclusum harum quoque membranarum beneficio contineri, obseruare facillè poterunt. neque mirum illis amplius videbitur, si earundem ope vrina suscipitur ab vretibus in vesica, & detri-

Renes aluntur bono sanguine. Opinio falsa de cribro in renib.

Vretum vasorum ortus. Vretum vasorum descriptio. Progressus vretum.

Insertio vretorum. Membrana due in finibus vretum.

Vsus membranarum vretum.

Vrina non colligitur in vesica per resudationem.

*Membrarum
que sunt in ex-
tremitatibus
mesaraicarum
usus.*

netur ne superius reuertatur. Huiusmodi me-
branulas in mesaraicarum quoque extremitati-
bus eadem industria conspicaberis, vt superius
proprio capite explicauimus. Cum emulgenti-
bus dictis venis in corpus renum ingrediendum
esset noluit natura solers, atque in humana fa-
brica sapiens suprâ quàm dici posset, membra-
nas in harum ingressu statim apponere, ne san-
guis nimium præceps flueret, atque elaberetur,
vt sæpe fit, renibus præter naturam affectis: hoc
ne fieret, curauit renum substantiam in collum,
seu monticulorum figuram augeri. hæc enim
sanguini occurrenti obiciuntur, obstantque
quò minus sanguis, serumque ad membranam
deferantur, ex qua fiunt vtereres. Quare cum
exire prohibeatur, prius per ramos tū sanguis,
tum serum per renum ipsarum substantiam di-
stribuitur. At renes, posteaquàm sanguinem
ob sui alimentum ad sese attraxere, ipsoque sa-
turati sunt, serum purum iam redditum, ad
vrinarios meatus transmittunt, qui illum in ve-
sicam postmodum deferunt. hæ igitur partes,
quas prominentiores dixi: in corpore ipso re-
num continentur ea vtilitate, quam paulò antè
breui, quoad eius fieri potuit, expressimus.

*Renibus affe-
ctis sanguisquã
doque præceps
ruit.*

*Renum substã-
tia cur monticu-
lorum figura.*

Renum opus.

De Vesica.

CAP. X.

*Vesica situs &
connexio.*

*Tutamentum
vesicæ.*

VESICA in imo abdomine, quod fumen
appellant, sub osse pubis sita est, cui dili-
genter est connexa. Vesicæ posteriore parte,
tum

tum rectum intestinum, tum sacrum os illi maximo est tutamento, itaque optimè custoditur.

Eius figura rotunda quidem est, sed oblonga,

Figura vesicae.

intus autè concava satis. hæc in ceruicem, me-

Cervix vesicae.

tumq; vrinarium desinit. substantia vesicæ ner-

Substantia vesicae.

uosa existit, crassa satis, tribus fibrarum generibus

Fibrae & earum

donata, vt Galenus optimè adnotauit: rectis in-

usus.

quam, transuersis, atque obliquis, idque vt tum

Tunica.

attraheret, tum contineret, tum expelleret. Tu-

nica vnam peculiarem adepta est, quæ exten-

ditur, contrahiturq; : alteram à peritonæo asciti-

tiæ mutuo sumit, qua integitur. E vesicæ

ὀύραχός.

fundo in fœtibus vas exoritur, quod ούραχός no-

minatur, quoniam huius ductu vrina extrà fer-

tur, dum in matris aluo delitescimus exit autem

vrachos per vmbilicum, vt in tractatu de fœtu,

*Vrachi nullus
usus in lucem
editis.*

latius explicabo : & postquam in lucem proditi

sumus, huic muneri amplius non deseruit, sed

cum vmbilico connexus vesicam sustinet, quæ,

vt antea dicebamus, in collum, & vrinariū me-

rum terminatur. Est autem Vesicæ collum, seu

*Cervicis vesicae
descriptio.*

ceruix eius oblonga pars semidigiti spatium, vt

nunc loquuntur angustaq; & penè carnea, cui

dux adstant glandulae παραστάται, hoc est, assi-

*Glandulae para-
statae.*

per vasa ὑποσπιδίν appellata semen suscipiunt,

*Vsus παρα-
στάτων.*

quod deinde in meatum ad extremum penem

desinentem in coeundi voluptate dimittunt,

*Meatus com-
munis lotio & se-
mini.*

à quo tandem foras pellitur, atque eiacula-

Semen qui exeat

communis est. In eodem collo inter binas dictas glândulas partem quandam eminentiorem, oblongamq; videre est. Quà semen exit nullum est foramen patens, & perspicuū, sed foraminula plura spongiæ instar, neq; ipsa primo intuitu cōspicua: apparent autē cū primū glandulas comprimis. Tunc enim illis expressis semen emergit, quod delitescibat. in eiusdem cervicis finibus musculus adest constringens, ne nobis inuitis, atque aliud agentibus vrina exeat, atque absque interpellatore elabatur. Vesica, vtriusque reliquæ penè omnes partes nostri corporis, venas, atq; arterias nacta est, à quibus alimentum vitæque suscipiat: nervos autem duorum generum tum à sexto nervorum pari, tum à medulla spinali. Vesicæ utilitas, ne vos multis morer, est vrinam, ab vreribus aduectam, primò suscipere: deinde aliquandiu detinere: postremò expellere. Quamobrem nihil mirum est, si fontis imaginem præ se fert. in fœminis matrici adhæret, & parastatis glandulis caret.

De Peritonæo.

CAP. XI.

*πλευρά quæ
ambiat in tho-
race.*

QUEMADMODUM vniuersa thoracis cauitas vnà cum internis membris omnibus, quæ thorax continet, à succingente membrana, quæ *πλευρά* dicitur, optimè circumdatur: ita in abdominis cauitate membra, vasque in eo contenta, à tenui, nerueaque membrana, quâ Græci *πρόσθοναιον* dicunt, siphac Arabes, magna naturæ prouidentia obuoluuntur. idcirco

*πρόσθοναιον
quid ambiat.
Substantia.
Nomina.*

hanc

hanc Græci *περιτόναιον* dixere, quod scilicet vasa, visceraque omnia subiecta prætendat, & circumplectatur. Peritonæi figura subsphærica est: spinæ, quo loco se ipsa crassior existit, bellè admodum, validèque connexa est. est autem prope spinam crassius peritonæum, quoniam inde multas in partes diuidendum erat. itaque iam suprâ memorauimus quo pacto mesenterium, atque omētum parturiat, iecur inuestiat, neque iecur solūm, sed lienem quoque, transversum septum, ventriculum, intestina, renes, vteros, vesicam, atque vterum in fœminis, vt suo loco explicabimus, venas quoque arterias, nervos, glandulas. Peritonæum (cuius historiam nunc præ manibus habemus, quamque breui absoluemus absque verborum lenocinio, vt consueuimus) sub transversos abdominis musculos venit, ibiq; cum eorum tendinibus validè connectitur. Animaduerte autem hoc, quod mox dicam. est enim scitu pulcherrimum, atque à nemine hactenus animaduersum: peritonæum à dimidio abdomine sursum versus Anatomen conspicientibus simplicem esse membranam, dispicientibus autem ab umbilico infrâ membranam hanc duplicari: cuius reduplicationis vsus est, primū ob arterias umbilicales nuncupatas, ob vas, quod *κύρως* dicitur, ob venas, arteriasque sub rectos epigastrii musculos ascendētes (quæ vasa inter hanc peritonæi reduplicationem continentur, quam ego

Figura.

Adnexio.

Cur peritonæum est crassius prope spinam. Peritonæi utilitas attingitur.

Nova observatio de peritonæi simplicitate & reduplicatione. Cur peritonæum reduplicetur.

E c

*Cur peritonæū
intus laue sit,
extra asperum.*

Vesulij error.

primus omnium obseruau) necnon ob vesicam
deinde hæc eadē peritonæi duplicitas, vt ita di-
cam, in causa est, vt intestina validiùs, tutiùsque
contineantur. Peritonæum interna parte leue
est, extrā asperum, neque id iniuria, sed vt dictis
musculis, atque eorum tēdinibus fortiùs adhæ-
resceret. multis quidem in locis perforatū peri-
tonæum cernes: sed tamen tot locis foramina
eius spectabis, quorū illi bonus Vesalius assigna-
uit, vel somniauit potiùs. Atq; hæctenus de peri-
tonæo: nunc reliqua persequamur.

De Abdomine.

CAP. XII.

*Abdomen qui
sit & eius nomi-
na.*

*Quæ in abdo-
mine continen-
tur.*

*Ope memòr. ge-
ner. species æter-
na philosophis.*

*Ex memòris ge-
nerationis quæ
sint communia,
& quæ propria.*

IN abdomine (est autem abdomen regio illa,
quæ inter costas, & os pubis sita est, quòdq;
Græci *ἐντὸς πύλον*, Arabes mirach vocant) præ-
ter membra illa nutritioni deseruientia, iecur
inquam, splenem, ventriculū, intestina, renes,
vesicam, omentum, mesenterium, pancreas,
venas, arterias, necnon peritonæum, adsunt
quoq; membra alia generationi opem ferentia,
quorum ope species æternas fieri autumant na-
turæ arcanorum indagatores. Quāobrem, post-
eaquā ea, qua potuimus, breuitate, & perspi-
cuitate historiam de nutritioni deseruientibus
membris absoluimus, reliquum est, vt de illis,
quæ plantando homini necessaria sunt, nūc ver-
ba faciamus. ex quibus nonnulla vtrique sexui
communia, nonnulla propria sunt: communia
cū dico, vasa seminaria, & testes intelligo,
propria verò in mare penem, in fœmina vterū.

De

De vasis seminariis, testibus, eorūque membranis.

CAP. XIII.

DVPLEX igitur genus est eorum vasorum, *Vasa seminaria duplicia & vasa eorum.* quæ seminaria appellantur, quorum alterum materiam ad testiculos deferret, ex qua semē elaboratur: alterum verò, quod iam elaboratum est in testibus semen, ab ipsis suscipit, & ad penis radicem deferret. propterea hæc vasa deferentia, illa præparantia vno Anatomicorum ore appellantur. *Nomina.* Præparantia quatuor sunt tam in mari, quàm in fœmella, licet in hominibus longiora sunt, in mulieribus breviora. Deferentia verò duo: neque in hoc interest, an de mare, vel fœmina loquaris. totidem namque in utroque cōspiciuntur. *Præparantia vasa sem. quatuor.* Præparantia itaque generationis materiæ vasa sunt venæ duæ seminales dictæ, duæ item arteriæ eadem voce nuncupatæ. *Deferentia vasa seminaria quatuor.* Venæ, ut in tractatu de Venis, fusiùs diximus, in exortu suo variæ sunt. nā dextra à vena caua sub emulgenti pullulat: at sinistra ab ipsamet emulgente deducitur. *Præparantium vasorum deferentia prior.* Anatomici, posteaquàm harum venarum diuersitatem conspicati sunt, sinistra feminalem ab emulgente originem trahere censuerunt: quòd necesse esset falsum humorem ad testes deferri, cuius titillatione se in coitu tantopere aiunt commoueri. *Venæ seminales unde oriuntur.* Ego verò sententiam hanc falsam esse prorsus opinor. nam multos noui, quibus, ut ab hernia intestinali, quæ *ὑπεροχὴ* Græcè dicitur, sani euaderent, testis sinister ablatus fuerat: qui tamen dum

Ee ij

mulieribus coirét, eadem voluptate, qua antea se perfrui solere, mihi de industria diligenter interrogāti, sanctè iurabāt. alia igitur huius diuersitatis causa quærenda est, cū prima nullo pacto satisfaciatur, & dicta instātia allata statim corruat.

*Causa vera cur
vena sem. sinis-
tra oriatur ab
emulgente.*

Ego causam, quam verissimam puto, in mediū adducam, vos eritis iudices. Cū hæ feminales venæ exiles admodum sint, & parvæ: atque in sinistro latere magna arteria prope venā cauam sit sita, quæ arteria magna nunquam non viuus nobis mouetur, periculum ingens, atq; adeò euidentis imminebat, ne hæc tenuis vena in iis perennibus motibus disrumperetur. Natura igitur prudens, vt hoc incommodum euitaret, sinistra feminalem venam ab emulgente, non à venæ cauæ trunco decidi voluit: ne in descensu su-

*Arteriarū se-
minalium ortus*

pra magnam arteriam iaceret. At duæ arteriæ, quas feminales diximus, à magnæ arteriæ trūco sub emulgentibus scaturiunt. Hæc vasa dū descendunt, primò aliquātulum distant, postmodum ita implicantur, vt vena arteriam, arteria venam ingrediatur, fitque præclara illa, & admirabilis, ac aspectu iucundissima, à Græcis ho-

*ἀνασώμωσις
venarum & ar-
teriarum in plu-
ribus partibus
corporis.*

minibus vocata ἀνασώμωσις, quod genus ἀνασώμωσις, si in corporum dissectionibus te accuratū præstabis, in aliis quoque partibus comperies, in brachiis præsertim, & cruribus. propterea quandoque euenit, vt vena vna duntaxat sauciata non modò naturalis sanguis vniuersus, sed

In vulneribus vnà vitalis quoque effluat, ita vt vulneratus intereat.

tereat. horum vasorum plexus vitium capreolis
 conferri non ineptè potest. quì plexus summo
 studio, atque mira effectus est, vt scilicet ma-
 teria illa, atque ille seminis apparatus, qui pri-
 mò ruber erat, sensim alterari, paratèque inci-
 peret, & albefieri. qua elaboratione inchoata,
 non dubium est, quin magna pars laboris testi-
 bus imminuatur, quorum hic vniuersus labor
 futurus erat, ni horum vasorum complexus, hæc
 venarum, atque arteriarum *anastomosis* supperias
 attulisset. Idcirco hæc implicatio deorsum vsq;
 ad testes descendit, proferatèque epididymo
 ad ipsam testium substantiam penetrant. Ab hi-
 sce duobus vasis aliud vas oritur, quod deferens
deferentis va-
rici formis vasis
descriptio.
 iupercodiles, & variciforme nuncupatur, crassum,
 anfractuosumque, supra testem inuertitur: de-
 inde sensim assurgit eodem itinere, quo deor-
 sum deflectebatur, ita vt reuertantur, vnde exie-
 rant præparatia vasa, pèrque idem foramen in-
 greditur, quod in tendinibus musculorum ab-
 dominis descendentium, ascendentium, & obli-
 quorum supra os pubis situm est: quo loco pu-
 bis os cauitatem habet superficiariam, vt cede-
 ret horum vasorum rotunditati. Vbi in abdo-
 minis capacitatem peruenit, deorsum fertur
 prope os pubis, & sub vesica, vbi magis, ac ma-
 gis amplificatur, & iuxta fines suos multum im-
 plicatur, & contorquetur, donec in glandulas
 parastatas tandem implantetur, quæ ad penis
 radicem, & vesicæ fines collocantur. in quibus

cur quandoque
sanguis vniuer-
sus exeat.
Plexus vasorum
seminalium, &
cur.

Anastomosis va-
forum seminalium
quousque pro-
grediatur.
Deferentis va-
rici formis vasis
descriptio.

Foraminis in te-
dinibus muscu-
lorum abdomi-
nis utilitas.

Glandule para-
statae ubi sint si-
tae.

E e iij

Cur tot gyri & glandule.

gyris, & obuolutionibus, plexisque implicitis, & glandulis, tantum seminis continetur, quotres, quatuorue fœtus feri facillè possent, præsertim in fœcundioribus. propterea nihil mi-

Quod Aristoteles tanquam mirandum proponit, non est mirandum.

Vasa gen. in mulieribus abdomine non prætereunt.

Mulieres in uteri cavitatem semen fundunt.

rum nobis videri debet, quod Aristoteles tanquam admirandū proponit, taurum, cui quam testes execti fuerant, genuisse tamen. Atque hæc sunt in homine generationi dicata vasa. nam in mulieribus ipsis neque abdomen prætereunt, neque in parastatas desinunt, neque ad vesicam perueniunt, sed ad matricis duntaxat cavitatem, in quam semen transfundunt.

De Testibus. CAP. XIII.

Testes cur dicti.

Locus testium.

TESTES vocant Latini, quos Græci *ἰσχυροὶ* vocant. *ἰσχυροὶ* autem vocāt, eo quod duo sint. locus testium in homine scrotum est ipsum, quod *σχρόν* dicitur. qui situs ita notus cuique est, ut nulla descriptione indigeat: illis præcipuè, quibus cum magnis, & fœcundis testibus res præclarè, & fœliciter agitur. eorum fi-

Testium figura.

Substantia.

Testium in fœminis situs.

Substantia & figura.

Vsus testium in mare & fœmina.

Testes in mare habent plures testiculos.

gura orbicularis est, at nō exquisitè, sed oblonga ouorum instar. Substantia rara, laxa, alba, mollisque in maribus: sed in fœminis intus in abdomine occluduntur, neque ita crassi sunt, neque adeò rotundi, & molles, quemadmodum in viris. Testes in utroque sexu seminis generationis gratia conditi sunt. nam absq; his neque semen gigni, neque generatio perfici posset: mēbris pluribus in homine obducuntur, de quibus magna lis, magna controuersia, ne dicam confusio.

confusio apud Anatomicos reperitur : cuius in causa fuisse arbitror diffecandi vel imperitiam, vel negligentiam, vel vtrūque, dum alteram ab altera vel parum peritè, vel oscitanter seiungebant. nos autem conabimur dilucidè satis hæc distinguere. Igitur membranarum in testibus alias communes, peculiares alias appellamus. Dum scrotum hominis diffecandum ob oculos habes pro testium Anatome conspicienda, primò occurrit tibi cuticula, deinde cutis, quæ in hac parte est tenuissima, rugosâque, deinde mēbrana carnea, inter quam & cutem nulla adest pinguedo, vt facilius extendi, & contrahi, elongari, & corrugari posset. Propriæ testium membranæ tres numero sunt, quamuis Vesalius duas solū agnoscat : quarum prima (de tribus externis nunc loquor) oritur à neruea tenuitate muscutorum obliquorum descendētium, quam ego ἐπυθροειδὴς appello, fibris carneis intertexta, quæ testis muscolum conficiunt. Secunda δακρυὸς dicitur, quæ nihil aliud est, quàm peritonæi ipsius substantia, candida, vasisque adhærens, & affixa. Ab hisce membranis, quarum partem proprias membranas, partem communes dicimus : & vasa seminaria, & testes inuoluuntur. Tertia, & postrema testis substantiam immediatè integrit, alba colore, structura crassa, quam ego ἐπιδιδυμον appello, ἐπιδιδυμος. quicquid alij sentiant : nam aliqui epididymon vocant plexum illum vasorum, qui supra

Anatomici certant de mēbranis testium.

Administratio testium.

Membrana testis propria tres Vesali error.

Prima membrana testium propria.

Orrus.

ἐπυθροειδὴς: Secunda membrana δακρυὸς.

Tertia mēbrana

ἐπιδιδυμος.

Error nonnullorum.

E e iiii

Testes fœminarum.

Cur fœminarum testes pauciores habeant membranas.

Cur testes in fœminis intrò collocentur.

testiculum cernitur. Testes fœminarum vna duntaxat mēbrana, ἐπίδιδυμος à nobis dicta, circumdatur, & à peritonæo: neq; illis pluribus opus erat membranis, cū in abdito, tutòq; loco, in naturæ inquam penetralibus contineantur. Quo loco ob innatam mulierum frigiditatē positi sunt, at viris extrà prominere voluit; ne assidua coëundi cupiditate torquerentur, quod & vitæ breuitatem inducere, & à negotiis peragendis non abducere non potuisset.

De Pene.

CAP. XV.

Nomina penis.

Nominibus student medici ratione rerum.

Penis figura.

Situs.

Substantia penis in homine qualis.

Cur penis nō sit osseus in homine.

NE existimetis deesse nomen peni: penē enim sunt innumerabilia, cū plura sint in vnaquaq; lingua tritissima, & in dies ioci gratia efformentur parasitis, & otiosis hominibus, ac in venerem pronis, ab amatoribus, à mœchis, à procis, à lenonib⁹, à meretriculis, à lasciuis poëtis, à scurris: nos autem, qui nominibus tantū studemus, quantum nos in rerum ipsarum notionem deducunt, pauca duntaxat enumerabimus. Penis itaq; dicitur, καυλός, mētula, virga, virile membrum. Eius figura nō modò vel eunuchis ipsis, & lippis notissima est, situs item notissimus: substantia verò perpaucis admodum cognita est, quamvis cognitione digna, & non vulgaris existat speculationis. Nam in homine penis substantia neq; ossea est, vt in lupo, cane, & vulpe mare: quæ si ossea in nobis foret, & instar baculi rigidi semper prominere, multis negotiis gerēdis impedimento nō esse nō poterat.

Neque

Neque cartilaginea est, neque ex ligamenti con-
 stat substantia, neque musculosa, neque neruea,
 neque vena, neque arteria, neque membrana:
 licet ex iis, quæ enumerauimus, nonnulla ad penis
 ipsius structuram concurrant. at nulla ex iis se-
 orsum sumpta conficiendo peni accommoda-
 batur. Neque enim id præstare potuissent, cuius
 gratia illum natura parës genuerat: neque enim
 lotij vnus emittendi, sed seminis quoque in v-
 terum sobolis gratia eiaculandi natura penem
 effinxit. Cum igitur natura humani generis sol-
 licita indiuidua quotidie peritura animaduerte-
 ret, miserta est, & vt per speciem, ac propaga-
 tionem immortalis homo euaderet, sedulo cu-
 rauit, hominisque penem ex substantia quadam
 efformauit, quæ & erigi, & flaccescere, & rigida
 fieri & vieta posset. spongiosa itaque merito est,
 rara, porosaque, penè lienis substantiæ similis,
 quam tamen crassis induit ligamenti, quæ vnà
 cum rara, quam diximus, penis substantia ab
 inferiore parte ossis pubis, non à superiore (vt
 malè in hoc Galenus) ortum ducit suum. Hæc
 quæ diximus, ligamenta ex inferiore pubis osse
 exorta sunt, & quidem in ano origine carnea:
 deinde superiora versus tendit, in medio verò
 ossis pubis plus minus dextrum principium cū
 sinistro vnitur, coitque. Deinde deorsum versus
 inflectuntur, & ad glandis fines implantantur,
 quæ glans reliquis penis partibus magis dura
 existit. Dextrum ligamētum cum sinistro iuxta

*Cur non sit car-
 tilagineus.*

*Cur non constet
 substantia liga-
 menti, musculi,
 nervi, vena, ar-
 teria, membra-
 na seorsum.
 Vfus penis.*

*Substantia penis
 cur talis.*

Ortus penis.

Galenus error.

*Ligamentorum
 penis implicatio
 Glans penis qua-
 lis.*

*Cur arteria io-
 pene.*

*Cut arteria in
pene.*

*Quomodo fiat
erectio penis.*

*Virilitas liga-
mentorum.*

*Arteriæ pene
utiles omni-
bus aliis igno-
ra.*

Vesalii error.

*Musculi penis
quatuor.*

*Meatus com-
munis lotio & semi-
ni in pene exqui-
bus confert.*

penis longitudinem vnitur. At penis substan-
tia, quippe quæ rara compage, porisque multis
constabat, erectioni in coeundo necessaria pa-
rum apta futura erat, & vno ligamentorum au-
xilium tantundem ferè opis assequeretur. Natura
prouida arterias duas per hæc, quæ diximus, cor-
pora diffudit, quæ à radice penis ad extremam
vsque glandem rectè feruntur. sed infinitos (vt
ita dicam) ramulos huc illuc dispergi iussit. cum
verò noui hominis gignendi libido incessit, ma-
gnam spirituum vim per arterias illas, quas dixi-
mus, capillarésq; arteriolas diffundit, & ad pe-
nem detrudit, quorū auxilio substantia illa pau-
lò antè rugosa, & flaccescens attollitur, erigitur,
indurescit, riger. fulciunt autem illam, quæ an-
tea diximus ligamenta, quæ crassa sunt duobus
nominibus, tum ob hoc, tum ne spiritus citò ni-
mis euolarent absumpti. Has autem arterias pe-
nis, atque hoc earum munus nemo hætenus,
quod sciam, ante me cognouit, vt in tractatu de
arteriis latiùs diximus, per quas alimētum quo-
que defertur: cum in pene nulla adsit vena, nul-
lus neruus, vt Vesalius in hoc deceptus perpe-
ram existimauit. Præter quæ hætenus memo-
rauimus ad penis fabricam à natura excogitata,
quatuor quoque musculi adsunt: vt in nostro
libello de Musculis latiùs habetis. adest insuper
communis ille meatus, tum semini, tum lotio;
qui sub hisce duobus corporibus positus est, ne-
que aliud est quicquam, si rectè perpèdas, quàm
vesicæ

vesicæ substantia ad penis fines elongata. hæc *Penis tegumēta*
autem omnia integuntur cuticula, cute, carnea *In pene non est*
membrana, nulla præsentē pinguedine, vt in *pinguedo, et car*
scroto dicebamus. quam hîc motus gratia de-
esse opinor: & vt ne in tantam molem penis ipse
excreşceret, qua vterus expauesceret: licet hunc
rerum omnium capacissimum meretrices præ-
dicent. Pars extrema penis præputium dicitur, *Præputium,*
estque pellis illa, qua glans integitur, quæ in coi-
tu ipso nunc sursum, nunc deorsum fertur infi-
nita propemodum mulierum voluptate, & ten-
tine. hæc in Hebræorum circuncisione aufer-
tur: propterea vetus verbum est Iudæus apella. *Cur Iudæus di-*
Quæ res magnam voluptatis partem Hebrais *catur apella,*
mulieribus adimit, dum venus, oscula aman-
tum quinta parte sui nectaris imbuir.

De Vtero, siue de Matrice.

C A P. XVI.

SI VE μήτραν dicas, siue ὑτέρα matricē mue, v- *Vteri nomen*
Sterum, aut vuluam, nihil refert. Situs eius *diuersa.*
est in abdomine inter vesicam, rectūque in- *Situs.*
testinum. en quî superbis homuncio, terra, & *Apostrophe.*
cinis inter excrementa natus. Sed ad Anato- *Vteri tutamēta*
men reuertamur: nimis enim profectò miseri-
sumus, si rem ad viuum consideremus: neq; nos
φιλαυτία cæcos efficiat. Vterus anteriore parte
ab osse pubis, posteriore ab osse sacro, à lateri-
bus, ab ossibus ilium, tanquam firmissimis ac ru- *Vteri connexio,*
tissimis vallis circundatur, ex quibus sacro ossi, *Figura.*
& pubi connectitur. Figura vteri tum rotunda,

tum oblonga est, suprà deprimitur magis, quàm infrà. Illud potissimum pro comperto habeas, vteri muliebris figuram à bouillo, caprino, & ouillo non parum differre, quicquid Galenus in hoc parum Anatomicus in lib. de Fœt. formatione, necnon de Dissectione vteri scriptum reliquerit. Crassam vteri substantiam, carneam, & nerueam quoque natura mixtam esse voluit: vt, dum fœtum continet, facilius extendi, & dilatari posset. Tribus generibus fibrarum intertextis constat matrix, vt Galenus optimè docuit, rectis inquam, obliquis, & transuersis, vt semen pro fœtu effingendo attraheret, contineret, statòque tempore expelleret. Interna vteri cavitates vna duntaxat est, præterea nulla, atque illa parua satis, in qua tamen, licet vna sit, & exigua, iuxta immissi seminis quantitatem non modò fœtus vnus formari potest, sed gemini, tres, vel plures fœtus, vt in multis Europæ vrbibus non semel contigit: qui deinde non cellulis, sed propriis membranis à sese mutuo distinguuntur, quemadmodum tunc apertius explicabo, cùm de fœtu ex professo scribere aggrediar: quam partem nostrorum librorum vobis tam gratam fore certè opinor, quàm quod gratissimum. Interim moneo, ne vllam Mundino fidem adhibeatis, quem parum Anatomicum: vos quoque iudicabitis, si, vt reliqua nunc illius errata missa faciã, quod de vteri Anatome scripsit, cum rei natura conferetis. Inquiens in humano

*Vteri muliebris
figura ab vtero
brutorum differt.*

Galenus error.

*Substantia vteri
qualis.
Cur neruea.*

Vteri fibra.

*Cavitas vteri
unica.*

*Quomodo possint
in vna vteri
cavitate,
plures fœtus
generari.*

*Plures fœtus
distinguntur
membranis non
cellulis.*

*Mundinus parum
anatomicus.*

mano vtero septem cellulas adesse, thalamos etiam, & atria dicere poruisset: tantundem enim esset. Rei veritas hæc est mulieris vterum vnica cavitare præditum esse, quæ intus satis lenis cõspicitur, quamuis nõnulla foramina adsint, quæ nihil aliud sunt quàm venarum, & arteriarum capita, quæ veteres Anatomici acetabula nuncuparunt: quoniam concauæ partes sunt, quibus semen adhæret, tuncque arteriæ arterias, venas venæ gignunt. Cavititas vteri in foramen satis angustum tandem dehiscit, quod os matricis appellatur, quod si extra spectes, tinchæ piscis, vel canini oris nuper in lucem editi, imaginem tuis oculis offeret. hoc autem foramen in matricis collum spectat: per quod foramen vteri semen ingreditur, dum nimia delectatione dilatatur. aperitur autem eo tempore, quo mulier semen emittit. colli, vel ceruicis nomine in vtero non corpus illud, quod suprà descripsimus, sed partem illam intelligimus, in quam mentula, tanquam in vaginam immittitur, cuius longitudo est, quantum vndecim digiti apicibus metiri possumus: rugosa est, & membranosa, non cartilaginea, vt Herophilo placuit: sũntque rugæ illius circulares, vt in coëundo virile membrum amplexaretur, atque exugeret: quibus rugis attritio fit, ex qua miram voluptatem amantes in coëundo percipiunt. In ceruicis vteri finibus vuluam versus nonnullæ carunculae prominent, à quibus voluptas, ac dele-

Fabula est in hâmano vtero adesse septem cellulas.

Cavititas humani vteri unita est & qualis. Foramina in cavitare vteri quid sint. Acetabulorum vteri usus.

Os matricis.

Figura oris matricis.

Os matricis quâdo dilatetur & aperiatur.

Cervix vteri quid.

Longitudo ceruicis vteri.

Rugæ in collo matricis.

Rugarum ceruicis vteriusus. Caruncularum in finibus ceruicis vteri usus.

*Nymphæarum si-
tus & usus.*

*Hymen in virgi-
nibus nonnullis.*

P. Garcia

*Vnde menses flu-
ant.*

f. c.

Uteri tunicæ.

*Vasa seminaria
mulieris in quo
distat à viris.*

Testes.

*Vesalius latas
particulas mem-
branas uteri ap-
pellat musculi.*

Vasa deferentia.

*Cornua uteri ve-
rè cornua in bru-
tis videntur, se-
cus in homine.*

ctatio in coëundo nō parum augetur. sub hisce
vulvæ labellis duæ adfunt à lateribus latæ mem-
branæ, nymphæ à veteribus dictæ, quarum vti-
litas est, vt à puluere, frigore, & aëre vterum
tueantur. sub nymphis in nonnullis virginibus
(non omnibus) alia mēbrana cernitur hymen
à veteribus appellata, quæ cum adest, rarò au-
tem adest, obstat quòminus penis in vterum im-
mittatur. nam crassa est valde, supra vesicam ver-
sus foramine donatur, per quod menses fluunt.
Vterus humanus (hunc enim describimus) e-
iūsque ceruix, præter tunicam sibi propriam,
peculiarémque, à peritonæo inuoluitur, vt su-
prà attigimus. Vasis quoque seminariis prædita
est matrix, quemadmodum in viris diximus.
hoc vno differt, quòd in mulieribus breuiora
sunt. Testibus quoque non destituitur, qui su-
periori in parte nonnihil depressi videntur, a-
pud quos sitæ sunt duæ latæ particulæ membra-
næ, nōnullis carneis fibris donatæ, quas mem-
branas Vesalius musculum vocavit. in harum
summitate à testibus, hoc est præparantibus va-
sis deferentia proficiscuntur, quæ in fœmellis
non minus anfractuosa sunt, quàm in viris ipsis:
& in matris cauum terminantur. hæc suprà, hoc
est, prope eorum corpus, partes binas prominē-
tes instar vituli cornium nuper erumpentium
profert, quæ fortè illa sunt ab antiquis dicta ma-
tricis cornua: veram enim cornuum veruecis
speciem in vaccæ, capræ, canis, ovis, suis, &
id ge-

id genus animalium vtero videbis, nam in his mirè incuruantur, & concaua sunt, & in his fœtus gignuntur. At mulieris vterus longè ab his distat, vt tu quoque, nisi conferre pigeat, facile experiri poteris. sed ad vteri humani historiam reuertamur. Auxilio vasorum seminalium, illiusque membranæ, quam Vesalius pro musculo describit, sacro ossi vterus appenditur: in fine verò vnà cum ceruice ossibus pubis, & coxendici. A matricis lateribus (mirum audies) bini processus constituuntur, quæ duo oblonga ligamenta videntur esse, neruea cauâque, ligamenti etiam munere fungi creduntur: at ad summum os pubis minimè perueniunt, vt Vesalius existimauit, sed per ea foramina transeunt, quæ in neruosis tenuitatibus musculorum obliquo- rum descendendum, ascendendum, & transuerforum sita sunt, quemadmodum in viris, per quæ vasis feminariis aditus patet. etenim fœminis hi tendines perforati cernuntur: quamuis Vesalius id inficietur. Processus igitur hi ab vtero exorti prope id foramen, quod os matricis vocatur, extra abdomen exeunt, supra pubem ascendunt: desinunt autem in particulam quâdam excelsam in vuluæ apice circumuolutam supra id foramē, vnde lotium exit. & hæc lector candidissime illa, illa præcipuè sedes est delectationis mulierum, dum venerem exercent, quam non modò si mentula confricabis, sed vel minimo digito attrectabis, ocyus aura semen hac,

Vteri connexio.

*Processus uteri
bini.
Vfus.*

Vesalij error.

*Iter processuum
uteri.*

Tendines perforati.

*Processuum v-
teri epilogus.*

*Sedes delecta-
tionis in mulie-
ribus.*

*Quo pacto co-
gere poteris mu-
lierem semen e-
mittere.*

atq; illac præ voluptate vel illis inuitis profluet.
 Hanc eandem vteri partem dum Venerem appetunt mulieres, & tanquam æstro percitæ virum appetunt, ad libidinem concitatæ: si attinges, duriusculam & oblongam redditam esse comperies: adeò vt nescio quam virilis mentulæ speciem præ se ferat. Hos igitur processus, atque eorundem vsum cum nemo hætenus animaduernerit, si nomina rebus à me inuentis imponere licet, amor Veneris, vel dulcedo appelletur. Non dici posset quantopere admirer tor præclaros Anatomicos, tam pulchram rem, tanta arte effectam, tantæ utilitatis gratia, ne olfecerint quidem. Vos autem, qui in has meas lucubrationes Anatomicas legendas incideritis, scitote absque processibus, quos ego vobis paulò antea fideliter descripsi, neque mulierem aliquam in Veneris amplexibus delectatione percepturam fuisse, nullos fœtus concepturam. nō enim absque mutua maris, & fœminæ voluptate concipi posse crediderim. sed de his satis. A venis, arteriisque feminalibus, (quemadmodum suo loco diximus) tum venæ, tum arteriæ ad matricis corpus tendentes deciduntur, non vt per has menstruus sanguis expurgetur, vt communis est sententia: sed vt laudabili sanguine tum illa, tum conceptus fœtus ali commodè possit. Non enim hæ sunt venæ, quarum ope menses fluant mulieribus: sed illæ à venæ cauæ diuisione exortæ, quæ in vteri ceruicē ad ipsius latera

Quæ pars in mulieribus venerem petentibus duriuscula appareat.

Pars in muliere specie penis.

Processum vteri vsum nemo ante me aduersit.

Non concipitur fœtus absque mutua voluptate.

Arteria & venæ uteri unde.

Mēstruus sanguis non expurgatur per venas uteri.

Mēses per quas venas fluant.

latetra inferuntur, vt eo loco latiùs habetis. Vtero duo neruorum genera donata sunt, à sexto *Nerui uteri.*
 scilicet pari, & à spinali medulla. Vulua extra *Vulua descriptio.*
 membranosa est, pinguedine referta, non musculo- *Vulua non est musculo-
 sa, non mouetur volu-*
 luntario destituitur. Longitudo, quam supra *Longitudo.*
 ceruicis foramen videtis, à natura partus ergo *Ufus uteri,*
 prudentissimè confecta est: vt pariendi tempore dilatari posset, & infans in lucē faciliùs prodiret. Illud historix de vtero addendum est, ad
 eius ceruicis extremitates vesicæ ceruicem desinere, vbi foraminulum adest immediatè sub
 pubis osse. caue enim existimes, vt idiotæ, & *Vnde exeat lotium in muliere.*
 mulierculæ ipsæ mingentes opinantur, per vteri
 ceruicem lotium exire. In fœminis ad vesicæ *Lotium nō exiit per ceruicem v-*
 collum non adsunt illæ glandulæ parastatæ, ve- *teri.*
 luti in maribus, quòd vesicæ collum in fœmi- *Cur ad vesicæ collum non ad-*
 nis, tum breuius, tum latius est, quàm in ho- *sint glandulæ parastatæ.*
 minibus.

De Vmbilico. CAP. XVI.

VMBILICVS, qui & vetula à quibusdam nominatur ratione rugarū quas præ se fert, in medio corpore situs est, vt rectè sentit Galenus ipse, & ante ipsum Aristoteles: quanquam Vesalius friuolis quibusdam rationibus delusus contrà videatur sentire. Hic iure optimo mediam corporis partem occupat, quòd dum in vtero matris latiramus, per eundē nutrimur, per eundémque excreméta reddimus. Nihil autem est aliud vmbilicus, nisi receptaculum horum

Ff

quatuor vasorum, vnius venæ scilicet vmbilicalis dictæ (quæ à matrice ortum sumens per vmbilicum sursum partem quandam iecoris diuisam ingreditur, terminaturque in venam portæ) & duę arteriæ vmbilicales itidem appellatæ (quæ deorsum per fœtus abdomen tendentes, in duplicatione peritonæi iuxta vesicâ deferuntur, desinuntque in diuisione magnæ arteriæ) præter hæc quartum adest vas οὐραχὸς dictum, quod à fundo vesicę initium sumens, vrinam ex fœtu trahit. ea verò inter ἀμνιον membranam, & ἀλλαντοειδῆ reservatur. Sed hæc vasa infante postmodum in lucem edito eo quo diximus munere priuantur: fiunt tamen instar funiculi cuiusdam, ne penitus inutilia corpori existant.

REALDI

457

REALDI COLVMBI
CREMONENSIS,
DE RE ANATOMICA
Liber Duodecimus.

DE FORMATIONE FOETUS,
AC DE SITV IN-
fantis in utero.



OSTOQVAM de organis generationis tam maris, quàm foeminæ tractatum absolui- mus; necessarium videtur ad foetus humani tractationē deuenire. Qua in re illud primū admonen-

Continuatio.

Viriliter historia de formatione foetus & nobilitas.

us est prudens, piusque lector, hominis generatione, foetus inquam, formatione nihil admirabilius excogitari posse, nihil quod æquè naturæ miraculum videatur esse, nihil quod humanum genus diuinæ prouidentiae, sapientiaeque amore magis inflammer. ea enim arte effectus est, atque efformatus hominis foetus, ut illā admirari magis, quàm laudare, laudare magis, quàm exactè introspicere omnia possis. nam licet omnibus in rebus Dei potentia, cuius maiestati nihil obstat, nihil est difficile, elucere pos-

Ff ij

Difficile est scribere de formatione factus.

Quæstiones aliquot quæ studiose prætermittuntur.

De formatione humani foetus tractandum.

Quæ videtur in formatione factus belluini non sine errore ad hominem transmittuntur.

fit: in hoc tamē mihi illustrior videtur. Hoc igitur argumentum difficile satis nos, quantum in nobis erit, faciliori modo, breuioriꝫ; (ni fallor) tractabimus, quàm hactenus audieritis: idque rationibus euidentibus, & perspicuis, quantum res ipsa ardua patietur, nostrique ingenij vires imbecillæ, & illarum quæstionum, quæ ad rei cognitionem minimè spectare videbuntur, exactam disputationem prudens omittam. quæstiones verò, quas non disputaturus, sed sensus auxilio explicaturus sum, illæ sunt. Vtrum semen viri habeat tantum rationem efficientis, an verò etiam materiæ: & vtrum mulier concurrat ad generationem foetus: & vtrum mulier habeat semen: an in coëundo semen emittat & vtrum fiant omnia membra simul: & vtrum omnia reperiatur distincta in ipso semine: & vtrum cor sit primum, quod generetur, cum sit vltimum, quod moriatur. Et vtrum foetus nutriatur sanguine menstruo: & an detur superfœtatio: & multæ aliæ id genus quæstiones, quas breuitatis causa omitto. De hominis generatione verba facturus, cur non de brutis loquor, cum ab illis dedita opera natura nos distinxerit. Quamobrem non possum illos satis admirari, qui cum de hominis in vtero matris formatione omnia penè ignorarent, & quæ in brutis imperfectè obseruabant, ad hominem maximo errore transfulerant, de brutorum generatione scribere non erubuerint, præsertim de generatione

tione piscium, quos ego in aquis natare, & quò
 lubet vagari permitto. Illud profectò adnotatu
 dignum est, testes in mulieribus genitos esse, vt
 gignerent semen. equidem testari ingenuè pos-
 sum me quâdoque in fœminarum testium dis-
 sectione semen inuenisse album, crassumque,
 quòdque bene concoctum spectatores omnes
 vno ore faterentur: immò verò quale in viris
 ipsis nondum inueni. In coïtu igitur, quo tem-
 pore vir semen eiacularur, idem quoque à mu-
 liere fieri necessarium est: alioqui os vteri, quod
 angustum esse diximus, nullo pacto aperiretur.
 at aperiri os vteri necesse est, vt semen ad eius
 concauum permeet, penetrètque. quæ si tunc
 bene affecta est, seménque vtriusque bene con-
 coctum, in vtero ipso vniuntur, & fit cõceptio:
 quicquid de hac re dicat Philosophus, qui ex v-
 no semine animal vnum probat generari. Illud
 verè scito, si viri seminis moles maior existit, vir-
 túsque maior, marem fœtum concipi, ac gigni.
 sin fœminæ semen quâtitate, ac virtute superet,
 fœminam euadere. nam vt maius lumen minus
 obscurat, ita præfenti maiori virtute minor ces-
 set, necesse est. Præterea cùm hoc in philosophia
 receptũ sit, omne simile suum simile appetere:
 quid mirum, si cùm mas marem gignere appe-
 tat, fœmina fœminã, cùm alterius semen alteri
 nunc præstat, maris exempli gratia, nunc mas
 gignatur, non fœmina: quòd si fœminæ, fœmi-
 nam non marem? Quòd si posteritatis causa, ita

*Vfus testium in
mulieribus.*

*In testibus mu-
lieris semen al-
bum, crassum.*

*In coïtu mulier
serpen emittit.*

*Quando fiat cõ-
ceptio.*

*Aristotelis ex-
por.*

*Quando mares
gignantur &
quando fœminæ.*

*Cur quandoque
mas gignatur,
quandoque fœ-
mina.*

Vbi natura dominatur, voluntate res illa non emmutatur.

Cur semen viri non detineatur, semper in utero fœmina.

Cur meretrices non concipiant, vel raro.

Cum mulier concepit, cur os uteri claudatur.

Membrana allantoïdis quomodo generatur, & eius usus.

A venis matricis oriuntur venae in fœtu.

Vena matricis à venis seminariis proficisci suo loco dixerimus venæ oriuntur, quæ coeunt venam producunt.

Vena umbilicalis perforat allantoïdem.

Iecoris generatio.

Vena porta continua est venæ umbilicali.

Quæ vena umbilicalis dicatur

ut sit, marem fœmina cupiat, voluntatis hic est appetitus, non naturæ. at in quibus natura dominatur, voluntate nō immutantur. Igitur postquam semini ab utero obuiam itum est, & is in suam ipsius cauitatem illud suscepit, & detinuit (neque enim quoties viri semen uteri fundum petit, retineretur: sed quandoque excidit, vel quia malè coctum est, vel quia loci muliebres nimis humidi, lubricique sunt, ut in meretricibus, quæ paucis non sunt contentæ, quarum ager die, noctuque marium imbribus irrigatur) tunc naturæ sagacis, & prouidæ motu, statim os uteri arctatur, ne semen, quod tanta voluptate suscepit, aliquâ exeat, atque elabatur. Circa hoc conceptum semen membrana generatur, quæ allantoïdis appellatur, vniuersum semen inuoluens, matricisque cauitati adherens. Ne autem semen corrumpatur, dictum ac factum à venis matricis, quas à venis seminariis proficisci suo loco diximus venæ oriuntur, quæ coeunt venam producunt. quæ dictam tunicam tenuem, mollēque adhuc, quippe quæ paulò antè genita fuerat, perforat. Itaque ad medium vsque semen allantoïde obuolutum penetrans globum efficit, qui globus ipsum est iecur. Deinde gignitur vena porta, quæ, ut dixi in tractatu de Venis, continua est huic venæ umbilicali: (umbilicalis namque dicitur ea vena, quam ad semen penetrare perforata allantoïde, hepaticę gignere dicebamus, eò quod per umbilicum ingreditur, atque ad

hepar

hepar ascendit) post venæ portæ ortum oritur
 caua vena: idque vt vniuersum semen nutrir
 possit. Item ab arteriis vteri, quas à seminalibus
 ortum ducere proprio tractatu docuimus, arte-
 riæ generantur, quæ in duas arterias vmbilica-
 les quoque dictas euadunt, quæ nō ascendunt,
 vt vena vmbilicalis: sed descendunt potius os
 pubis versus: diuisiōque illarum est supra ilia.
 deinde fit magna arteria, & immediatē cor, &
 arteriæ ascendentes: adeō vt arteriæ gignantur,
 priusquam cor ipsum generetur. Arteriarum au-
 tem generatio non fuit superuacua, sed seminis
 viuincādi gratiā. Viuimus enim prius vita plan-
 tæ, deinde brutorum vita in vtero matris. hoc
 peracto cerebrum generatur, vt nerui ab eo pro-
 fecti sensum primō, deinde motum ad vniuer-
 sum fœtum deferre possint. Interim enim alia
 fiunt membra, quæ delineata primō, deinde au-
 cta, & robustiora reddita mouentur. fileant hīc
 obsecro Aristotelici, vnā cum principe peripa-
 tericorum Aristotele, qui (in hoc mirē dece-
 ptus) cor primō gigni voluit, & si Deo placet,
 sanguinis fontem esse, & sensuum omnium:
 qui nisi obstinatē Aristotelem tueri volent, qui-
 escant veritate iubente, desinētque tam falsa
 proferre, & mordicus tueri, fatebunturque non
 cor, sed iecur primō gigni. Cerebrum item
 corde nobilius esse, non fateri non poterunt:
 quippe quod ex ipso semine fiat, non ab vtero,
 vt de corde audistis. Non equidem negauerim

*Ortus vena ca-
ua, & usus.*

*Arteria vteri
unde oriantur.*

*Arteriarū vmbilicalium ortus
& progressus.*

*Arteria gene-
rantur ante cor.
Cur arteria gene-
rentur.*

*Fœtus vivit
prius vita plan-
tæ, deinde vita
animalis.*

*Cerebrum quan-
do generetur, &
cur.*

*Cor primo gigni
falsum est con-
tra Aristotelem
Cor non est fons
sanguinis & seu-
sum.*

*Iecur gignitur
prius corde.
Cerebrum nobi-
lius esse corde
probat.*

*Cor est primum
quod oritur in
animalibus quæ
nascitur in ouis
In homine nasci-
tur iecur prius-
quam cor.
Spina dorſi inter
ossa primo gene-
ratur.
Aristoteles lau-
datur.*

*Hieronymus Pō-
tanus.
De aliis parti-
bus quid primo
fiat, obseruare nō
potuit.*

*Affuso orbicu-
laris instar pla-
centæ.*

Vſus.

*Galenus non de-
scripsit humanū
fœtum.*

*Galenī error.
Placentæ huius
ſubſtantia qua-
lis.*

*Placentæ ſitus.
Nō circūit vni-
uerſum fœtum.*

Cur in partu

in iis animalibus, quæ in ouis nascuntur, pri-
mum quod oritur eſſe cor ipſum. At in homine
iecur, priuſquam cor generatur: quemadmo-
dum mihi non ſemel, ſed ſæpiùs intueri, & ani-
maduertere contigit. Inter oſſa ſi quæras quid
primò generetur, vertebraſ reſpondebo. Spi-
nam ſcilicet, vt Ariſtoteles eleganter ſcripſit, &
verè. Hanc veritatem corona illuſtrium viro-
rum, & præexcellentiū magna cū voluptate vi-
dit in Romano theatro, cū Hieronymus Pō-
tanus ſummuſ Philoſophuſ embrionem men-
ſtruum mihi publicè diſſecandū tradidiſſet, ob
communem Romanę Academię vtilitatem: re-
liquorum autem membrorum quod primò fiat,
quod poſteriùs, nondum mihi licuit obſeruare:
cū abortiuum non ea ſit copia, quæ in tanta re
neceſſaria eſſet. Genita allantoidē, veniſ, arte-
riiſque per vmbilicum tendentibuſ, quæ ſuo in
exortu plurimæ ſunt, vt fulcirentur, natura af-
fuſionem quandam genuit, quæ orbiculariſ fit
placentæ in modum. facta autem fuit, vt va-
ſa, quæ diximus, vnita detineret: hæc à Gale-
no, qui humanam non deſcripſit, membrana
χωρίον, hoc eſt, ſecundina appellatur. Sed hæc in
nobis minimè eſt membrana, ſed craſſa quæ-
dam materia excrementorum inſtar. vſuſ ei-
uſ, quem paulò antè dicebamus. hæc licet al-
lantoïdi ſuperpoſita ſit, tamen fœtum vniuer-
ſum in minimè circuit, matrici admodum cohæ-
ret. Itaque nihil mirum eſt, ſi in partu magna
fit ſan-

fit sanguinis effusio. venæ etenim, arteriæque disrumpuntur. Anteriore in parte sita fuit, vt propugnaculi vicem gereret, quod nos ab externis iniuriis tueretur. hæc in brutis, vt boue, capra, equa, & id genus animantibus membrana quidem est, internâ regionem omnem ambiens, in illisque quibusdam eminentiis prædicta est, quæ à veteribus acetabula appellantur. In canibus hæc, quâ dicimus, secundina est instar fasciæ, quemadmodû illam Vesalius pinxit, qui caninam pro humana pinxit, licet in ea non catellum, sed infantulum pinxerit: sed secundina in homine est, quemadmodum ego suprâ explicauî. Allantoïs verò in nobis mēbrana insignis, & magna vniuersum fœtum inuoluens, antè sci licet, retrò, infrâ, supràq; sed in animalibus, quæ paulò antè dicebamus, facta est in morem farcinis, quod vox Græca sonat ἀλλαντος δὴς. neq; in illis fœtum vndique ambit, sed illi substernitur: neq; illud temerè, sed vt urinam suscipiat. Præter hæc, quæ hætenus memorauimus, tertia est in humano fœtu considerata membrana, qua neque bruta ipsa destituuntur. hoc vnum interest, in illis crassa est, quemadmodû ait Galenus, in nobis autem tenuissima est, diciturque ἀμνιος, vel ἀμνιός: ab hac quoque vniuersus inuoluitur fœtus, & in ea immediatè fœtus situs est, & sudor à fœtu emanās, atq; eius excrementum cōtinetur, in quo sudore innatat, atq; ab eo fulcitur: ita enim minus molestus est puer matri.

magna sequitur sanguinis profusio.
Ratio sitis placenta redditur.
Hæc placenta in brutis qualis sit

Acetabula quæ dicantur veteri Anat.

Secundina canis instar fasciæ.

Vesalius auctor qui secundinam canis cum pinxisset non catellum sed infantulum in ea pinxerit.

Allantoïs membrana in homine qualis.

Allantoïs qualis sit in brutis.

Allantoïs quid significet.

Tertia membrana agnoscitur qualis & eius usus in humano fœtu.

Sudor detenti ab agnio usus. Cur præter urinam & sudorem non sint alia excrementa fœtus.

Fœtus nutritur sanguine laudabili, non mēstruo. Error vulgi.

*Prima infantis
ubi seruetur.*

*Cur urina non at-
tingat farum.*

Ne mireris autē à fœtu alia excremēta nō deci-
di præter urinā, & sudorē . nā ratio in promptu
est , quòd scilicet fœtus ex solo sanguine alitur,
eòq; laudabili, nō mēstruo, & terribilissimo, vt vul-
gus hominū putat. Sudor, vt diximus, penes fœ-
tum seruatur hac in membrana , quæ à mēbris di-
citur, urina verò ipsa, alterū scilicet fœtus excre-
mentū seruatur inter amnion, & allantoïda. hoc
autē nō temerè, sed summa cū prudentia effecit
Deus omnipotens, ne lotiū attingeret fœtū, qui
cū tenellus sit, suprā quā dici possit, à lotio sal-
so, atque acri facilè exesus fuisset. Natura itaque
Dei ministra in fundo vesicæ porū, seu meatum
genuit, qui οὐραχὸς nominatur, qui à vesicæ fūdo
ad vmbilicū sursum fertur, exit verò ea in parte,
per quā vena, arteriāq; vmbilicalis ingreditur,
ipsiq; adhærescit. hic vrachos amnion membra-
nam perforat, itaq; fœtus urinā in allantoïdem
defert. Hīc quærere aliquis possit, neq; id iniu-
ria, quo pacto tanta excrementorū vis tā diu nō
putrescens detineatur. Cui respondere facile
possum, id caloris naturalis conseruantis virtuti
acceptū ferēdum. Neque hæc tam diuturna ex-
crementorū fœtus cōseruatio inutilem prorsus
naturæ existimes , immò verò & dum in vtero
fœtus alitur, ita ab vtero gerētibus facilius susti-
netur. Dum verò partus instat tempus, has duas
mēbranas amnion, & allantoïda disrumpunt, &
exeūt, secūmq; vna fœtus. propterea obstetrices
duo, quæ diximus, excrementa aquæ nomine
passim

*Cur sudor & u-
rina pueri rot
mensibus detin-
ea non putrescat.
Vtilitas sudoris
et urine dum in
vtero sumus.*

*Vtilitas sudoris
& urina in par-
tu.*

*Quid appellent
obstetrices a-
qua.*

passim vocant : cum aquam exeuntem vident,
partum mox in lucem proditurum astantibus
prædicunt : qui si tunc exit, partus ipsius exitus
est facilior, feliciorque. Nam parum excremen-
torū humiditate partes lubricæ reddūtur. quòd
si remorantur, magna cū difficultate, ægréque
parituram puerperam certò scito. Scire omnes
cupiunt, quæ sit pariendi dolorum causa potis-
sima : quibus breui satisfaciā, dolere vehemen-
tissimè parientes ob angustiam oris matricis,
quā tunc adeò dilatari necesse est, vt fœtui absq;
difficultate exitus pateat. & quoniam ex mulie-
ribus nonnullas inuenias, quibus os vteri durius
est, & nerueum magis, hinc dolores parturien-
tium nō sunt iidem : sed aliquæ statim, & penè
sine dolore pariunt, aliæ diutius in doloribus,
& cruciatibus, illisque vehementissimis versan-
tur, priusquam pariant : ita vt inueterata sit inter
mulierculas, & vetulas opinio, in ipso partu nul-
lum esse os, quod suo stet loco mulieris partu-
rientis : sed omnia dimoueri, atq; è sua sede exi-
re licet rei veritas hæc sit, os coccygis duntaxat
in partu pati. propterea obserua mulieres, quæ
peperere, de regione coccygis sæpe, multūmq;
conqueri. sed iam ad fœtum ipsum redeamus.
Fœtus in matris vtero alimentū per vmbilicum
suscipit, venæ vmbilicalis ope : fabulæque sunt,
quas magnus Hippocrates, qui omnia scire non
potuit solus, de pueri nutrimento in aluo matris
dixit : quòd scilicet per os exugat : & profectò

*Si cum excre-
mentis exeat fœ-
tus, partus est
facilis, & cur.*

*Cur rari sint do-
lores parturien-
tium.*

*Cur aliæ magis,
aliæ minus do-
lent in partu.*

*Ossa omnia mu-
lieris in partu è
sede moueri sol-
sum est.*

*Coccyx in partu
patitur.*

*Quomodo fœ-
tus nutriatur.*

*Hippocratis ex-
ror maximum te-
sellitur.*

tanti viri errorem tam crassum nequeo satis mirari. nam inter os fœtus, matricisq; substantiam multum interest sed fac nullum inter hæc spatium dari: age, os fœtus vteri corpus attingat: quo pacto succum, qui vel in matris ventriculo est, aut in intestinis, exugere posset oprime Hippocrates? Quamobrem haud dubiè scias candidè lector, fœtum nihil prorsus per os assumere. quòd si assumeret, suo ipsius sudore hausto obrutus non interire non posset: sed per venam umbilicalem duntaxat nutriri, nutriri inquam bono sanguine, atq; adeò perfectò, qui per vasa seminaria defertur: quod idcirco factum fuit, vt materià vnà cum sanguine còtinentèr deorsum ferrent, tanquam auxiliares copias, si quandoque sanguis deesset. Quòd si perfecti seminis numeros omnes nò explet, nihilosecius materia est, quã natura eò mittit, vt in semen tandem conuertatur. Vana quidem est, falsaque eorum sententia, qui fœtum sanguine mēstruo nutriri aiunt. nam quod illi pro huius rei probatione in medium afferunt, dum fœtus in vtero est, statò tēpore menses nò fluere, nihil est. nā ego complures noui, quibus vtero gerentibus singulis mensibus menses profluebāt, quod ob magnam sanguinis copiam in illis mulieribus euenire certum est. Quibus verò tanta sanguinis copia non adest, iis, dum grauidæ sunt, neque adsunt menstruæ purgationes, quia non gignitur, quod superuacancū sit naturæ inut-

le, &c

*Infans in utero
alitur per venā
umbilicāle san-
guine perfectò.*

*Cur sanguis è
quo alitur infans
in utero per va-
sa seminaria de-
fertur.*

*Sanguine men-
struo nò ali fœ-
tum probatur.*

*Aliquibus vte-
rū gerentibus flu-
is mēstruus san-
guis.*

*Quibus prægnā-
tibus menses nò
fluunt, cur non
fluuant.*

le, & ab utero eiciendum: sed vniuersus ad fœ-
 rum ipsum naturæ miraculo distribuitur. Nihil enim aliud esse existimato menstruum sanguinem, qui diuersis rationibus diuersas habet appellationes, quàm sanguinem superuacuum, qui herbas, atque arbores nõ cogit arescere: quemadmodum scripsit Aristoteles. Hippocratis verò sententiam, quòd infans ore sugat, hinc ortam puto: quòd is materiam illam, quæ in fœtus intestinis conspicitur, fæces, cibique excremēta crediderit, quemadmodum in adultis: sed deceptus est bonus Hipp. non enim cibi, sed sanguinis excrementum illud est, quod in fœtus intestinis continetur. propterea non male olet materia illa, quemadmodum fæces nostræ. Quòd si cibi excrementa forent, emitterentur, veluti lotium emittitur. Itaque vndiq; cōspurcati essemus magno naturæ errore, magno infantis detrimento, quod absurdum esset. Natura igitur sapiens noluit nos, dum in utero matris versamur, neque oculis uti, neque auribus, neque instrumento odoratus, neque gustus, neque ore, neque pulmonibus, neque ventriculo, neque intestinis, neque ano, neq; pene, neq; manibus, pedibúsue. quo enim tendas in illis materni vteri tenebris? quod attrectes? quis penis vsus? quis ani? quis intestinorum, aut ventriculi? quid ore trahere nisi mortem posset? quid gustet? quid olfaciat? quibus harmoniis aures detineat, & mulceat? quorsum oculos flectat,

Mēstruum sanguis quid sit.

Mensibus nõ arescunt arbores.

Causa erroris Hippocr. quòd infans ore sugat cibum in utero unde manauit.

Cur quod in intestinis infantis, qui in utero est continetur non male oleat.

Quibus mēbris dum in utero sumus, nõ sit opus uti.

*Infans in utero
non indiget usu
cordis.*

*In utero per ar-
terias respira-
mus.*

*Arteriae & ve-
na umbilicales
describuntur.*

*Obstetrici præ-
dicti tot fore
partus, quot no-
di cernuntur in
vasis arteria ve-
naeque umbili-
cali.*

*Vfus vene & ar-
teria-umbilica-
lis.*

*Vasorum nexus
in umbilico, ne-
xus progressus
& utilitas.*

Non est laqueus

& recreet? imò verò quod magis miraberis, ne-
que cordis usu tunc eget infans. nam vitalis spi-
ritus, seu maior spiritualis sanguis per arterias
matris umbilicales ad fœtum fertur, quibus ar-
teriis mediis, quarumque auxilio respiramus, si
illa respiratio dici meretur: adeò ut fœtui nihil
sit elaborandum, neque in sanguinis, neq; vita-
lium spirituum generatione. hæc nanq; à matre
iam elaborata ad omnes fœtus partes deferun-
tur. hæc arteriæ umbilicales & vena item umbili-
calis à matrice ad umbilicū vsque longo nimirū
ductu à peritonæo inuoluuntur ibi crasso satis,
quæ vasa cōtorquentur, & quosdam nodos effi-
ciunt. quibus visis nodis (nō enim iidem nume-
ro sunt in omnibus quæ peperere) prædicūt ob-
stetrices, quæ medicæ ipsæ quoque, si Deo pla-
cet, videri volunt: tot fœtus ab eo utero prodi-
turos, quot ipsi sunt nodi, licet totidem plus mi-
nus in extremo fœtu, quot in puerpero conspi-
ciantur. Hæc autem vasa creata sunt non teme-
re, sed ut sanguis ad fœtū deductus cūctaretur,
& cessaret quodammodo in ipso cursu: ut hac
cunctatione ad ipsum perueniret. Vasa hæc, quæ
diximus, à mēbranis recta ad ceruicē tendunt,
& circa ipsam flectūtur deorsum tendētes, atq;
in umbilicū infigūtur. Qui vasorum nexus per
sinistrā scapulā ascendēs per dextram descēdit:
idq;, ut in exitu mēbranas cū secundina secum
vnā traherēt, quod superstitiosæ mulierculæ la-
queū esse dicunt, atq; in lucem editis malè omi-
nantur,

nantur, quasi illi. si superstites sint, non possint tandē nō suspendi. Sed si diligentius hæc natura arcana scrutarētur in illis præsertim, qui non sunt agrippæ, sed capite antesignano prodeunt, idem in omnibus obseruaret: cum tamen pauci

qui prædicat suspendendos quæ putant obstricti- ces.

suspendatur, nō omnes. Illud præterea adnotandum est, quāuis vnica adsit in vtero cavititas, tamen plures fœtus in illo cōcipi posse, si apta adsit tot cōceptibus materia. quæ cōceptus materia, semen inquā est: dū verò fœtus delineatur, nisi suis singuli mēbranis distinguatur, simul co

Quomodo possunt gigni plures fœtus in vtero, licet vna tantum sit eius cavititas.

hærent, monstraq; hominū sese attingentiū fiūt. De fœtus formatione satis multa hætenus dicta sunt: nūc de situ eius in vtero dicamus. quā

Quomodo fiant monstra plurimū infantium se attingentium.

partem libentiū, vt opinor, lector cādidus percurreret, quod alij nō rem ipsam, sed quod verisimilē cuiq; visum est, ita scriptū reliquerūt: omnes tamē à rei veritate tam aberrarūt, quā qui maximē. Ego verò nō semel, sed sæpius nō modò mortuos fœtus, sed viuos etiā è matris vtero

De situ infantis in vtero.

hisce manibus extraxi. quod dū efficerem, situm eius in vtero diligenter obseruavi, quē à quibusdam Anatomicorū picturis adeò diuersum esse facile perspexi, vt non potuerim eorū temeritatem nō valde mirari, qui quod falsum est, cuius oppositū sensu deprehendi potest, posteris scriptū relinquere non erubuerint. Tres igitur fœtus in vtero situs obseruasse fateor, & profiteor, præterea nullos. quorū prior est caput deorsum

Situs infantis in vtero quem imaginabatur. nō quem viderant describere anatomici alij.

versum, hīcque est situs omnium frequentissimus.

Temerarium est scribere. cuius oppositum sensu deprehendi possit.

Tres situs solentur infans in vtero.

Primus situs.

Secundus situs.

Tertius situs.

*Qui primo situ
sunt in utero,
quomodo exe-
ant uterum.*

*Qui secundo si-
tu in utero con-
tineantur agrip-
pa.*

*Qui tertio situ
sunt in matrice
quomodo in lu-
cem ferantur.*

*Non potest in-
fans in utero à
capite ad pedes
delabi: vel contra*

*Quocunque situ
sit infans in ute-
ro sphaericus in
oblongum ver-
gens situs est.*

*Particularis de-
scriptio singula-
riu partium in-
fantis quo situ
sint in utero, &
vera.*

Secundus capite sursum elato, quo situ raro vi-
dentur infantes in utero. Tertius transuersim
iacet, atque hic est secundo rarior, Propterea
priori situ infantes capite præeunte in lucem
prodeunt. Secundi pedibus, qui & agrippæ vo-
cantur. Tertij natibus, facie omnes coccygem
matris versus respiciunt. Iam enim explosa il-
lorum sententia est, homines prius quam ute-
rum exeant, simiarum instar seu funambulorū,
& mimorum à capite ad pedes, vel è contra di-
labi, & procumbere, vel è conuerso. Id enim lo-
ci angustia minimè patitur, quæ tanta est, ut vix
nostri sit capax, cum excremētis, membranisque;
siue capite elato, siue deorsum labente, vel tras-
uersim siti simus. Quocunq; autem situ ex hoc
triplici toties euumerato nos uterus exceperit:
in globum atque orbem excipimur, sphaericus-
que est omnis situs infantis in utero: sphaericus
inquam in oblongum vergens, & ut priuatim
res magis innotescat, dexterum brachium no-
bis tunc flectitur, manus autem extrema vnà
cum digitis extenditur, qui digiti sub aure dex-
tera, superque ceruice positi sunt: sinistrum ve-
rò brachium tantū non extenditur, supràque si-
nistram mammā, necnon supra faciem (caput
nanque in utero ita flectitur, ut mētum ad tho-
racem perueniat): sinistrum itaque brachium
medio cubito dextero falcitur digitis semiextē-
sis, pollice deorsum. crura tanta arte sursum fe-
runtur, & incuruātur, quasi in arcum, ut dictu,
visūque

visuque res pulcherrima, & admirabilis existat. femur, tibia, pèsq; extremus dexter nobis co tēpore flectuntur, adeò vt à femore abdomen attingatur, à genu vmbilicus, deinde tibia deorsum flectitur, calcéque sinistras nates attingit, extremum eleuans pedem, pudendáque occultans, adeò vt pollice dimidium, tibiam ipsemet tangat, sinistrum crus ipsum quoque semiflectitur. femur ventrem imum tangit, tibia suprà abdomen, thoracémq; vertitur, & sub extremum brachium. pes autem extremus sursum voluitur dextrum *ὠλέκρانون* attingens, sinistrique brachij *μετακάρπιον*. dorsum deinde in anteriora fertur, adeò vt ex his omnibus globus sphæricus oblongus euadat. atque hic est verus, & legitimus situs humani fœtus in vtero, quem ego Iacobo Antonio Bono Ferrariensi Medico præcellentí, qui simplicia medicaméta in Romana Academia publicè proficitur, éstque rei Anatomice, reliquarúmque bonarum artium, & scientiarum tam studiosus, quàm qui maximè, cùm eum vnicè diligã, primùm lubens ostendi: Qui rei pulchritudine allectus, & detētus obstupuit, summíque opificis sapientiam inenarrabilem summis laudibus extollebat. Quis enim fœtus humani generationem, nutritionem, sitúmque contemplatus non obstupescat? Quis Dei infinitam bonitatem satis laudet? Equidem de his silere satiùs est, quàm pauca dicere.

Gg

*Iacobus Bonus
medicus Ferrariensis.*

*Fœtus humani
generationis nutritionis & situs
consideratio nos
ad Deum laudandũ inuitat.*

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber Decimus tertius.

DE TEGENTIBVS FABRICAM HUMANI CORPORIS.

De Cuticula, Cute, Pinguedine, Membrana carnosâ,
Pilis, & Perioftio. CAP. I.



ORPV S nostrū, in quo
tantum industriæ natu-
ra meritò collocavit, un-
diq; tectum esse decuit,
ne ab aëre ambiente al-
terari, ab externisq; re-
bus lædi tam facilè pos-
set. propterea natura pru-

dēs hęc tegumēta genuit, extrinsecusq; in uni-
uersi superficie obduxit, primò cuticulā, quam
ἐπίδερμις & επιδερμίδα vocant Græci, quæ cutem superemi-
net, & ambit. hęc nobis communis est cum
cæteris animantibus: tenuissima est, earum pel-
licularum instar, quas inter cæparum septa vi-
demus, facilè aboletur, facilè etiam restituitur,
estq; omnis prorsus sensus expers. Huic epi-
dermidi

ἐπίδερμις & επιδερμίδα
cuticula.

Deperditur &
renascitur faci-
lè.
Sensus expers.

dermidi vera cutis subest, *dépuæ à Græcis dicta, d'épuæ vera*
quæ & ipsa vniuersum corpus inuestit: quādā *cutis.*
tamē loca excipio, vbi perforatur, vt in auribus,
oculis, naribus, ore, pene, ano, vulua, extremis
digitis, vbi vngues affixi sunt: his addere pote-
ris vmbilicum in fœtu. Præter hæc cutis fora-
mina, vel lippis nota, & perspicua vbique poris
referrissima est, & instar cribri foraminulenta,
per quæ sensui occulta foramina sudor exit. Sed
hæc in nonnullis latiora sunt, in aliis angustio-
ra: hinc aliis sudor nullo negotio profluit: aliis
ægrè excitatur. Cutis substantia non est vbique *Substantia va-*
eadem. nā hîc crassior existit, ibi minus crassa, *ria.*
illic tenuior. Crassior cutis in capite conspicua
est: licet Aristote. oppositum scripserit, cutem, *Aristotelis er-*
inquam, capitis omniū tenuissimam esse. Sub- *ror.*
tilis admodum est cutis in facie, pene, scroto, *Vbi tenuior sit*
vola, atque internis digitis, seu digitorum in- *cutis.*
teruallis: quamuis illa ob exercitia frequentia
crassescere consueuerit. reliquas corporis partes
si accuratè contempleris, parum interesse iu-
dicabis: cuius substantia neruea est: nerueum *Substantia ner-*
autem, seu neruosum cū dico, rem ex neruis *uea.*
conflatam minimè intelligo, sed ex substantia *Quid per ner-*
alba, sensu prædita: ex neruorum filamentis, ve *ueum sit intelli-*
gis, & arteriis conflata. quare cū neruis non ca- *gendum.*
reat, optimo sensu præditā esse quid vetuit? quā-
uis cōtrarium senserit philosophus, qui sensum
in carne falsò posuit. Cutis alicubi pertinax est, *Cutis sentit con-*
alibi laxa: in facie nanque, in auribus, in vola, *tra Aristotelē.*
Vbi sit pertinax

G g ij

in planta pedis pertinacem esse excoriando ex-
perieris. Quoniam in hisce locis cutim mobile

Adeps sub cute

esse oportuit. Sub cute pinguedinē, seu adipem
cernes, nihil enim nunc refert, quæ colore alba
est, itaque nota vnicuique, vt neque descriptio-

*Vtilitates pin-
guedinis.*

ne, neque alia egeat explicatione. Vsus pingue-
dinis est, vt calorem natium non secus ac ve-
stis detineat: neque hoc solum præstat, sed pro-
pugnaculi vice fungitur, cibi etiam vice in ex-
tremis inediis fungitur, & in maribus, quemad-

Galenī error.

modum in fœminis reperitur, quicquid Gal. lib.
de Temperā. scripserit in maribus scilicet nul-
lam, aut exiguam quidem certè adesse pingue-

*Generatio pin-
guedinis.*

dinem. Gignitur autem ex sanguine crasso è ve-
nis exudante, eiúsque copia ingens in frigidis tē-
peraturis cernitur, contrā exigua in calidis, cū à

*In scroto & pe-
ne.*

pene, scrotóque discefferis, in reliquis nostri cor-
poris partibus inueniri pinguedo potest. Quòd
si motum vsúmque eorum, quæ pinguedine ca-

*Vbi dura repe-
riatur adeps.*

rent, consideraueris, facilè rationem diuersita-
tis inuenies. Substantia pinguedinis non est
omnino vbiq̃ue. nam in vola, & sub pedis planta,

Error Auicennae.

penè carnea est, ac dura. huiusmodi verò ob mo-
tum ipsum effecta est: non est tamen sensus or-
ganum, vt Auicenna scriptum reliquit. Pingue-

*Quartum inno-
lucrum.*

dini subest membrana carnea dicta, quæ ipsa
quoque vniuersum corpus ambit: & quartum
illius inuolucrum existit, à summo capite ad ex-

*Quare dicatur
carnosa.*

tremum vsque pedem velaminis instar. Carnea
verò, seu carnosa dicitur eò quòd in collo car-

nosa

noſa euadit, atque adeò carnoſa, muſculoſa. Ad-
de veteres Anatomicos huic mēbranæ carnoſæ
nomen impoſuiſſe: quoniam infantibus carnea
eſt, multîſque fibrîs referta, quæ deinde euane-
ſcunt tractu temporis. Illud velim non oſcitan-
ter animaduertatis, carneam membranam ſub
ala minimè muſculoſam dari: licet Galenus pri-
mo de Anat. adminiſt. muſculoſam ibi eſſe hâc
membranam exiſtimauerit. Ex quo loco, vt re-
liquos nunc miſſos faciam, apertè colligi poteſt
Galenum ſimias, brutâq; nō homines ſecuiſſe.
Adhæret carnea membrana muſculis ipſis, &
inter ipſam, cutēmque venæ ambulant ſuperfi-
ciariæ, è quibus ſanguis mittitur, & arteriis ca-
rent. Tempora excipio, frontem, caput, penē,
ſcrotum, & digitos, quibus locis exiguæ nume-
ro inueniuntur arteriæ inter cutim, & membra-
nam carneam.

Galenî error.

*Colligitur Gale-
num non ſecuiſſe
ſe homines.*

De Pilis.

C A P. II.

PILI quanquam ſuperuacua partes neſcio
quo pacto videntur eſſe, tamen quoniâ cor-
poris noſtri veluti tegumentum exiſtūt: de his
quoque ſermo à nobis habendus eſt. Nam præ-
terquam quòd corpus tegunt, vt diximus, eidē
propugnaculi vice deſeruiunt. Addunt aliqui
tertium uſum pilorum, vt vapores illi fuliginofi,
qui in tertia alimenti coctione eleuantur, dum
in ſubſtantiâ membrorū tranſit, in pilorum nu-
trimentum conſumerentur: quam ſententiam
neque laudo, neque vitupero. facti etiam ſunt

*Pili pro ſecundo
tegumenta.*

Gg iiij

*Vnde oriuntur.**Ex qua trahāt
alimentum.**Hispanum pilo-
sum.**Vestalem pilo-
sam.**Quare vola &
planta careant
pilis aliorū sen-
tentia reproba-
tur.*

pili ad ornatum. Ortus eorum hic est: è cute emergunt, eam totam perforantes. in radice crassiorem pilū, quàm in reliquis partibus deprehendes. pinguedinēque illi affiguntur, quam inter cutem, mēbranāmq; carneā firmam esse diximus, præterquam in scroto. propterea pili ali-
mentū à pinguedine trahūt: itaque augescunt. eorū substantia sicca est, vt videtis in variis nostri corporis partibus: vix enim agrestem hominem inuenias, qui pilosus vndique cōspiciatur, vt in brutis cernimus. Ego tamen Hispanū quēdam vidi pilis refertissimum in omni corporis parte, præterquā in facie, & manūū parte. Vidi etiā vestalem adeò pilosam. sunt qui scribāt neque in planta pedis, neque in manus vola, pilos oriri posse. Causam in latum tendinem reiciūt cum nullo pacto sit causa: sed depiles hæ partes factæ sunt tum ob vsum, tum ob motū. Quod autem hæc pilorum careptia (vt ita dicamus) in latum tendinem reici nequaquam debeat, instantiam in promptu habeo plantæ, volæque leporis, quæ depilis non est, sed pilis referta: licet lati tendinis experts non sit. quas partes in lepore natura sagax pilis muniuit leuitatis gratia, quæ res in animali adeò timido ob fugā necessaria erat. Sed iam de pilis satis.

De Periostio.

CAP. III.

Substantia.

PERIOSTION membrana est neruea, tenuisque, quæ ossa ambir, illisque valde, atque adeò validè adhærescit, multo sensu prædita, propterea

propterea multi decepti sunt huius membranæ
ignoratione ossa sentire existimantes. Hanc in
interna caluaria ne quærito. nam ibi nulla est,
quamuis sub pericranio inueniatur: neque den-
tes perioftio inuestiuntur. Quid enim dentibus
opus erat perioftio? neque illud in articulatio-
nibus ossium spectabis: quod si adesset, miros
dolores excitaret in illorum motu.

*Perioftium in
interna calua-
ria nō reperiri.*

*Dentes vacans
perioftio.
Cur in articulis
non inueniatur.*

REALDI COLVMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber Decimus quartus.

DE VIVA SECTIONE.



V M Anatomes cogni-
tioni studiosè incumbi-
mus, velis (vt aiunt) &
equis: nōnulla quando-
que occurrunt, quæ nos
in ipso cursu remoratur,
quorum actionem scire
nullo pacto possumus,
nisi viua sectione vtamur, nō hominis quidem,
vt veteres vsi sunt, quod nefas, atq; impiū Chri-
stiano Medico nō videri nō posset: sed brutorū,
cūm præsertim animaduerrere liceat, ob viuam

Viua sectio.

*Cur viua vta-
mur sectione.*

Gg iij

*Galenus cur nō
secuit homines.*

*Nō debebat Ga-
lenus antiquis
contradicere.*

*Ex simia sectio-
ne perfecta hu-
mani corporis
Anatome ac-
quiri non potest
contra Galeni
ordinem.*

*Non licet homi-
nes viuos secare.*

humani corporis Anatomen, qua prisci medici
vtebantur, adeò malè audisse, vt nō modò viuos
homines secare, sed ne hominis quidè cadauer
liceret. Atque hanc vnā ob causam Galenū ad-
ductum puto, vt ab humani corporis Anatome
abstineret. Sed bone Galene si tibi crudele ni-
mis videbatur viuum hominē secare, si animus
horrescebat, si reformidabas, vel si tibi neque vel
mortuū hominem secare per Principū ediēta,
aut inueteratā consuetudinē nō licebat: quo pa-
cto licebat tibi simias secanti veteribus cōtradi-
cere, quos humana corpora secuisse, tu ipse testis
es locupletissimus? Profectò hodie cū ob cō-
munem viuorū vtilitatem cōcedant Pontifices,
Reges, atq; Imperatores, vt in publicis Acade-
miis quotānis Anatomici reorum cadaueribus
secandis Anatomen profiteantur, facilè est cō-
trouersias istas diiudicare. Multis in locis vete-
res reprehendis, cū tute maiore his dignus sis
reprehensione. Nam & si simia simile quid ha-
beat homini, simia tamen est, non homo. neque
eius compago hominis fabricæ omni ex parte
respondet, partēsque nōnullas in homine con-
spicias, de quibus veteres Anatomici loqueban-
tur, quibus simia caret, sed ad rē redeamus. Cū
viuos homines secare Christiana Religione pro-
hibeamur, si neque simiæ, neque vrsi, aut leonis
copiā suppetat, cuius fabrica humanæ proximè
accedit, quorū etiam viuorū sectio, quòd feræ
sint, licet mansuefactæ, cū irritantur difficillima
esset,

esset, de viui canis sectione loquamur. Canem igitur deligito, seu marem illum, seu fœminam maui, iuuenem: catelli namque, dum secantur, vociferantur magis, quàm senes. oblonga etiam sit ceruice. Canem propono viuum secandum potius, quàm suem, quòd pro reuersiuorù neruorum vsu dignoscendo sues minus accommodati sunt, tum ob pinguedinem exuberantem, tum ob eorum ingratum nimis auribus clamorem, & grunitù, quod ego Cremonæ expertus sum, vt præcellenti medicorum collegio in hoc quoque satisfacerem præsertim Bonhomini Ofredo, Hieronymo Macagno, Petro Manax, Ioanni Baptistæ Picenardo, Ioanni Francisco Borgia, Ioanni Baptistæ Bonetto. Cùm enim totius Anatomes historiam ex humanis cadaueribus accuratè me dissecante conspexisset, efflagitarunt, vt viui canis Anatomen pro vocis organo præcipuo illis in iuvene sue ostendere ne grauarer. Quod lubens feci, neque sine frustrati sumus, sed nimis obstrepebat. Dimisso itaque sue, canis iuuenulus in promptu sit longo (vt diximus) collo. (est enim canis animal, quod latratu vocem effingit, atque efformat) Tabella adfit necesse est suprà, infràq; foraminibus eo ordine distincta, vt iis vinculis suscipiendis sat sint, quibus quatuor canis crura vincias: ita tamen, vt explicata sint, & distincta. Caput itè eo modo deligandum est, vt canis quidem vociferari possit: at non mordeat. In cuius viua sectione,

*Cur in iuvene
cane tractanda
viua sectio.*

*Quare nō in sue
tractanda viua
sectio.*

*Canis potius
quàm aliud a-
nimal in viua
sectione capi de-
bet.*

*Quomodo con-
stitui debeat ca-
nus pro sectione
viua.*

Qua consideranda in viua sectione.

Diaphragmatis motus contemplatio.

Viua sectionis summa utilitas Motus arteriarum ex viua anatomie.

Cordis contractio, & dilatatio qui fiat.

Cordis systole.

In detecto corde pulsus differentias dignosci.

priusquã ad eam accedas, illud primò animaduertendum est, in quo vox consistat, quod admirabile est: deinde pulmonis motum contemplaberis: deinde quo pacto pulmo cor amplectatur: deinde cur fiat, vt altera thoracis parte læsa, illæsa altera perstet. Vnde mediastini utilitas elucet. Præterea diaphragmatis motum contemplari potes, quod inspirando dilatatur, & expirando cōstringitur: quod cū sit, sursum agitur, cū verò dilatatur, deorsum fertur. Ad hæc pulcherrima visu illud quoque accedit, motus scilicet cordis quemadmodum amplificetur, atque arctetur: item qualis sit motus arteriarum in viua Anatome, si lubuerit, conspiceris: nunquid idem sit, vel oppositus motui cordis. Cōperies enim dum cor dilatatur, constringi arterias, & rursus in cordis constrictione dilatari. Verū animaduertas, dum cor sursum trahitur, & tumesceri videtur, tunc constringitur. cū verò se exerit, quasi relaxatus deorsum vergit: atque eo tempore dicitur cor quiescere. estque tunc cordis systole, propterea quòd faciliùs suscipit, minoréque labore; at cū transmittit, maiori opus est robore. Neque hoc floccifacias: etenim non paucos reperias, qui eo tempore cor dilatari certò opinantur, quo verè cōstringitur. Illud insuper adnotare debes omnem pulsus differentiam detecto corde conspici posse: ita vt ex hac viui canis sectione plus vna diecula discas, quàm multis mensibus ex pulsu arteriarum: neque

querantur tribus integris mēſibus voluptatis, atque pulſum cognitionis capies ex lib. Gal. de Pulſ. quantum vna horula ex inſpectione cordis mouentis canis. Præterea videre licet, quo pacto cor, non modò vt omnes norunt, dilatatur, atque conſtringitur: ſed cerebrum quoque, quod paucis notum eſt. In cordis ſectione quū primū pericardium aperis, humorē aqueum in pericardio detentum diligenter inſpicere ne aſperneris. ſi canem fœmellam prægnantem ſecabis, abdomen reſerato, vteròq; accuratè, quoad eius fieri poterit, ſectò, fœtum inuolutū eximito, & quo pacto *χρόιον* membrana vtero annexa ſit, non oſcitanter conſiderato, & quo pacto venæ, arteriæque diſrumpantur. Item ſecundinam in canibus inſtar ſcifiæ fœtum circundare, vt Veſalius pinxit, dum ipſum humanum fœtum pingentem expectabamus, non canis, vt in noſtro tractatu de fœtu apertiùs explicauimus. Allantoide poſtmodū abrupta, lorium diſfluit, diſrupta amnio, ſudorem manantem cernes, ſitūque canis in vtero pulcherrimū obſerabis. Anterioribus enim pedibus ceu manibus crucem referentibus iacent catelli, ac ſi omnipotenti Deo ſupplices pro eorum creatione, atque in lucem exitu preces effunderent. Illud inſuper nunquam credidiſſes, quod videns obſtupeſces: morientem matrem catulorum, quos Anatomicus ab eius vtero abſtraxit, maiorem curam gerere, quàm ſuimet. Nam ſi coram ipſa ſi-

*Cerebri motus
cum cordis ma-
tu coincidit.*

*Vteri videntis
canis ſectio.*

*Allantois memo-
brana lorium
continet.*

*Amnios mem-
brana ſudorem
continet.*

*Mira ſecta ca-
nis moritura in
fœtum beneuo-
lentia.*

hum lædis, latrat, vociferatur: sin illum ori illius admoues, silet, atque magna pietate lambit. Quòd si aliud, nō catellus ori eius, quam secas, matris accedat, rabie percita mordet, quem naturæ amorem, atque adeò parentum in liberos incredibilem charitatem in publicis theatris maxima spectatorum admiratione sæpius ostendi, Patauij præsertim, cūm adesset Illustrissimus ac Reuerendissimus Rainutius Farnesius, tūc Venetiarum prior, nunc Cardinalis S. Angeli nuncupatus, quem honoris, & obseruantia gratia nomino. Aderat item Bernardus Saluiatus Romæ prior, nunc Episcopus * & Aluissius Ardinghellus Episcopus Forosempronienfis. Aderat Felix Acrambonus, Ioannes Baptista Vrsinus nunc Archiepiscopus, Eques Vgolinus Fanenfis, Bernardinus Thilesius omnes tunc iuuenes magnæ eruditionis, & expectationis, qui expectationem, quam de se Patauina Academia conceperat, longo interuallo superarūt. Hi omnes, item alij multi summa cum voluptate huic viuæ canis sectioni interfuerūt, & illud insigne exemplum de ingenti amore vel brutorum in filios se nunquam oblituros asseuerabant. neque has duntaxat discendi voluptates, quas hactenus memorauī, ex viua canis sectione percipies: sed cognosces, quā in hoc longa errauerit via Peripateticorum princeps Arist. cūm ausus est dicere tres ventres inesse cordi, in quorū dextro sanguis adsit calidissimus in sinistro frigidissimus,

Aristotelis error de cordis ventriculis.

mus, in medio mediocris. Tu verò dextro cordis ventriculo inciso, si digitum immiseris, calor tepidus tibi occurrer: at in sinistro tantus, ut ferre vix possis. Illud insuper, quod sæpe in dissectione venit, quo pacto verè se habeat experieris, an in arteria venali aër, & vapor ille, quæ capinosum quasi humidum dicunt, vel sanguis contineatur. Caue autem pures Anatomicum tot, tantæque spectatoribus ex vnius viui canis sectione ostendere posse, sed plures adsint necesse est: nam animã prius efflasset canis, quàm hoc vel illud obseruare potuisses. Postquàm igitur canem, ut diximus, tabellæ affixeris, nouacula, cuius acies pulchrè abradat, colli cutem rectè aperi, à larynge initio sumptò, & penè ad summum vsque thoracè preuenito: deinde profundiori sectione musculos, qui asperæ arteriæ imminet, parumper secato: deinde dimisso rasorio cultro, vel digitis potius ab aspera arteria musculos seiungito, idque ita dexterè, ne reuersiuos nervos, qui ibi in conspectum venturi sunt, vllò pacto lædas. Hi reuersiui, seu recurrentes, seu vocales nerui sursum reuertuntur asperæ arteriæ adherentes, atque in laryngam immittuntur. recurrentem neruum ita facilè agnosces, tum quia albicat, tum quia instar fili videtur esse. hunc eleuato, nam si illum digitis compresseris, dictum, ac factum misero cani vox imminuitur: si manum detrahas, ita ut animalibus spiritibus aditus pateat, vox denuo reuertetur. sin dextrum

Improbatur ridicula de capinoso vapore sententia.

Plures canes cõparentur in vnius sectione oportet.

Quomodo thorax aperi debeat in vnius sectione.

Recurrẽtes nervi quo pacto inueniantur, & tractentur.

*Quomodo vox
aufertur & mi-
nuitur.*

neruum abscindas, prorsus amittitur. Nunc de sinistro reuersuo neruo dicamus. Administratio eodem modo fiat, quo in dextero dictū est, si neruum vinculo excipias & coarctes, statim mutus efficietur: si dissoluas, semilatrabit, ob dexteri nerui abscissionem, sin transuersum difsecaueris, mutus in eternum fiet. superuiuere tamen posset, si dimitteretur cum tanto vulnere, nisi alia afflictio afflicto adderetur. Profecto pulchrum est spectatu, consideratūque pulcherri-
mum, quo pacto duo neruuli adeo paruuli tam bellam edant actionem, qualis est vocis ipsius efformatio, nemōque est, qui non obstupescat. hanc rem non poterat non satis mirari doctus, atque insignis philosophus Hieronymus Pontanus, & excellentissimus pontificius Medicus Paulus Manilius, necnon excellens Ioānes Valuerdus Anat. Artis admodū studiosus, meiq; amātissimus: cum præsertim Aristot. scirent sentire vocē à corde proficisci. Quod si quis obstinatè Aristot. sententiā tueri velit, inquiring arti-
riis carotidibus deligatis vocem amitti, is sciat, nisi vnà neruum recurrentem vincias, quod sæpe vsu venit, id nullo pacto factum iri. Verisimilēque est eos, qui Aristoteli imposuerunt. de vo-
cis origine, quod à corde oriebatur ea coniectura, neruum reuersuum vnà cum carotide arte-
ria vinculis excepisse, & hanc præcipuè fuisse erroris causam. cū veritas hæc sit, neruis, quos diximus, sectis, vocem omnino to. li. compressis
non

*Vocem nō à cor-
de, vt Aristote-
li visum est pro-
ficisci.*

*Aristotelis er-
roris causa.*

non tolli quidem, sed animal semiuocale reddi. Postquam iam mutus canis prostat, septi transuersi motum tibi licebit contemplari, si abdomine à summo ad imum secto, contractisque tum intestinis, tum ventriculo, & deorsum detrusis, & si opus fuerit sectione facta, iuxta costarum inferiorum deductum. Deinde pulmonis motum cōtemplaberis thorace anteriùs resecato, & ex altero latere costarum cartilaginibus cultro excisis: nam hīc non est nouaculae locus tutus. Caue autem, dum id ages, ne pulmones, aut cor vsquam offendas: nam tanta sanguinis copia exiliret, vt videre ampliùs, quod cupiebas, nullo pacto posses. abscissis, quæ diximus, thoracem manu dilatato, & binas spongas frigidiuscula aqua prius madidas, deinde expressas in illum immittito: tu alteram, alteram verò minister, qui tibi opitulatur, cartilaginibusque, quas abscidisti, admoueto, vt sanguinē à venis, & arteriis intercostalibus manantem, neq; cunctantē desinant, & remorētur, comprimantue: itaque compressas tandiu detineto, vt pulmonum motum spectare, ac speculari possis: quo facto pericardium aperi, & aquam in viuente adhuc animante intueberis: licet non desint qui affirmare audeant in cadaueribus duntaxat animalium aquam in pericardio contineri. Si post tot infelicis canis cruciatus, vel felicitis potiùs, qui ob rerum pulcherrimarum agnitionem spectaculum de se præbuit, superuixerit, omnes vel

*Septitransuersi
motus contem-
platio.*

*Pulmonis mo-
tus cōtemplatio*

*Cautio à pulmo-
ne.*

*Aqueus humor
in pericardio, &
viventis, & mor-
tui inesse.*

plurimas saltem pulsum differentias obseruare poteris: cor illius conspicatur reliquas differentias in alio cane conspicaturus, qui an catellus sit, vel plurium mensium, tunc nihil interest. Nam iam vocis originem in alio cane tuis oculis intuitus fueras, & latrantem primo magno eiulatu, deinde voce imminuta, postremò amissa ob eam, quam diximus, causam consideraue-
 ras. Thorace igitur huius secūdi canis primū ap-
 aperto per rectam lineam in cartilaginē: sed
 illum confestim aperi, atque vnà pericardion:
 deinde abdomine quoque aperto magnæ arte-
 riæ manum admoueto: diligentēque, quoad
 eius fieri poterit, cōsidera an illa dilatetur, dum
 constringitur cor: vel opposito modo se res ha-
 beat, ibique differentias omnes pulsum sub o-
 culos intueberis in rem præsentē deductus ma-
 gnos, longos, latos, veloces, latos celeres, fre-
 quentes, paruos, neque hos modò, sed veloces
 quidem tardòsue, aut frequentes, sed interpol-
 atos, item frequentissimos, minimos, tardissi-
 mos, vndosos, & formiculares. Aliud præterea
 spectaculum iucundum, quod ad cognitionem
 attinet, de se præbere miser canis poterit. Nam
 si arteriam asperam inter anulum, & anulum se-
 cueris, & arundinem immiseris, si eam ori ad-
 moueris, & buccis infles, pulmones illicò attol-
 luntur, & cor ipsum amplexabuntur, & paulò
 post pulsus immutabitur se ipso maior factus,
 quo viso sat scio obstupesces. Quòd si terriū ca-
 nem

*Pulsus contem-
 platio.*

*Quomodo cor à
 pulmonibus am-
 plectatur, & ex
 pulmonibus pul-
 sus augetur.*

nem viuum secare in animum induxeris: thoracem eo quo diximus pacto aperire poteris, motumque pulmonum denuo diligentius considerare: deinde dextro cordis ventriculo adaperto in illum digitum immittito, vt certior fias, nunquid sanguis ille calidissimus existat, statimque sinistro cordis ventriculo secto, animaduertere tuo periculo poteris, tantum caloris ibi adesse, vt manus illum ferre nullo pacto possit, tantum abest, vt iuxta Aristotelis sententiam, frigidissimus existat. Rursus in quarto alio cane arteriam venalem referabis, sed procul à corde, vt certò discas sanguisne, an aër in illa contineatur. Quòd si es indefessus lector optime, & sciendi cupiditate flagras: quintus adhuc adsit in promptu canis, vt rem admirabilem, neque omnibus obuiam contempleris: thoracem cultro, vt diximus ocyùs aperi, corque apprehendito: minister verò tuus diligens atque expertus, mira celeritate acu crassa, & contorta, quam manibus gerebat, in qua contortum filum immissum est, quatuor cordis vasa arctè colliget: deinde cor abscindat, eodémque tempore vincula abscindantur, quibus crura quatuor iuncta erant, & in pedes proiciatur. Canem absque corde vociferari audies, progredi videbis: qua re nihil magis admirabile còspicari poteris. & hac re visa desinas adeò obstinatè in omnia Aristotelis verba iurare. qui licet magnus Philosophus fuerit. scire tamen omnia solus nullo pacto poruit. In sexto

Hh

Vtriusque ventriculi cordis sanguinis experientia aduersus Aristotelis sententiam.

Probationū sanguinis, an aër in arteria venali contineatur.

Quomodo abscindi possit cor à cane, et adhuc illi vita parū per superstit.

Mirum nō esse Aristotelē cuncta non novisse.

*Cerebri motus
contemplatio.*

præterea cane aliud, ne pigeat, cernito: cranio
nâque excoriato eius partem frâgere celerrimè
poteris, mēbranîsque duris incisîs cerebri motû
contemplari. Quod cerebrum ita mouetur, vt
ipsum cor moueri omnes fatentur, motu scilicet
dilatationis, & constrictionis. neque aliter fieri
poterat ob animalium spirituum generationē,
quam cerebro acceptâ ferunt omnes penè tum
Philosophi, tum Medici.

REALDI COLUMBI

CREMONENSIS,

DE RE ANATOMICA

Liber Decimus quintus.

DE IIS QVÆ RARO IN ANA-
TOME REPERIUNTUR.

*Medici supe-
rioris ætatis qua-
les.*



*Satius est igno-
rare quam scire
perperam.*

ROFECTO miseret
me vicē superioris ætatis
Medicorū qui in friuo-
lis, & dialecticis quæstio-
nibus die noctūq; tēpus
cōterentes, de his rebus
absq; quarū exquisita co-
gnitione ne noscere qui-
dem morbos ipsos vllō pacto possum⁹, nihil do-
cebāt, discebântue, vel ad eò cōfusè, & indistin-
ctè, &

Atè, & infidè, vt ignorare satius fuisset, quàm
 perperâ scire. Et de materia medicinali nûc ni-
 hil dicam, quâ omnem ad pharmacopolas reii-
 ciebant: Anatomicæ rei vel prorsus ignari erât,
 vel quod tonsoribus quoq; notissimum erat, id
 tantum sciebant. Itaq; cùm Anatomicam disse-
 ctionē publicè profitebantur, sitû querebant in-
 testinorû, ventriculi, iecoris, lienis, vesicæ, renû,
 cordis, pulmonisque: deinde caluaria disrupta,
 cerebrû ibi cõtineri videbant, reliqua oscitanter
 sanè, & suis cum Arabibus cæcuriètes. Quod si
 quicquâ illis occurrebat præter hæc, aut quod cû
 Mundini, aut Auicennæ scriptis nō conuenirer, *Ridiculû mon-*
 id omne tanquã monstrum naturæ in illius indi- *strum esse quod*
 uidui fabrica ostètabant, adeò vt cōplura mon- *cû Mundini scri-*
 strofa in singulis cadaueribus esse existimarent. *ptis non conue-*
 Ego verò licet ab ineunte ætate innumera cor- *Anatomen pu-*
 pora dissecuerim, & ab hinc quindecim annos, *blice xv. annos*
 & amplius cōplura cadauera Patauij, Pisis, Ro- *professus.*
 mæq; in corona frequētis Academiæ, tamē hæc
 duntaxat rara visu, & à cæteris discrepantia ob-
 seruare porui, quæ reticere nullo pacto possum,
 vt hoc exēplo obseruare alia quoq; possint post-
 hac diligentiores Anatomici. Prius verò quàm
 de rebus raris historiã exordiar, hoc vnũ te ex-
 cellens Iacobe Bone admonitũ volo, nullũ ge-
 nus hominũ mihi dissecandũ defuisse, nisi mutũ *Iacobus Bonus.*
 hominē ab ortu, quãuis quãdoq; anno vno qua- *Dissecuit, omne*
 tuordecim cadauera mihi disseccare contigerit. *genus hominum*
 Hinc igitur de rebus in Anatome hominis ra- *præter mutum*
abortu.

*In capitis futu-
ris quid rarum
vidit.*

ris, & animaduertēdis à capite incipiā. Capitis futuras vario modo se habere cōperi. nā in quibusdā nullo pacto erant cōspiciuē, aliis futura recta deerat: huic erāt ossa triangula, illi quadrangula: alij sagittæ specie, aliisque id genus figuris futuræ circumdatis. Eam tamē figuram, quæ X

*Galenī & Hip-
pocrat. error.*

Græcam literā imitetur, de qua Hippocrates, & Galenus meminerūt, fateor me nunquā vidisse: licet lynceis penè oculis sæpenumero inquisue-

*In dentibus quid
rarum.*

rim. Magnā quoq; in dentibus diuersitatē obseruauī, tum quo ad numerū dentium, tum quo ad dentiū radicum numerū in nonnullis præterea dentes maxillis aded nixos obseruauī, vt diuelli nullo modo possent, nisi maxillæ ossis frustū in-

*In maxilla infe-
riore quid rarū.
Caput gigantis.*

signe vnā abstraheretur. De maxilla inferiore hoc in Summi Pont. penu videre est, caput Gigantis (maximū enim est omnium capitū quæ hæctenus viderim) in quo maxilla inferior capi-

*Maxilla infe-
rior capiti con-
nata.*

ti aded connata, & cōiuncta est, vt omni motu prorsus careat atq; in viuente non carere nō potuerit. Primam quinetiam vertebra occipitiō ita adhærentē hīc oculis vidi, vt moueri neuti-

*De vertebra pri-
ma occipitiō ad
inherente.*

*De vertebra-
rum numero.*

Vertebra colli.

*Vertebra tho-
racis.*

*Vertebra lum-
borum.*

quam posset. Vertebrarum numerus in quibusdā immutatus cernebatur. Nam quod attinet ad vertebrae colli, hæ in omnibus penè septem sunt: ego verò nunc sex, nūc octo ceruicis vertebrae cōperi. Vertebrae thoracis tum vndecim, tum tredecim. Vertebrae lumborum interdum sex, interdum quatuor. Os sacrum nonnunquā ex quinque, aliās ex sex ossibus constare vidi.

Costas

Costas item viginti duas, viginti quinque & viginti sex. Quandoque duas ex his, tresue admodum connexas: at in aliis in notatu dignum tumorem excreuisse. sternū ex duobus ossibus, & ex tribus, & ex quatuor. Os Ileon vnitum sacro osse apprehendi. Femur processus quosdam ad palmi longitudinem, acutōsq; itidem in tibia, sed non tam proceros. Vidi femur cum tibia, molāque vniri: femur, tibiā, in incredibilem tumorem excreuisse. sex in manu digitos: extremus etenim pollicis articulus in duos diuidebatur. Sed quamuis hæc, quę hactenus memoraui, memorāda videantur esse, & admirāda, admirabilius tamen erit, quod mox audies. Excellens medicus Io. Bertonius ab Auriculamihī amicissimus, sceleton mihi dedit, quē ego domi ad studioforū vtilitatem diligēter adseruo, in quo ossa omnia. i. omnes totius corporis articuli à capite ad extremos vsq; pedis digitos vniti cōspiciuntur. huic quatuor dentes desunt, bini suprà, totidē infrà ex illorū regione, qua via cibus, & potus intro mittebatur. Romæ in Xenodochio diui Iacobi incurabilium diu vitā traxit: viuēs autem, quem senem vidit, & inuisit sæpe Ioannes Auricula, nihil aliud mouebat, quā oculos, linguā, penem, abdomen, thoracem. nam cartilagine quidē costis articulatae erant, sed nondum coaluerant: reliquæ corporis partes omnis motus expertes relinquebantur. Alios secui, quibus brachia ab ortu deerāt: alios quibus de-

*Costa.**Sternon.**Ileon.**Femoris processus.**Tibia processus. Femur, tibia & mola unita.**Sex digiti in manu.**Pollicis extremus articulus bifidus.**Ioannis Bertonij sceleton admirabile visu describitur.**Monstra.*

erant crura . Præterea corpus integrum intuitus sum , cui dimidium alterius coharebat . Auriculas instar brutorum in hominibus , cæcos iam inde ab incunabulis , & similia . sed quod maiore admiratione me affecit , fuit inspectio Lazari vitri voracis vulgo dicti , quem patritij omnes Veneti , immò Veneti omnes , omnes Ferrarienses de facie nouerant . Hic nullo prorsus gustu , dum viueret , præditus erat , nullam in edendo voluptatem , nihil iniucundum perſentiebat : insipida , amara , dulcia , pinguis , salſa , acria , non distinguebat : vitrum , saxa , lapides , ligna , viua animalia , carbonēs , pisces è viuuario extractos adhuc salientes vorabat . Vorabat lutum , lineos , laneosque pannos , fœnum , stipulam , & , vt breui omnia complectar , quidquid homines , quidquid animãtia vorât , quidquid illi edendum , seu deglutiendum potiùs offerebatur , mercede proposita , dictum , ac factũ ingurgitabat . Testis est inter reliquos Martinus Aromatarius Patauij ad Angeli insigne , cui sacculum carbone refertum , & saccum insuper deuorauit . quo viso persoluit , quod pollicitus fuerat , comminatus ne ad pharmacopolum amplius accederet : veritus ne se cum taberna , & vasis esitaret . Cùm igitur hoc naturæ monstrum mihi disseccandum esset Patauij , cœpi huiusce rei diligenter , quoad eius fieri potuit , causam venari , quam me tandem Deo duce ex particulari illius structura assecutum esse confido .

*Lazarus vitri
vorax gustu ca-
rens.*

confido. Nam quarta neruorum coniugatio, quæ gustus gratia in aliis hominibus à natura producta est, in hoc Lazaro vitri vorace neque ad palatum, neque ad linguam reptabat, sed ad occipitium reflectebatur. sed de hoc Lazaro satis, superque. In musculis verò equidem varietatem percepi, at non multâ. Erant aliqui, quibus in facie musculus abundabat, aliis in thorace, aliis in extrema manu. Vidi & nonnullos, quibus aliqui musculi deficiebant, vt in nōnullis furibus illustribus, in quibus disseccandis oculatissimus fui. obseruauī in his deesse musculū illū, à quo latus tendo in vola proficiscitur, quo lato tendine non carebant, sed non à dicto, verum à brachialis ligamento exoriebatur. In cruribus item, pedibûsque aliquam diuersitatem inueni, sed hæc mea sententia non multi faciēda erant. In venis autem miram nactus sum sæpenumerò varietatem, in internis inquam, atque externis. Nam in eodem latere duas internas iugulares venas deprehendi, duas, tres, quatuorque, & plures eodem latere, emulgentes binas, item eodem latere seminarias venas: Vreteres quatuor, venas in abdomine, & cruribus varicosas maximæ molis. Vidi etiā renem vnum dūtaxat, eūmq; maximum. Animaduerti intestinorum tenuium mutuū ingressum, spatium ampliore, quàm sit digiti longitudo, præsertim in nonnullis, quos dolor iliacus enecauerat. Iecur quandoque mihi se obtulit inspiciendum

Quarta neruorum coniugatio in Lazaro vitri vorace ad palatum & linguam non tendebat.

In musculis quæ differentiam inueniunt.

In furibus illustribus quid rarum obseruauerit.

Cruca.

Pedes.

Vena.

Vreteres.

Renes.

Iecur.

*Lienes.**Cartilago circa
lienem.**Antonius Mi-
randulanus.**Iustinianus Fi-
netus.**Franciscus San-
sonius.**Omentum.**Pulmo.**Omne vulnus
thoracis pene-
trans extra spi-
rare falsum est.**In pulmonibus
steatomata, &
atheromata.**In Francisco Ca-
pello os in pul-
mone.**Paulus iij. pon.
max.*

peritonæo adnexum: adnexam item vidi peri-
tonæo lienem. Adde lienes adeò grandes, vt vi-
ginti librarum pondus vnusquisque ex his lōgè
excederet, quos cartilago exterius obuoluebat.

Quæ res cū ab Antonio Mirandulano, quem
nostri temporis philosophorum principem ap-
pellare meritò possumus, & ab excellentissimo
Iustiniano Finetto, & Francisco Sansonio dili-
genter spectaretur, non poterant satis mirari no-
uitatem tantæ molis primū, deinde illius par-
tis extrinsecæ cartilagineæ. Conspicatus sum o-
mentum peritonæo, necnon abdominis muscu-
lis adnexum. Præterea omenti selibram, extra
umbilicum, & in scroto omenti libram, & am-
plius. Pulmonem in pluribus pleuræ cōnexum:

nunc in altero latere: nunc in vtroque, atq; hæc
pulmonum in nonnullis cum pleura connexio
in causa plerunq; est, vt Medici decipiantur pe-
netratia thoracis vulnera nequaquam agnoscē-
tes, quippe qui hoc Chirurgorum axioma pu-
tent, omne thoracis vulnus penetrans extrā spi-
rare: at in illis, quibus hæc pulmonum con-
nexio cum membrana succingente contingit,

possunt vulnere. thoracem perforante, labora-
re, neq; tamen respirare vulnus cernitur. Quid?
quod tum in pulmonibus, tum in iecore ipso
στεατωματὶ comperi, necnon ἀθηρωματὶ. Vidi &
in pulmonibus ossa non parua, vt superiore an-
no in Francisco Capello, quem Paulus I I I I.

Pontifex Maximus, è Verona Romā accersiuir,
vt Sancti

ut Sancti spiritus hospitalis commendator, seu
 præceptor esset. cuius sectioni tu Iacobe Bone *Iacobus Bonus.*
 interfuisti. In thorace magnâ aquæ copiâ vidi. *Thorax.*
 Vidi in corde vlcera, & tumores duros præter *Cor.*
 naturam, præsertim in sinistro cordis vetriculo.
 Vidi in nonnullis septum, quo cordis ventriculi *Septum cordis.*
 distinguuntur, cartilagineû: alios, in quibus fini- *Ventriculus su-*
 ster ventriculus cordis deesse videbatur, tâ exi- *nister.*
 guæ molis erat: discipulû item in Romana A-
 cademia mortuum secui (aderat excellens Me-
 dicus Alexander Traianus Petronius à ciuitate *Alexander Tra-*
 Castellana, acris iudicij vir) huic misero iuueni *ianus Petronius*
 pericardium deerat, itaq; subinde in syncopen *Rarus admodû*
 incidebat, subinde mortuo similis conspicieba- *casus.*
 tur, quo genere morbi exanimatus est. Inueni *Pericardium.*
 quoq; partē thoracis pulmone destitui, hoc est, *In thorace pul-*
 minimâ pulmonis portionem adesse: quod verò *monis portio mi-*
 reliquum erat cauitatis, ab aquâ tumore occu- *nima.*
 pabatur. Dissecui nō semel, qui eadem partem Apo- *Sectio apople-*
 plexiam obierant, in quorum cerebro magnam *ctici.*
 aquæ copiâ reperi: perspicuam quidē, sed glut-
 nosam. Monstrum mihi oblatû est Patauij disse- *Monstrum Pa-*
 candum, erat infans semestris mas, ut alij mares *taij dissectum*
 sunt, cui alius imperfectus infantulus anteriore *maris semestris,*
 parte incumbebat, cruribus, brachiis, dorso, ab- *cui alius ante-*
 dominis parte, pene, mediôq; collo. videbatur *riore in parte in-*
 autem caput huius imperfecti puelli in thoracē *cumbebat.*
 perfectioris intrusum. Hoc monstrum vixit ali-
 quandiu. Quamobrem inter studiosos viros lis
 orta, & quæstio, utrû cor vnicum illi adesset, vel
 duplex, idem de iecore, cerebrôq; quæsitum est,

Marcus Antonius Iarua.

& de aliis internis membris. Marcus Antonius Iarua illustris philosophus, vnicam in illo subiecto animam esse opinabatur. Nam si quis imperfectam illam appendicem, & pondus inutile attigisset, ille, quem integrum membrorum omnium diximus, statim persentiscere animaduertebatur. Non deerant tamen, quibus oppositum videretur. Hoc itaque monstrum, ubi diem suam obiit, ego rei nouitate allectus libenter secui. quæ autem obseruauimus, hæc ferme sunt. In imperfecto, quem dixi, nonnulla intestina aderant, ex quorum vnius portione tum vesica, tum anus construiebantur. nullum ibi aderat iecur, neque cor, neque cerebrum, sed ren permagnus, quem ego hepatis penè munere fungi sum opinatus. nam ab extremo iecore perfecti infantis crassa vena, duraque, instar arteriæ deducebatur ad renem illum insignem: atque inde venæ aliæ complures passim distribuebantur. at ab arteria dextra axillari perfecti puelli arteria ortum ducebat, quæ postmodum per vniuersam partem monstri imperfectioris deducebatur. Item à neruis dextri brachij exhibant, qui per reliquum corpus imperfecti homunculi disseminabantur. atque hæcenus de monstro Patauino. Nunc de membrana hymene quid obseruauerim, dicam tibi: licet vulgus hominum putet nullam esse virginem, quæ hymena non habeat. Ter duntaxat illam inueni, bis in duabus paruulis puellis, semel in natu maiore, quam cum difficarem, intererat excellentissimus Antonius Fracanzanus Vicentinus, & Paulus Crassus Patavinus, & una cum his

*Quid in monstri
sectione inuenit*

*Membrana Hy
men.*

*Antonius Fracanzanus.
Paulus Crassus*

his Ioannes Caius Anglus. Est hymen mēbra-
na quædā sub nymphis ante ceruicem vteri vni-
co foramine prædita superiore parte, vt menses
effluere possent. atque hæc illa est eadem mem-
brana, quæ ingressum penis quamuis mēbrofi
hominis prohibet.

Lapides autē innumerabiles penè hisce ma-
nibus extraxi, inuentos in renibus colore vario,
in pulmonibus, in iecore, in vena portæ, vt tu
tuis oculis vidisti Iacobe Bone in Venerabili
Egnatio Generali congregationis Iesu. Vidi e-
tiam lapillos in vreris, in vesica, in intestino
colo, in venis hæmorrhoidalibus, atq; in vmbi-
lico. In bilis quoque vesicula, quod tamen exci-
derat, varij coloris, variæq; figuræ lapillos, & in
nōnullis complures inueni: vidi abscessum. De
abscessibus autem quid attinet dicere? Inter re-
liquos sæpe simillima materia refertissimum ab-
scessum in omento, & peritonæo cuiusdā mu-
lieris extraxi: quæ ob harū partium abscessum in
hydropem inciderat: & mirū mihi visam fuit,
cū eiusdē iecur, & lien, neque in colore, neq;
in substantiā præter naturam affecta esse vide-
rentur, in illius tamen abdomine aquæ incredi-
bilē copiam adfuisse. Hanc hydropicā, dum ego
Romæ dissecares: intererat excellens Cosmus
Iacomellus, nunc Romæ Archiatros. Innotuit
mihi ex Anatome abscessus cor vndiq; circum-
plectens & cor illius iam fermè putrescēs. quam-
rem excellens Medicus Marcus Appogius ab
Oximo magna admiratione intruebatur. Præ-

*Ioannes Caius.
Quid sit hymen.*

*Lapides in re-
nibus.*

*Lapides in pul-
monibus.*

*Lapides in ieco-
re.*

*Egnatius Geno-
ralis congrega-
tionis Iesu ha-
bebat lapides in
vena porta*

*Lapides in vre-
teris.*

Vesica.

Vmbilico.

Venis hæmorrh.

Vesica bilis.

De abscessibus.

*Hydropicus cui
iecur, & lien in
calore & sub-
stantia non erat
præter naturā.*

*Cosmus Iaco-
mellus.*

*Abscessus in
corde.*

*Marcus appo-
gius.*

Iecur scirrhum.

Lien scirrhusa cartilagine obducta.

Stephanus Cerasius.

terea iecur, quod toties scirrhum deprehēdi, lienem quoq; nō modò scirrhus laborātem, sed extrā cartilagine obductum, quod summa cum voluptate vidit excellentissimus Stephanus Cerasius. Multa alia minoris momenti, rara tamen obseruavi, quę ne tractatus hic nimis excrescat, missa faciam. Non possum tamē abstinere, quin tibi explicem breui quoad eius fieri potest, quid in tribus Cardinalibus Romę, quid Parauij in Hermaphrodito deprehēderim, quā historiam postquam absoluerō finem faciā. In Cardinali Gambara Brixiano tumorem prædurum, & ad oui magnitudinem in sinistro cordis ventriculo Romę vidi, vbi illum in affiniū gratiam disseccarem. In Cardinali Cibo vena, quę à liene ad os ventriculi tendit insignis erat magnitudinis: quę quum primū ob anastomosim, vel fracturā referata est, illicò ventriculus sanguine repletus fuit, & nō modò ventriculus, sed intestina omnia: licet, dum adhuc viueret, in morbo ipso libras aliquot tū per vomitum reiecisset, tum per secessum deiecisset. Quam sectionem dum ego summa diligentia peragerē ob subiecti dignitatem, & ob morbi raritatē, aderat excellētissimus Antonius Musa Brasauolus Ferrariensis, quem honoris gratia nomino. In Cardinali Campegio intestina omnia ad hypochondria redacta erant. propterea cavitās inferior abdominis intestinis destituta erat, & spina detecta. Quamobrem Medico licebat abdomen Cardinalis atrectātī magnę arteriæ motū perferire, & vnā cū

In Cardinali Gābara tumor durus oui magnitudine in sinistro ventriculo cordis.

In Cardinali Cibo cur ventriculus & intestina sanguine repleta.

Antonius Musa Brasauolus.

In Cardinali Campegio intestina ad hypochondria redacta.

cùm illa durities persentiebatur. Illa verò durities nihil aliud erat, quàm vertebrarum corpora. cuius rei nouitatem non poterat satis mirari excellens Augustinus Riccus Lucésis. Sed profectò mi Bone, vel Optime potiùs Iacobe, inter tot admirabilia, & rara, quæ in humani corporis fabrica diuersis tēporibus obseruauì, nihil admirabilius, nihil rarius cēseo, q̃ quod de neutra natura diligenter inuestigauì. Proposito enim mihi androgyno, seu hermaphrodito, subiecto inquam eodem mare, & fœmina. superioribus etenim annis fœminā mihi videre cōtigìt, quæ præter vuluam, membro quoq; virili prædita erat, quod tamen non erat admodum crassum.

Augustin. Riccus.

Fœmina androgyna scēta quidrarum.

Quāobrem in eius Anatome generationis vasa accuratè admodum peruestigauì: vasa seminaria, testēsq; considerans, nunquid vlla inter hæc cōmunio, & cōsensus adesset: tandem hoc cōperi, vasa quidem præparantia, ab aliarum fœminarū præparantibus vasis nō differre: sed deferentia differre. nam bipartita erant, & ex binis quaterna natura genuerat, ex quibus duo, quæ etiam maiora erant, ad matricis concauum destinabantur, reliqua duo ad penis radicē, qui glandularum parastātum expers erat. Hoc tam admirabile visu, & speculatu erat quàm quod maximè: quo pacto natura prudens, sagaxq; locum satis tutum selegerat, per quod vasa hæc ad penem deferri possent: & quemadmodū meatum, qui in ipso est pene, perforarent: qui meatus in aliis tū semini, tum lotio cōmunis existit.

hic verò vrinae nihil quicquam opis afferebat. nam instar aliarum mulierum vrina exibat. Vterus autem, necnon vteri ceruix à cæterarum fœminarum matrice, collòq; nihil distabat: sed in testibus discrimen erat. nam testes in hac crassiores erant, quàm in reliquis mulieribus: sed quoad situm ipsorum, nullum discrimen deprehendi. Peni scrotum contiguum non erat, immò verò scroto prorsus carebat, & duobus musculis præditus erat huius fœminæ penis non quatuor, ut in maribus perfectis. Præterea penis huius hermaphroditi tenui pelle inregebatur, nullum adebat præputium, sed duo spongiosa corpora, per quæ duæ arteriæ ferebantur, ab illis ortæ, quæ ad vesicam tendebant. Atq; hæc sint satis de hermaphrodito, quem mortuum secui. Duos deinde Hermaphroditos viuentes consideravi, in quibus alter mas, fœmina altera erat (dicuntur autem à superabundanti vel mares, vel fœminæ, ut vel plantandis hominibus, vel homini suscipiendo sunt aptiores, vel aptiores creduntur). Fœmina erat æthiopica mulier earum, quas Cingaras appellant Longobardi. hæc neque agere, neque pati commodè poterat. nam vterq; sexus imperfectus illi cōtigerat suo magno malo: penis nanque minimi digiti longitudinem, crassitiemque non excedebat: vulvæ autem foramen adeò angustum erat, ut minimi digiti apicē vix intromitteret. optabat misera, ut hunc illi penem ferro euellerem, quippe qui sibi impedimento esse diceret, dum cum viro coire exoptabat.

Hermaphroditus quomodo dicatur mas aut fœmina.

Cingara hermaphrodita viuentis quid raram.



bat. optabat etiam, vt vuluæ foramen illi amplificarem, vt viro ferendo idonea esset. Ego vero, qui horum vasorum discrimē intueri sæpius cupiebam, verbis detinui. Non enim sum ausus aggredi illius cupiditati satisfacere, quoniam id absque vitæ discrimine fieri non posse existimabam. Hermaphroditus vir, quē viuum summa diligentia inspexi, hoc modo habebat. penis aderat cum scroto, testibúsque, sub quibus in perineo seu tauro, quo loco (inter anum scilicet, & testes) fit sectio pro extrahendo vesicæ lapide: foramē quidem perstabat in vuluæ morem, sed non penetrabat. atque hi sunt quos vidi, Hermaphroditi. Sed priusquam finem huic tractatui imponam: liber recensere, quid monstruosum in muliere animaduenterim. Fœmina erat, cuius vulua ab aliarum fœminarum vuluis nihil peculiare, & diuersum habebat: & matricis colli portio prominebat, vel matricis collo simile. matrix autem nulla aderat in abdomine, neque vasa seminaria, neque testes. & quoties cum viro coibat (coibat autem sæpe) mirandum in modum conquerebatur.

Vir hermaphroditus quomodo haberet.

Vulua rara.

FINIS.



Errata sic restitues.

Folio 16. linea 15. lege *arthrodiam*. *ibid.* lin. 17, aliisque in
locis, *lambdoides*. fol. 25. l. 2. item fol. 35. l. 7. *σφαῖρα*. fol. 86.
l. 26. *ἀγρῶα*. fol. 87. l. 3. *oblongo*. fol. 89. l. 21. *latera*. fol. 101.
l. 15. *abduxerit*. fol. 104. l. 7. *fætus*. fol. 114. l. 19. *graciliores*. fol.
120. l. pen. *Gracis*. fol. 125. l. 26. item fol. 129. l. 16. *acetabulum*.
ibid. l. 13. *adnata*. fol. 182. l. 3. *promptius*. fol. 183. l. 24. *peculia-
ri*. fol. 186. l. 18. *augetur*. fol. 194. l. 12. *meditata*. fol. 239. l. 5. *re-
feratur*. fol. 219. l. 25. *rectæ*. fol. 220. l. 1. *dissectione*. fol. 286. l.
pen. *Galeno*. fol. 231. l. 9. *maxilla*. fol. 314. l. 13. *cribrū*. fol. 303.
l. 29. *ἀγρῶα*. fol. 325. l. 5. *magnis*.